




L4_N8_T100_PBC J=0.4 site 0
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_0>
<sz_0>
% diff <n_0> vs ref
% diff <sz_0> vs ref
t
χ=128, dt=0.05
χ=128, dt=0.1
χ=32, dt=0.05
χ=32, dt=0.1 (ref)
χ=64, dt=0.05
χ=64, dt=0.1


L4_N8_T100_PBC J=0.4 site 1
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_1>
<sz_1>
% diff <n_1> vs ref
% diff <sz_1> vs ref
t
χ=128, dt=0.05
χ=128, dt=0.1
χ=32, dt=0.05
χ=32, dt=0.1 (ref)
χ=64, dt=0.05
χ=64, dt=0.1


L4_N8_T100_PBC J=0.4 site 2
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_2>
<sz_2>
% diff <n_2> vs ref
% diff <sz_2> vs ref
t
χ=128, dt=0.05
χ=128, dt=0.1
χ=32, dt=0.05
χ=32, dt=0.1 (ref)
χ=64, dt=0.05
χ=64, dt=0.1


L4_N8_T100_PBC J=0.4 site 3
% diff = 100·(run − ref) / initial peak-to-trough amplitude of ref (t ≤ 10)
<n_3>
<sz_3>
% diff <n_3> vs ref
% diff <sz_3> vs ref
t
χ=128, dt=0.05
χ=128, dt=0.1
χ=32, dt=0.05
χ=32, dt=0.1 (ref)
χ=64, dt=0.05
χ=64, dt=0.1