

Introdução alimentar do bebê

Os primeiros sabores, com segurança e afeto: a partir dos 6 meses.




1 Quando começar?

Só leite materno

Leite materno continua, à vontade do bebê e da mãe

Comida de verdade entra e vai aumentando



Até os 6 meses, só leite materno: nem água, nem chá, nem suco, nem papinha. **A partir dos 6 meses,** o bebê começa a comer, mas a comida **complementa** o leite materno, não o substitui. Se o bebê não mama no peito, peça à equipe de saúde orientação sobre o leite mais adequado.

2 O bebê está pronto?

- ✓ Completou **6 meses** (se nasceu prematuro, a equipe diz a hora certa).
- ✓ **Senta** com pouco ou nenhum apoio e sustenta bem a cabeça.
- ✓ Mostra **interesse** pela comida: olha, abre a boca, tenta pegar.
- ✓ Leva objetos e as mãos à boca.
- ✓ Empurra menos a comida para fora com a língua.

É normal nas primeiras vezes: cuspir, fazer careta, brincar e se sujar. Tudo é novidade!

Não adie: esperar demais pode dificultar a aceitação depois.

Ainda não senta nem segura bem a cabeça? Espere alguns dias e tente de novo, no ritmo dele.

3 Colher, BLW ou os dois?

COM COLHER

Papa amassada

- Comida **amassada com garfo**, nunca batida no liquidificador.
- Você oferece na colher, no ritmo do bebê.
- Deixe-o pegar a colher e tocar a comida.

BLW

Bebê come sozinho

- **Baby-led weaning:** pedaços e palitos macios que **ele mesmo** pega e leva à boca.
- Sem colher e sem papinha.
- Pede atenção extra com **corte e segurança** (página 3) e com o **ferro** (página 2).

MISTO

Um pouco de cada

- Colher em algumas refeições, mãos em outras.
- É o que muitas famílias fazem.
- Pode mudar ao longo dos meses.

O que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria: o bebê pode receber a comida amassada na colher e também deve explorá-la com as mãos. Não há evidências de que o BLW seja o único jeito certo, nem de que a colher seja pior, desde que se sigam as orientações de segurança e de alimentação deste guia.


Vale para qualquer jeito de começar

1 Sempre **sentado**, com um adulto por perto olhando.

2 Comida de verdade: sem açúcar, sem ultraprocessados, com pouco sal.

3 Você oferece; **o bebê decide quanto come**. Comer junto, não “dar de comer”.

O que oferecer e como preparar



O prato do almoço e do jantar

- **Cereais, raízes ou tubérculos:** arroz, macarrão, milho, batata, mandioca (aipim), inhame, cará, batata-doce.
- **Feijões:** feijão de qualquer cor, lentilha, ervilha, grão-de-bico.
- **Legumes e verduras:** abóbora, cenoura, chuchu, abobrinha, brócolis, couve, espinafre, tomate.
- **Carnes e ovos:** frango, boi, porco, peixe, fígado, ovo.
- **Fruta pequena,** junto ou logo depois da refeição.

Coloque cada alimento **separado** no prato, para o bebê conhecer cada sabor. Comece com cerca de 1 colher de sobremesa de cada e ofereça mais se ele pedir.

Idade	Como servir	Colheres de sopa	Refeições
6 meses	Amassado com garfo , cada alimento separado. Carne bem cozida, desfiada ou picada bem miúda. Fruta amassada ou raspada.	2 a 3	Almoço + fruta (1 a 2 vezes ao dia). Leite materno nos outros horários.
7 a 8 meses	Menos amassado ou bem picado. Aos 8 meses, veja se aceita o feijão em grão.	3 a 4	Almoço e jantar (o jantar entra cerca de 1 mês depois do almoço) + frutas nos lanches.
9 a 11 meses	Picado , como a comida da família. Carne desfiada. Já pega pedacinhos com os dedos (pinça).	4 a 5	Almoço, jantar e lanches de fruta. Leite materno sempre que ele quiser.
1 a 2 anos	Pedaços maiores , mesma consistência da família. Come com colher e segura o copo.	5 a 6	Almoço, jantar, café da manhã e lanches (fruta, cereal ou raiz).

Quantidades por refeição principal: são só uma referência, respeite o apetite do bebê. Na comida em pedaços (BLW), o mesmo prato vira alimentos macios que ele pega com as mãos.

Um dia possível aos 7 a 8 meses

Leite materno também entre as refeições, sempre que o bebê pedir.

Ao acordar Leite materno	Meio da manhã Fruta e leite materno	Almoço Prato completo e fruta	Meio da tarde Fruta e leite materno	Jantar Prato completo	Antes de dormir Leite materno
-----------------------------	--	----------------------------------	--	--------------------------	----------------------------------

Como preparar (para todos)

- ✓ Cozinhe a **comida da família** com alho, cebola, cheiro-verde e ervas, pouco óleo e o **mínimo de sal**. Separe a porção do bebê.
- ✓ **Não bata** no liquidificador nem passe na peneira: a comida precisa dar um pouco de trabalho para mastigar. Se estiver seca, junte o caldo do cozimento.
- ✓ Sem caldo em cubo, sem tempero pronto, sem açúcar.
- ✓ Feijão de molho por 8 a 12 horas (jogue a água fora): dá menos gases.
- ✓ Carnes, peixes e ovos sempre **bem cozidos**.

Ideias para BLW (a partir dos 6 meses)

Legumes cozidos e macios: batata-doce, batata, mandioca, inhame, abóbora, cenoura, abobrinha, buquês de brócolis e couve-flor.

Proteínas: omelete ou ovo bem cozido em tiras; frango, carne ou peixe bem cozidos em tiras macias ou bolinhos caseiros; feijão amassado em bolinho ou pasta.

Frutas maduras: fatias grossas de banana, manga, mamão, abacate; pera ou maçã cozidas.

Em toda refeição principal: uma fonte de ferro (carne, ovo, feijão, fígado) e algo que dê energia (batata, mandioca, arroz, abacate, um fio de azeite).

Ferro e vitamina A: proteção contra a anemia

Ferro: carnes, fígado, ovo, feijão e verduras verde-escuras (couve, espinafre). Ofereça junto uma fruta com **vitamina C** (laranja, acerola, goiaba, manga, mamão, tangerina): o corpo aproveita mais o ferro.


Vitamina A: fígado, ovo, abóbora, cenoura, couve, mamão, manga. O SUS oferece suplementos de ferro e de vitamina A para as crianças: pergunte na sua unidade e não use por conta própria.

Segurança na hora de comer

Antes de servir

- ✓ Bebê **sentado, com as costas retas** (cadeirão ou cadeirinha com apoio). Nunca deitado, andando, brincando ou no carro.
- ✓ Um **adulto sempre olhando**, do começo ao fim. Sem TV nem celular.
- ✓ Comida **macia**: se amassa fácil entre o polegar e o indicador, está no ponto.
- ✓ Comida **morna**: prove antes, com outra colher, e não sopra.
- ✓ No BLW, é o bebê quem leva a comida à boca. **Não coloque pedaços na boca dele.**

Como cortar



palito macio (tamanho real, se impresso a 100%)



uva inteira

Palitos do tamanho de um dedo de adulto (5 a 6 cm de comprimento), para o bebê segurar com a mão fechada e ainda sobrar uma ponta.

Redondos e pequenos (uva, tomate-cereja, acerola): corte ao meio ou em 4 partes, no sentido do comprimento, e tire caroços e sementes.

Perto dos 9 a 12 meses, com a pinça, já pode oferecer pedacinhos menores e macios.

Evite: risco de engasgo

- ✗ **Pipoca.**
- ✗ **Amendoim, castanhas e nozes inteiros.** Só triturados ou moídos, misturados à comida.
- ✗ **Uva, tomate-cereja, acerola e jabuticaba inteiros.**
- ✗ **Pasta de amendoim grossa** em colheradas: espalhe bem fininha ou dilua na comida.

- ✗ **Frutas e legumes duros e crus** em pedaços (maçã, cenoura crua): prefira cozidos, ralados ou bem macios.
- ✗ **Salsicha ou linguiça em rodela**s, balas, chicletes e pirulitos.
- ✗ **Carne dura, ossos e espinhas de peixe.** Confira o peixe com os dedos, duas vezes.

Ânsia ou engasgo de verdade?

Ânsia de vômito: é normal

O bebê faz careta, tosse, faz barulho, os olhos lacrimejam e o rosto pode ficar vermelho. É um reflexo que protege a garganta e empurra a comida para a frente da boca. Aparece mais no começo e diminui com a prática.

O que fazer: fique perto e calmo. Deixe-o tossir e resolver sozinho. **Não** coloque o dedo na boca dele e **não** bata nas costas.

Sufocamento: é emergência

O bebê **não consegue chorar, tossir nem respirar**. Fica em silêncio, com a boca aberta e o rosto arroxeadado ou pálido.

O que fazer: peça ajuda e ligue 192 (SAMU). Bebê de bruços no seu antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo e a sua mão segurando o rosto dele: **5 pancadas firmes nas costas**, com a base da mão. Vire-o de barriga para cima: **5 compressões no peito**, com dois dedos, logo abaixo da linha dos mamilos. Repita e olhe a boca a cada rodada. Se ficar desacordado, comece a ressuscitação e siga as instruções do 192. **Mesmo que a comida saia, leve o bebê ao pronto-socorro.**

Peça na unidade de saúde uma demonstração prática dessa manobra e ensine a todos que cuidam do bebê.

Alimentos que podem causar alergia

Ovo, peixe, amendoim, castanhas, leite, trigo e outros podem ser oferecidos **a partir dos 6 meses, como os demais alimentos**, mesmo que exista alergia na família: adiar não protege. Ofereça **em pouca quantidade, em casa**, num horário em que você possa observar o bebê por algumas horas (evite antes de dormir ou de sair).

- ❗ **Procure atendimento na hora** se aparecerem manchas vermelhas ou coceira, inchaço nos lábios, olhos ou rosto, vômitos repetidos, chiado ou dificuldade para respirar.

Bebê com eczema forte ou alergia já conhecida? Converse com o pediatra **antes** de oferecer.

Até os 2 anos, fora do prato

- ✗ **Açúcar, mel, melado, rapadura e adoçantes**, nem em frutas, mingaus, bolos ou geleias. (O mel ainda traz risco de botulismo antes de 1 ano.)
- ✗ **Ultraprocessados**: biscoitos e bolachas (mesmo “de bebê”), salgadinhos, macarrão instantâneo, nuggets, salsicha, embutidos, gelatina, cereal matinal, pão de forma e bisnaguinha.
- ✗ **Papinhas e sachês industrializados**. A comida caseira ensina a mastigar e a conhecer os sabores da sua casa.

- ✗ **Bebidas adoçadas**: refrigerante, suco de caixinha ou em pó, chá adoçado, achocolatado, iogurte de sabor e petit suisse.
- ✗ **Suco antes de 1 ano** (depois, prefira a fruta inteira). Nada de café, chá preto, chá verde ou mate (chimarrão).
- ✗ **Caldo em cubo, tempero pronto, excesso de sal e frituras**.
- ✗ **Mamadeira e chuquinha**. Líquidos em copo; comida não vai na mamadeira. Se o bebê mama no peito, não precisa de outro leite.

- ✓ **Pode e deve**: comida caseira, frutas, ervas e temperos naturais, e **água filtrada** a partir dos 6 meses, em copo, nos intervalos das refeições.

No dia a dia

Quanto ele come?

No começo ele mais explora do que come: o leite materno segue como principal alimento e a comida pode vir logo depois da mamada. Sirva pouco e ofereça mais se pedir.

Fome e “chega”

Fome: abre a boca, inclina-se para a comida, pega ou aponta. **Chega**: vira o rosto, fecha a boca, empurra, perde o interesse. Respeite: sem forçar, sem prêmios e sem distrações.

Não gostou? Tente de novo

Pode levar 8 vezes ou mais até aceitar um alimento. Careta não é recusa. Ofereça outro dia, de outro jeito: cozido, assado, em pedaços.

Comer junto, sem telas

À mesa, com a família. Menores de 2 anos não devem usar TV, celular ou tablet. Converse, olhe, sorria. A bagunça faz parte do aprendizado!

Higiene

Lave as mãos (suas e do bebê), as frutas e as verduras. O que sobrou no prato não deve ser oferecido de novo. Comida caseira pronta: 3 dias na geladeira ou 10 dias no congelador.

Dentes e cocô

Desde o 1º dente, escove 2 vezes ao dia, principalmente antes de dormir, com pasta com flúor do tamanho de um grão de arroz. O cocô muda e pode trazer pedaços de comida ou casca de feijão: é normal.

Procure a equipe de saúde se...

- ❗ o bebê recusa quase tudo por vários dias ou está ganhando pouco peso;
- ❗ engasga ou tosse com frequência ao comer;
- ❗ há vômitos repetidos, diarreia com sangue ou sinais de alergia após comer;

- ❗ nasceu prematuro, tem doença crônica ou a família segue dieta vegetariana;
- ❗ você tem dúvidas, cansaço ou angústia com a alimentação. Não precisa esperar a consulta de rotina.
- ✓ Leve sempre a **Caderneta da Criança** às consultas.

ANOTAÇÕES DA UNIDADE

Unidade de saúde: _____ Profissional: _____ Telefone: _____

Próxima consulta: _____ Observações: _____

Base técnica: Ministério da Saúde, *Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos* (2019; versão resumida, 2021) · Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), *Guia Prático de Atualização n° 162: Alimentação complementar para o lactente saudável* (2024) · SBP, *Guia Prático de Atualização n° 3: A alimentação complementar e o método BLW* (2017) · SBP, orientações sobre engasgo e primeiros socorros em crianças (2025). Elaborado em setembro de 2026.