



数学实验

Experiments in Mathematics

实验6 非线性方程近似解

清华大学数学科学系

2000-10-27

1

非线性方程的特点

方程分类:

- 代数方程: $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0$;
- 超越方程: 包含超越函数(如 $\sin x$, $\ln x$)的方程;
- 非线性方程: $n(\geq 2)$ 次代数方程和超越方程。

方程根的特点:

- n 次代数方程有且只有 n 个根(包括复根、重根);
- 5次以上的代数方程无求根公式;
- 超越方程有无根, 有几个根通常难以判断。

2000-10-27

2



实验6的基本内容

1. 非线性方程 $f(x)=0$ 的数值解法:

- 迭代方法的基本原理;
- 牛顿方法.

2. 推广到解非线性方程组

3. 实际问题中非线性方程的数值解

2000-10-27

3

解方程 $f(x)=0$ 第一步——确定根的大致范围

• 作 $f(x)$ 图形, 观察 $f(x)$ 与 x 轴的交点


• 根的隔离: 二分法



二分法的原理

若对于 $a < b$, 有 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则在 (a, b) 内 $f(x)$ 至少有一个零点, 即 $f(x) = 0$ 至少有一个根。

二分法的实现



$f(x_0) > 0$



$a_1 = a, b_1 = x_0$

$f(x_0) < 0$



$a_1 = x_0, b_1 = b$

$(a, b) \Rightarrow (a_1, b_1) \Rightarrow \dots \Rightarrow (a_n, b_n) \Rightarrow \dots$

区间每次缩小一半, n 足够大时, 可确定根的范围

不足

2000-10-27

收敛速度较慢

4

迭代法

$$f(x) = x^2 + x - 14 = 0 \Rightarrow x = \varphi(x)$$

举例

$$f(3) = -2, f(4) = 6 \quad \text{存在根 } x \in (3, 4)$$

$$x = \varphi_1(x) = 14 - x^2, \text{ 迭代公式: } x_{k+1} = 14 - x_k^2$$

$$x = \varphi_2(x) = 14/(x+1), \text{ 迭代公式: } x_{k+1} = 14/(x_k + 1)$$

$$x = \varphi_3(x) = x - (x^2 + x - 14)/(2x + 1),$$

$$\text{迭代公式: } x_{k+1} = x_k - (x_k^2 + x_k - 14)/(2x_k + 1)$$

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
φ_1	3.0000	5.0000	-11.0000	-107.0000		
φ_2	3.0000	3.5000	3.1111	3.4054	3.1779	3.3510
φ_3	3.0000	3.2857	3.2749	3.2749	3.2749	3.2749


$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+14 \times 4}}{2}, x^* = \frac{-1 + \sqrt{57}}{2} \approx 3.2749$$

φ_1 根本不收敛; φ_2 虽呈现收敛趋势, 但很慢; φ_3 收敛很快。

迭代法的思路和几何解释

不动点 $x^* = \varphi(x^*)$


将原方程 $f(x) = 0$ 改写成容易迭代的形式 $x = \varphi(x)$, 选合适的初值 x_0 , 进行迭代: $x_{k+1} = \varphi(x_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$



$\{x_k\}$ 收敛于 x^*

2000-10-27

取决于曲线 $\varphi(x)$ 的斜率



$\{x_k\}$ 不收敛于 x^*

6

迭代法的收敛性

设 $y = \varphi(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 连续, 且 $a \leq y \leq b$, 若存在 $L < 1$ 使 $|\varphi'(x)| \leq L$, 则 $x = \varphi(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 有唯一解 x^* , 且

1) 对于 $x_0 \in (a, b)$, 迭代公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* ;

$$2) |x_{k+1} - x^*| \leq L|x_k - x^*|, \quad |x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|。$$

L 不易确定 \Rightarrow 放宽定理条件, 缩小初值范围

局部收敛性: 只要 $\varphi(x)$ 在 x^* 的一个邻域连续且 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 则对于该邻域内的任意初值 x_0 , 序列 $\{x_k\}$ 就收敛于 x^* 。

2000-10-27

7

迭代法的收敛速度 (收敛阶)

记 $e_k = x_k - x^*$, 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = c \neq 0$ (p 为一正数)

称序列 $\{x_k\}$ p 阶收敛。显然, p 越大收敛越快。

$$\varphi(x_k) = \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x_k - x^*) + \dots + \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}(x_k - x^*)^p + \dots$$

$$\Rightarrow e_{k+1} = \varphi'(x^*)e_k + \dots + \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}e_k^p + \dots$$

$\varphi'(x^*) \neq 0, \{x_k\}$ 1 阶收敛

$\varphi'(x^*) = \dots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0, \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0, \{x_k\}$ p 阶收敛

2000-10-27

8

迭代法的收敛速度 (收敛阶)

例题 $f(x) = x^2 + x - 14 = 0$

$$x = \varphi_2(x) = 14/(x+1)$$

$$\varphi'_2(x) = \frac{-14}{(x+1)^2}, \varphi'_2(x^*) \neq 0 \Rightarrow \{x_k\} \text{ 1阶收敛}$$

$$x = \varphi_3(x) = x - (x^2 + x - 14)/(2x + 1)$$

$$\varphi'_3(x) = \frac{2(x^2 + x - 14)}{(2x + 1)^2}, \varphi'_3(x^*) = 0,$$

$$\varphi''_3(x^*) \neq 0 \Rightarrow \{x_k\} \text{ 2阶收敛}$$

$\phi(x)$ 的构造
决定收敛速度

2000-10-27

9


牛顿 切线法

$f(x)$ 在 x_k 作 Taylor 展开, 去掉 2 阶及 2 阶以上项得

$$f(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

设 $f'(x_k) \neq 0$, 用 x_{k+1} 代替右端的 x , 由 $f(x) = 0$ 得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad \text{即令} \quad \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$



$$\varphi'(x^*) = \frac{f(x^*)f''(x^*)}{f'(x^*)^2}, \quad \varphi''(x^*) = \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)}$$

若 x^* 为单根

$$f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0, f''(x^*) \neq 0$$

$$\Rightarrow \varphi'(x^*) = 0, \varphi''(x^*) \neq 0$$

牛顿切线法 2 阶收敛

2000-10-27

10

牛顿切线法

若 x^* 为重根


$$f(x^*) = f'(x^*) = 0 \Rightarrow \varphi'(x^*) \neq 0$$

牛顿切线法1阶收敛

重数越高，收敛越慢

牛顿割线法

用差商 $\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$ 代替 $f'(x_k)$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$


收敛速度比牛顿切线法稍慢

x^* 为单根时收敛阶数是 1.618

2000-10-27

11

用MATLAB解非线性方程

牛顿法

需自行编制程序，如对切线法编写名为 的文件

多项式求根

当 $f(x)$ 为多项式时可用

输入多项式的系数（按降幂排列），输出
为 $f(x) = 0$ 的全部根；

输入 $f(x) = 0$ 的全部根，输出 为多项
式的系数（按降幂排列）；

输入多项式的系数（按降幂排列），输出
为多项式的微分的系数。

2000-10-27

12

求解 $\mathbf{f}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 的 文件

fun1.m是 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的m-函数文件， dfun1.m是 $\mathbf{f}'(\mathbf{x})$ 的m-函数文件

2000-10-27

13

解非线性方程组的牛顿法

解方程 $f(x) = 0$

$$f(x^{k+1}) = f(x^k) + f'(x^k)(x^{k+1} - x^k)$$

的牛顿切线法

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)}$$

推广到解方程组

$$F(x) = 0, \quad x = [x_1, \dots, x_n]^T, \quad F(x) = [f_1(x), \dots, f_n(x)]^T$$

$$\begin{aligned} f_i(x^{k+1}) &= f_i(x^k) + \frac{\partial f_i(x^k)}{\partial x_1} (x_1^{k+1} - x_1^k) \\ &+ \dots + \frac{\partial f_i(x^k)}{\partial x_n} (x_n^{k+1} - x_n^k), \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

2000-10-27

14

$$F(x) = 0, \quad x = [x_1, \dots, x_n]^T, \quad F(x) = [f_1(x), \dots, f_n(x)]^T$$

$$F'(x) = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right]_{n \times n} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

解方程 $f(x) = 0$

$$f(x^{k+1}) = f(x^k) + f'(x^k)(x^{k+1} - x^k)$$

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)}$$

$$F(x^{k+1}) = F(x^k) + F'(x^k)(x^{k+1} - x^k)$$

$$x^{k+1} = x^k - [F'(x^k)]^{-1} F(x^k)$$

$$\Rightarrow F'(x^k) \Delta x^k = -F(x^k)$$

$$x^{k+1} = x^k + \Delta x^k$$

2000-10-27

15

例 解 $x_1^2 + x_2^2 = 4, \quad x_1^2 - x_2^2 = 1$

$$F(x) = \begin{bmatrix} x_1^2 + x_2^2 - 4 \\ x_1^2 - x_2^2 - 1 \end{bmatrix}, \quad F'(x) = 2 \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1 & -x_2 \end{bmatrix}$$

$$F'(x^k) \Delta x^k = -F(x^k), \quad x^{k+1} = x^k + \Delta x^k, \quad k = 0, 1, \dots$$

$$\text{取 } x^0 = (1, 1)^T$$

$$\text{精确解 } x = (\sqrt{5/2}, \sqrt{3/2})^T \\ = (1.58113883, 1.22474487)^T$$

也可用solve函数求解

2000-10-27

k	x^k
0	(1.000000, 1.000000)
1	(1.750000, 1.250000)
2	(1.589286, 1.225000)
3	(1.581160, 1.224645)
4	(1.581139, 1.224745)
5	(1.581139, 1.224745)

16

解方程 $f(x)=0$ 的牛顿割线法

$$f(x^{k+1}) = f(x^k) + a^k(x^{k+1} - x^k)$$

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{a^k}$$

$$a^k = \frac{f(x^k) - f(x^{k-1})}{x^k - x^{k-1}}$$

解方程组的拟牛顿法——用 A^k 代替 $F'(x^k)$

$$\text{使 } A^k \text{ 满足 } A^k(x^k - x^{k-1}) = F(x^k) - F(x^{k-1})$$

矩阵 A^k (n^2 个未知数) 不能由这样的 n 个方程确定

用迭代方法 $A^k = A^{k-1} + \Delta A^{k-1}$ (ΔA 有不同的构造) 计算 A^k

$$\text{再求 } x^{k+1} = x^k - (A^k)^{-1} F(x^k)$$

2000-10-27

17

实例1 - 疾病的传染

- 描述传染病的传播过程

- 分析被传染人数的变化规律

- 寻求预防传染病蔓延的手段

模型
假设

1) 总人数 N 不变, 健康人和病人的比例分别为 $x(t)$, $y(t)$

2) 每个病人每天有效接触人数为 a , 且使接触的健康人致病

$a \sim$ 日接触率

3) 病人每天治愈的比例为 b

$b \sim$ 日治愈率

4) 病愈后免疫, 人数比例为 $z(t)$

2000-10-27

18

模型建立 $x(t)$ ~健康人, $y(t)$ ~病人, $z(t)$ ~病愈免疫

$$x(t) + y(t) + z(t) = 1 \quad a \sim \text{日接触率} \quad b \sim \text{日治愈率}$$

$$N[x(t + \Delta t) - x(t)] = -ax(t)Ny(t)\Delta t$$

$$N[y(t + \Delta t) - y(t)] = [ax(t)Ny(t) - bNy(t)]\Delta t$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -axy & \frac{dy}{dt} &= axy - by \\ x(0) &= x_0 & y(0) &= y_0 \end{aligned}$$

无法求出 $x(t), y(t)$ 解析解

2000-10-27

19

模型建立

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -axy & \frac{dy}{dt} &= axy - by \\ x(0) &= x_0 & y(0) &= y_0 \end{aligned}$$

消去 dt 得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sigma x} - 1, \quad \sigma = a/b$$

 $a \sim$ 日接触率 $b \sim$ 日治愈率 $1/b \sim$ 传染期 $\sigma \sim$ 接触数 (传染期内一个病人平均接触人数)

2000-10-27


20

模型
求解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sigma x} - 1 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{x}{x_0} - x + (x_0 + y_0)$$

$$y(x = x_0) = y_0$$

设日接触率 $a=1$, 日治愈率 $b=0.3$, 开始时健康人与病人比例分别为 $x_0 = 0.98$, $y_0 = 0.02$, 作 $y(x)$ 图形——相轨线



2000-10-27

21

结果分析

$$\frac{dx}{dt} = -axy \quad \frac{dy}{dt} = axy - by$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sigma x} - 1$$

$$y = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{x}{x_0} - x + (x_0 + y_0)$$


1) 求健康人未被传染的比例, 并计算病人比例最大值

$$t \rightarrow \infty, y \rightarrow 0, x \rightarrow x_\infty$$

健康人未被传染的比例 x_∞ 是以下方程的解

$$\frac{1}{\sigma} \ln \frac{x}{x_0} - x + (x_0 + y_0) = 0$$

病人比例最大值 y_m 在点 $x = 1/\sigma$ 取得



2000-10-27

22

$$y = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{x}{x_0} - x + (x_0 + y_0)$$



bing

设 $a = 1, b = 0.3,$
 $x_0 = 0.98, y_0 = 0.02$

得到 $x_\infty = 0.0399, y_m = 0.3449$

2000-10-27

23

- 2) 当提高卫生水平使日接触率降低为 $a = 0.6$ 时, 结果如何。
 进一步改进医疗条件使日治愈率提高到 $b = 0.5$, 结果又如何。
 3) 如果在传染病蔓延前采取接种疫苗的办法, 使初始时刻易感染者 (健康人) 的比例降低为 $x_0 = 0.70$, 结果会发生什么变化。

a	b	x_0	y_0	x_∞	y_m
1	0.3	0.98	0.02	0.0399	0.3449
0.6	0.3	0.98	0.02	0.1965	0.1635
0.6	0.5	0.98	0.02	0.6245	0.0316
1	0.3	0.70	0.02	0.0840	0.1658
0.6	0.3	0.70	0.02	0.3056	0.0518
0.6	0.5	0.70	0.02	0.6233	0.0200

2000-10-27

$a \downarrow, b \uparrow \Rightarrow x_\infty \uparrow, y_m \downarrow$

$x_0 \downarrow \Rightarrow x_\infty \uparrow, y_m \downarrow$


24

相轨线 $y(x)$ 分析

$$\begin{cases} \dot{y} = axy - by \\ \dot{x} = -axy \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sigma x} - 1 \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

$$y = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{x}{x_0} - x + (x_0 + y_0)$$

$x = 1/\sigma, y = y_m$ (最大值)



$x_0 > 1/\sigma \Rightarrow y(t)$ 先升后降至 0 (如 P_1) \Rightarrow 传染病蔓延

$x_0 < 1/\sigma \Rightarrow y(t)$ 单调降至 0 (如 P_2) \Rightarrow 传染病不蔓延

2000-10-27

25

预防传染病蔓延的手段

传染病不蔓延的条件—— $x_0 < 1/\sigma$

• 提高阈值 $1/\sigma \Rightarrow \sigma (= a/b) \downarrow \Rightarrow a \downarrow, b \uparrow$

a (日接触率) $\downarrow \Rightarrow$ 卫生水平 \uparrow


b (日治愈率) $\uparrow \Rightarrow$ 医疗水平 \uparrow

• 降低 x_0 ($x_0 + y_0 + z_0 = 1$) $\Rightarrow z_0 \uparrow \Rightarrow$ 群体免疫

2000-10-27

26

实例2 - 门的气压控制



在绝热条件下，气体的压强 p 和体积 v 满足 $pv^\gamma = c$ ，其中 γ 是绝热系数， c 是常数。

设 $a=0.8\text{m}$, $b=0.25\text{m}$, $r=0.04\text{m}$, $l_0=0.5\text{m}$, $p_0=10^4\text{N/m}^2$, $\gamma=1.4$, $F=25\text{N}$, 求 α 。

2000-10-27

27

门的气压控制

开门力矩为 $M_l = Fa \cos \alpha$

气体的压强为 p ，体积为 v ，并记活塞的面积为 s ，则气体作用在活塞上的力矩为

$$M_g = psb$$

$$\therefore Fa \cos \alpha = psb$$

$$\therefore pv^\gamma = p_0 v_0^\gamma$$

$$\therefore p = p_0 \left(\frac{v_0}{v} \right)^\gamma = p_0 \left(\frac{l_0}{l_0 - c} \right)^\gamma$$

注意到 $c = b \cdot \tan \alpha$ ， $s = \pi r^2$ ，得

$$Fa \cos \alpha = \pi r^2 b p_0 \left(\frac{l_0}{l_0 - b \tan \alpha} \right)^\gamma$$

$$f(\alpha) = Fa \cos \alpha (l_0 - b \tan \alpha)^\gamma - \pi r^2 b p_0 l_0^\gamma = 0$$

2000-10-27

28

门的气压控制 $f(\alpha) = Fa \cos \alpha (l_0 - b \tan \alpha)^\gamma - \pi r^2 b p_0 l_0^\gamma = 0$

$a = 0.8, b = 0.25, r = 0.04, l_0 = 0.5$

$p_0 = 10000, \gamma = 1.4, F = 25$



MATLAB 5.3.1 nk

newton2

用牛顿割线法解方程

newton2(0.1, 0.3, 10, 1e-4)

得到结果: α (弧度) 0

2000-10-27

29



布置“非线性方程近似解”实验

目的

1) 用MATLAB软件掌握求解非线性方程的迭代法和牛顿法，并对结果作初步分析；

2) 通过实例练习用非线性方程求解的实际问题。

内容

P172 1); 7)

2000-10-27

30