

Álgebra Lineal I

Tarea 08

Rubén Pérez Palacios
Profesor: Rafael Herrera Guzmán

02 Marzo 2020

Problemas

1. Sea $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P_3(\mathbb{R})$, entonces $T(p(x)) = p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$.
Ahora sabemos que

$$A[p]_{\beta} = [p']_{\gamma},$$

como la siguiente matriz cumple la igualdad y es única entonces

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ahora veamos que

2. Respuestas

a) Veamos que

$$\begin{aligned} (a_1, a_2) &= a_1(1, 0) + a_2(0, 1) &= a_1e_1 + a_2e_2 \\ (b_1, b_2) &= b_1(1, 0) + b_2(0, 1) &= b_1e_1 + b_2e_2 \end{aligned}$$

por lo que la matriz que buscamos es

$$Q = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}.$$

b) Veamos que

$$\begin{aligned} 3(2, 5) + 5(-1, -3) &= (1, 0) = e_1 \\ -1(2, 5) - 2(-1, -3) &= (0, 1) = e_2 \end{aligned}$$

Por lo tanto la matriz que buscamos es

$$Q = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

3. Para los siguientes ejercicios queremos encontrar una matriz de la siguiente forma

$$Q = \begin{pmatrix} q_0 & q_3 & q_6 \\ q_1 & q_4 & q_7 \\ q_2 & q_5 & q_8 \end{pmatrix}$$

a) Los coeficiente de la matriz Q deben cumplir

$$a_2x^2 + a_1x + a_0 = q_0x^2 + q_1x + q_2$$

$$b_2x^2 + b_1x + b_0 = q_3x^2 + q_4x + q_5$$

$$c_2x^2 + c_1x + c_0 = q_6x^2 + q_7x + q_8$$

por lo tanto la matriz Q que buscamos es

$$Q = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_0 & b_0 & c_0 \end{pmatrix}$$

b) Los coeficiente de la matriz Q deben cumplir

$$a_2x^2 + a_1x + a_0 = q_0 + q_1x + q_2x^2$$

$$b_2x^2 + b_1x + b_0 = q_3 + q_4x + q_5x^2$$

$$c_2x^2 + c_1x + c_0 = q_6 + q_7x + q_8x^2$$

por lo tanto la matriz Q que buscamos es

$$Q = \begin{pmatrix} a_0 & b_0 & c_0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$$

4. Respuestas

a) Sea Q tal que

$$Q = \begin{pmatrix} q_0 & q_2 \\ q_1 & q_3 \end{pmatrix},$$

entonces tenemos que

$$1 + x = q_0 + xq_1,$$

$$1 - x = q_2 + xq_3,$$

por lo tanto

$$q_0 = q_1 = q_2 = 1, \quad q_3 = -1.$$

Concluimos que

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) Sea Q^{-1} tal que

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} q_0 & q_2 \\ q_1 & q_3 \end{pmatrix},$$

luego veamos que

$$Q^{-1}Q = \begin{pmatrix} q_0 + q_1 & q_0 - q_1 \\ q_2 + q_3 & q_2 - q_3 \end{pmatrix}.$$

Por definición de matriz inversa tenemos que

$$Q^{-1}Q = I_2,$$

por lo tanto

$$q_0 + q_1 = 1, q_0 - q_1 = 0, q_2 + q_3 = 0, q_2 - q_3 = 1,$$

con lo que concluimos que

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

c) Sea $p(x) = ax + b$, entonces $T(p(x)) = p'(x) = b$. Luego sabemos que

$$A[p]_{\beta} = A[p']_{\beta},$$

si

$$A = \begin{pmatrix} t_0 & t_1 \\ t_2 & t_3 \end{pmatrix}$$

entonces

$$aq_0 + bq_1 = b, \quad aq_2 + bq_3 = 0.$$

Por lo tanto

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ahora también sabemos que

$$B[p]_{\beta} = B[p']_{\beta},$$

si

$$B = \begin{pmatrix} t_0 & t_1 \\ t_2 & t_3 \end{pmatrix}$$

entonces

$$\frac{a+b}{2}q_0 + \frac{a-b}{2}q_1 = b, \quad \frac{a+b}{2}q_2 + \frac{a-b}{2}q_3 = 0.$$

Por lo tanto

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$