

흡입제 정확하게 사용하기

천식·만성폐쇄성폐질환 환자를 위한 정량분무식 흡입기(pMDI) 사용 안내

충북대학교병원 알레르기내과 · CAMCA 평가 시스템

흡입제, 왜 정확하게 사용해야 할까요?

흡입제는 천식과 만성폐쇄성폐질환 치료의 가장 핵심적인 약물입니다. 입으로 약을 들이마시기 때문에 약이 직접 폐에 도달해 빠르고 효과적으로 작용합니다.

그러나 흡입 방법이 잘못되면 약물의 절반 이상이 입과 목에만 남고 정작 폐에는 거의 도달하지 못합니다. 국제 연구(Sanchis 2016, CRITIKAL 2017)에 따르면 흡입제 사용자의 약 70%가 한 가지 이상의 중요한 오류를 범하고 있습니다.

특히 다음 세 가지 오류는 약효를 무효화할 만큼 치명적입니다.

통을 누른 다음 들이마시기 시작 — 약이 입 안에만 머물러 폐에 거의 도달하지 못함

들이마시는 도중 흡입기에 숨을 내쉬기 — 약이 분사되지 못하거나 손실됨

들이마신 후 숨을 참지 않고 바로 내쉬기 — 약이 폐에 침착되기 전에 빠져나감

정확한 흡입법은 약 처방만큼이나 중요합니다. 다음 페이지의 7단계를 익히시면 약효를 최대로 끌어올릴 수 있습니다.

pMDI 정확한 사용법 — 7단계

각 단계를 거울 앞에서 한 번씩 따라해 보세요. 처음에는 어색하지만 몇 번 연습하면 자연스러워집니다.

1

흡입기를 흔드세요

흡입기를 손에 잡고 위아래로 4~5번 충분히 흔들어 약을 골고루 섞습니다.

Tip: 강하게 흔들어야 약이 통 안에서 잘 섞입니다.

2

뚜껑을 열고 살펴봅니다

흡입기 마우스피스 뚜껑을 열고 안쪽에 이물질이 없는지 확인합니다.

Tip: 가끔 사용 사이에 작은 부스러기가 들어갈 수 있어요.

3

숨을 천천히 내쉽니다

흡입기를 입에서 멀리 두고 편하게 숨을 끝까지 내쉽니다. 흡입기 쪽으로 숨을 불지 마세요.

Tip: 폐를 비워야 약이 들어갈 공간이 생깁니다.

4

마우스피스를 입에 물고 입술을 다물입니다

마우스피스를 치아 사이에 두고 입술을 단단히 다물어 공기가 새지 않도록 합니다. 혀는 마우스피스를 막지 않게 평평하게 둡니다.

Tip: 입술에 살짝 힘이 들어갈 정도로 다무세요.

5

들이마시기 시작과 동시에 통을 누릅니다

천천히 깊게 숨을 들이마시기 시작하는 바로 그 순간, 흡입기의 통을 한 번 누릅니다. 이 단계가 가장 중요합니다.

Tip: '들이마신 다음 누른다'가 아니라 '들이마시면서 동시에 누른다'입니다.

6

천천히 깊게 끝까지 들이마십니다

통을 누른 후에도 4~5초간 천천히 깊게 계속 들이마셔서 폐를 가득 채웁니다.

Tip: 빠르게 한 번에 들이마시는 것이 아니라 풍선을 천천히 부풀리듯 합니다.

7

10초간 숨을 참고 천천히 내쉽니다

흡입기를 입에서 떼고 약 10초간 (속으로 1부터 10까지 천천히 셈) 숨을 참습니다. 그런 다음 천천히 입술을 모아 내쉽니다.

Tip: 숨 참기가 길수록 약이 폐에 더 잘 침착됩니다.

스테로이드 흡입제(ICS)를 사용하신다면

스테로이드 흡입제(예: 풀미코트, 후릭소타이드)를 사용하신 후에는 반드시 물로 입을 헹구고 뱉어 주세요. 입과 목에 남은 약이 곰팡이감염(아구창)이나 목소리 변화를 일으킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 흡입제를 사용하고 나서 효과가 바로 느껴지지 않아요. 한 번 더 사용해도 되나요?

A. 처방받은 횟수와 간격을 꼭 지켜 주세요. 효과가 나타나기까지 시간이 걸리는 약이 있고, 추가 흡입은 부작용 위험을 높일 수 있습니다. 효과가 부족하다고 느끼면 의료진과 먼저 상의해 주세요.

Q. 흡입기를 매번 흔들어야 하나요?

A. 대부분의 분무식 흡입기는 사용 전 흔들어 주는 것이 필요합니다. 단, 일부 용액형 흡입기는 흔들 필요가 없으니 본인의 흡입기 설명서를 확인하세요.

Q. 스페이서(보조 기구)는 꼭 써야 하나요?

A. 스페이서는 어린이, 노인, 또는 흡입 협조가 어려운 분에게 강력히 권장됩니다. 약물이 폐로 더 잘 도달하게 해주고 부작용(목소리 변화, 구강 칸디다증)도 줄여줍니다.

Q. 흡입기 잔량은 어떻게 확인하나요?

A. 최신 pMDI는 보통 상단에 카운터가 있어 남은 횟수를 표시합니다. 카운터가 없는 흡입기는 처방 일자와 1일 사용량을 기반으로 추적해 주세요. 물에 띄우는 방법은 정확하지 않으므로 추천하지 않습니다.

Q. 잘못 사용했을까 봐 걱정돼요.

A. 걱정 마세요. 흡입 기술은 누구나 처음에는 익숙하지 않습니다. 정기적인 외래에서 의료진이 함께 점검해 드려니, 평가 결과가 완벽하지 않더라도 꾸준한 연습이 가장 중요합니다.

마지막으로

흡입제 사용법은 처음부터 완벽할 수 없습니다. 의료진과 함께 한 단계씩 익혀가시면 어느새 자연스럽게 정확한 방법으로 사용하실 수 있습니다. 평가 결과에 너무 실망하지 마시고, 보완이 필요한 한두 단계만 집중해서 연습해 보세요. 작은 개선이 모여 폐 건강을 지킵니다. 응원합니다.