

MAE116 – Noções de Estatística

Grupo A - 1 semestre de 2012

Exercícios de revisão

Exercício 1.

Um produtor de laranjas guardou as frutas colhidas de cada árvore em caixas separadas para estudar o número de laranjas por caixa (ou por árvore). Após um dia de colheita, 20 caixas foram contadas e os resultados brutos, após ordenação, são: 22, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 43, 43, 44, 48, 48, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 67 e 69.

- (a) Calcule a mediana, Q_1 e Q_3 .

Resposta:

$$\text{mediana} = (44 + 48) / 2 = 46$$

$$Q_1 = (35 + 37) / 2 = 36$$

$$Q_3 = (55 + 57) / 2 = 56$$

□

- (b) Calcule o intervalo interquartil e determine pontos atípicos.

Resposta:

O intervalo interquartil é $J = Q_3 - Q_1 = 20$ e, portanto, os limites inferiores e superiores são $Q_1 - 1,5J = 6$ e $Q_3 + 1,5J = 86$. Logo, não existem pontos atípicos. □

- (c) O *boxplot* para a variável número de laranjas é apresentado na Figura 1. Comente.

Resposta:

Observa-se que não existem pontos atípicos. Note que a mediana está um pouco mais perto do terceiro quartil do que do primeiro quartil, indicando uma leve assimetria. □

Exercício 2.

O custo mensal de manutenção de determinado modelo de automóvel (excluindo-se combustível e trocas de óleo) está sendo analisado em função da idade do veículo. Nove automóveis fabricados em diferentes anos tiveram o custo averiguado. Os dados obtidos foram:

Idade do veículo (em anos)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Custo mensal (em reais)	8	13	18	15	24	26	25	32	33


- (a) Observe o diagrama de dispersão apresentado na Figura 2. Interprete o relacionamento entre as variáveis idade do veículo e custo mensal.

MAE116 – Noções de Estatística

Grupo A - 1 semestre de 2012

Exercícios de revisão

Figura 1: *Boxplot para a variável número de laranjas.*




Resposta:

Observa-se que conforme aumenta a idade do veículo, o custo mensal tende a aumentar.

Nota-se também uma tendência linear.

Figura 2: *Diagrama de dispersão entre as variáveis idade do veículo (em anos) e custo mensal (em reais).*



MAE116 – Noções de Estatística

Grupo A - 1 semestre de 2012

Exercícios de revisão

□

- (b) O coeficiente de correlação linear de Pearson entre idade do veículo e custo mensal é 0,97.
Comente.

Resposta:

O coeficiente de correlação indica forte correlação linear positiva entre as variáveis idade do veículo e custo mensal.

□

- (c) A reta de regressão ajustada entre as variáveis, Y : custo mensal X : idade do veículo é dada por

$$\hat{Y}_i = 6,39 + 3,03X_i, \quad i = 1, \dots, 9.$$

Interprete o valor do coeficiente angular “ b ” da reta ajustada.

Resposta:

Para um aumento de um ano na idade do veículo, o custo mensal aumenta, em média, 3,03 reais.

□

- (d) Considerando a reta ajustada em (c), estime o custo mensal esperado para um veículo com 4,5 anos.

Resposta:

O custo mensal esperado para um veículo com 4,5 anos é dado por:

$$\hat{Y} = 6,39 + 3,03 \cdot 4,5 = 20,025 \quad \text{reais.}$$

□

MAE116 – Noções de Estatística

Grupo A - 1 semestre de 2012

Exercícios de revisão

Exercício 3.

Uma determinada peça é manufaturada por 3 fábricas: A, B e C. Sabe-se que A produz o dobro de peças que B e que B e C produzem o mesmo número de peças. Sabe-se ainda que 2% das peças produzidas por A e por B são defeituosas, enquanto que 4% das produzidas por C são defeituosas. Todas as peças produzidas são misturadas e colocadas em um depósito. Do depósito é retirada uma peça ao acaso.

- (a) Qual a probabilidade de que ela seja defeituosa?

Resposta:

Considerem-se os seguintes eventos:

D : A peça é defeituosa

A : A peça provém da fábrica A

B : A peça provém da fábrica B

C : A peça provém da fábrica C

Tem-se então que: $P(A) = 50\%$, $P(B) = P(C) = 25\%$, uma vez que só existem as 3 fábricas e que A produz o dobro de B e esta por sua vez produz a mesma quantidade que C. Sabe-se também que $P(D|A) = P(D|B) = 2\%$ e que $P(D|C) = 4\%$. Então pode-se escrever que: $P(D) = P(D \cap A) + P(D \cap B) + P(D \cap C) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C) = 0,5 \times 0,02 + 0,25 \times 0,02 + 0,25 \times 0,04 = 0,025$ isto, é 2,5%. \square

- (b) Qual é a probabilidade de ter sido produzida pela máquina A, dado que a peça é defeituosa?

Resposta:

$$\begin{aligned} P(A|D) &= \frac{P(A \cap D)}{P(D)} \\ &= \frac{P(A)P(D|A)}{P(D)} \\ &= \frac{0,50 \times 0,02}{0,5 \times 0,02 + 0,25 \times 0,02 + 0,25 \times 0,04} \\ &= 0,40 \end{aligned}$$

Logo, 40% das peças defeituosas são produzidas pela fábrica A. \square

MAE116 – Noções de Estatística

Grupo A - 1 semestre de 2012

Exercícios de revisão

Exercício 4.

De acordo com o último censo, 20% das famílias de uma região vivem abaixo da linha da pobreza. A seguir as probabilidades da distribuição binomial para $n = 12$ e $p = 0,2$.

```
> .Table
      Pr
0 6.871948e-02
1 2.061584e-01
2 2.834678e-01
3 2.362232e-01
4 1.328756e-01
5 5.315022e-02
6 1.550215e-02
7 3.321889e-03
8 5.190451e-04
9 5.767168e-05
10 4.325376e-06
11 1.966080e-07
12 4.096000e-09
```

(a) Uma amostra aleatória de 12 famílias é selecionada

i). Calcule a probabilidade de que pelo menos 2 vivam abaixo da linha de pobreza

Resposta:

Seja X a variável aleatória que conta o número de famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. Então entre as 12 selecionadas, $X \sim \text{Bin}(12; 0,2)$. Logo,

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) \\ &= 1 - 0,069 - 0,206 \\ &= 0,725 \end{aligned}$$

□

ii). Calcule a probabilidade de que entre 2 e 4 (inclusive) vivam abaixo da linha de pobreza

Resposta:

MAE116 – Noções de Estatística

Grupo A - 1 semestre de 2012

Exercícios de revisão

$$\begin{aligned}P(2 \leq X \leq 4) &= P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) \\&= 0,283 + 0,236 + 0,133 \\&= 0,652\end{aligned}$$

□

- (b) Uma amostra de 80 famílias é selecionada. Calcule a probabilidade de menos de 10 famílias viverem abaixo da linha da pobreza.

Resposta:

Seja, X : número de famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, entre as 80 selecionadas, então, $X \sim \text{Bin}(80; 0,2)$. Dados os valores de n e p pode ser usada a aproximação normal para calcular as probabilidades.

Verificando: $np = 80 \cdot 0,2 = 16$. Assim, X segue aproximadamente uma distribuição normal com média $\mu = np = 16$ e desvio padrão $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{80 \cdot 0,2 \cdot 0,8} = 3,578$.

Aproximando a distribuição binomial pela distribuição normal, a probabilidade de menos de 10 famílias amostradas viverem abaixo da linha da pobreza é:

$$\begin{aligned}P(X < 10) = P(X \leq 9) &\approx P\left(Z < \frac{9 - 16}{3,578}\right) \\&= P(Z < -1,96) \\&= 1 - P(Z < 1,96) \\&= 1 - 0,975 \\&= 0,025\end{aligned}$$

□

Exercício 5.

Pacientes, sofrendo de certa moléstia, são submetidos a um tratamento intensivo cujo tempo de cura foi modelado por uma distribuição normal de média 15 e desvio padrão 2 (em dias).

MAE116 – Noções de Estatística

Grupo A - 1 semestre de 2012

Exercícios de revisão

- (a) Qual é a proporção de pacientes que demoram mais de 17 dias para se recuperar?

Resposta:

Seja a variável X : tempo de cura do paciente. Logo, a proporção de pacientes que demoram mais de 17 dias em se recuperar é

$$P(X > 17) = P\left(\frac{X - 15}{2} > \frac{17 - 15}{2}\right) = P(Z > 1) = 0,1587.$$

□

- (b) Qual é a probabilidade de que um paciente, escolhido ao acaso, apresente tempo de cura inferior a 20 dias?

Resposta:

$$P(X < 20) = P\left(\frac{X - 15}{2} < \frac{20 - 15}{2}\right) = P(Z < 2,5) = 0,9938.$$

□

- (c) Qual é o tempo máximo necessário para a recuperação de 25% dos pacientes?

Resposta:

Temos que calcular o valor de t tal que $P(X < t) = 0,25$. Então,

$$P\left(\frac{X - 15}{2} < \frac{t - 15}{2}\right) = 0,25$$

e

$$\frac{t - 15}{2} = -0,67 \implies t = 13,66,$$

isto é, o 25% dos pacientes ficarão curados antes de, aproximadamente, 14 dias.

□