BỘ Y TẾ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2879 /QĐ-BYT	----------

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng chuyên môn nghiệm thu "Nguyên tắc và ký hiệu các chế độ ăn trong bệnh viện" ngày 31 tháng 5 năm 2006;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện" gồm 103 nguyên tắc, ký hiệu về chế độ ăn.

Điều 2. "Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện" là tài liệu hướng dẫn về xây dựng chế độ ăn cho người bệnh được áp dụng trong các viện, bệnh viện có giường bệnh của nhà nước và tư nhân trong toàn quốc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế; Chánh thanh tra và Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các cục của Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Dinh dưỡng; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các viện, bệnh viện

trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

BỘ Y TẾ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
CHẾ ĐỘ ĂN BỆNH VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2879/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phần I
NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN BỆNH VIỆN

1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng dựa theo:
   - Người lớn và trẻ em.
   - Tình trạng bệnh lý.
   - Tình trạng dinh dưỡng (thể lực và sinh hóa).
2. Xác định cân nặng (cân nặng thực tế, cân nặng lý tưởng, cân nặng khô).
3. Xác định nguyên tắc lựa chọn thực phẩm.
4. Xác định số bữa ăn và đường nuôi dưỡng.

Phần II
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN CỤ THỂ

A. CHẾ ĐỘ ĂN CHO NGƯỜI LỚN

Cơ cấu khẩu phần: Được xây dựng trên cơ sở cơ cấu khẩu phần trung bình của người có cân nặng 50 đến 55 kg (đây là cơ cấu khẩu phần tham khảo)

V nước = V nước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy...) + 300 đến 500 ml (tùy theo mùa). + Kali: Hạn chế kali khẩu phần khi kali máu >6 mmol/l (2000-3000 mg/ngày). - Phosphat 600-1200mg/ngày khi phosphat máu >6 mg/dl. Hạn chế các thực phẩm giàu phosphat. - Đủ vitamin và chất khoáng. - Số bữa ăn: 4 bữa/ngày.	Nước (l): 1-1,5	

III. CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

1. Đái tháo đường đơn thuần:

Nguyên tắc	*Cơ cấu khẩu phần*	*Ký hiệu*
- Năng lượng: 30 kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày. - Protid: 15- 20% tổng năng lượng. - Glucid: 55- 65% tổng năng lượng. Nên sử dụng các glucid phức hợp, glucid có chỉ số đường huyết thấp. - Lipid: 20- 30% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid. - Lượng chất xơ: 20- 25 g. - Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.	E (kcal): 1500- 1700 P (g): 56- 82 L (g): 25- 55 G (g): 210- 270 Chất xơ (g): 20- 25	DD01-X

2. Đái tháo đường BMI > 25, rối loạn chuyển hóa lipid máu:

Nguyên tắc	*Cơ cấu khẩu phần*	*Ký hiệu*

- Năng lượng: 25 kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày. - Protid: 15- 20% tổng năng lượng. - Glucid: 55- 65 % tổng năng lượng. Nên sử dụng các glucid phức hợp, glucid có chỉ số đường huyết thấp. - Lipid: 20- 25%. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid. - Cholesterol: < 200 mg/ngày. Hạn chế sử dụng các sản phẩm có nhiều cholesterol. - Lượng chất xơ: 20-25 g. - Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày.	E (kcal): 1300- 1400 P (g): 50- 70 L (g): 20- 40 G (g): 180- 230 Chất xơ (g): 20 -25 Cholesterol(mg):<200	DD02-X

3. Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận, thể urê máu cao:

Nguyên tắc	*Cơ cấu khẩu phần*	*Ký hiệu*
- Năng lượng: 30 Kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày. - Protid: < 0,6 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày. Tỷ lệ protid động vật/tổng số > 60%. - Glucid: 60-65% tổng năng lượng, nên sử dụng các glucid phức hợp, glucid có chỉ số đường huyết thấp. - Lipid: Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid. - Đảm bảo cân bằng nước và điện giải: + Ăn nhạt tương đối: Natri ≤ 2000 mg/ngày. + Hạn chế nước ăn và uống khi có chỉ định: V nước = V nước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy...) + 300 đến 500 ml (tùy theo mùa). + Kali: < 1000 mg/ngày. Hạn chế các thực phẩm giàu kali. - Đủ vitamin và khoáng chất theo nhu cầu. - Số bữa ăn: 4-6 bữa/ngày.	E (kcal): 1500- 1700 P (g): < 33 L (g): 45- 60 G (g): 225- 276 Natri (mg): ≤ 2000 Kali (mg): < 1000 Nước (l): 1- 1,5	DD03-X

6.	Suy thận cấp, giai đoạn lọc máu (ngoài thận và màng bụng)	TN06-X
7.	Suy thận mạn, giai đoạn 1-2	TN07-X
8.	Suy thận mạn, giai đoạn 3- 4 không lọc máu, không tăng kali máu	TN08-X
9.	Suy thận mạn giai đoạn 3- 4 không lọc máu, tăng kali máu	TN09-X
10.	Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc 3 lần/tuần	TN10-X
11.	Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc 2 lần/tuần	TN11-X
12.	Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc 1 lần/tuần	TN12-X
13.	Hội chứng thận hư không có tổn thương cầu thận tối thiểu:	TN13-X
14.	Hội chứng thận hư có tổn thương cầu thận tối thiểu hoặc mức lọc cầu thận < 60 ml/phút	TN14-X
III	**CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG**	**DD**
1.	Đái đường đơn thuần	DD01-X
2.	Đái tháo đường BMI > 25, rối loạn chuyển hóa lipid máu	DD02-X
3.	Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận, thể urê máu cao	DD03-X
4.	Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận, thể cao huyết áp	DD04-X
5.	Đái tháo đường kết hợp viêm cầu thận, giai đoạn phục hồi	DD05-X
6.	Đái tháo đường kết hợp suy thận mạn độ 1-2	DD06-X
7.	Đái tháo đường kết hợp suy thận mạn độ 3- 4	DD07-X
8.	Đái tháo đường kết hợp với suy tim 3-4	DD08-X
9.	Đái tháo đường kết hợp với gút	DD09-X
IV.	**CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH GÚT**	**GU**
1	Bệnh gút đơn thuần	GU01-X
2	Bệnh gút có kết hợp với suy thận mạn độ 1, 2	GU02-X
3	Bệnh gút có kết hợp với suy thận mạn độ 3, 4	GU03-X
V.	**CHẾ ĐỘ ĂN CHO CÁC BỆNH TIM MẠCH**	**TM**
1.	Tăng huyết áp	TM01-X