


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

BIOLOGIA B

biologia B

aula 1 Células: as unidades estruturais e fundamentais dos seres vivos

A célula como componente do corpo não é só uma unidade visivelmente demarcada, mas uma unidade de vida centrada em si mesma. Dirige sua própria vida [...] *A célula é uma unidade de vida, e nossa vida, que por sua vez é uma vida unitária, consiste totalmente de vidas celulares.*

Erwin Schrödinger. *O que é vida? Aspecto físico da célula viva. Seguido de mente e matéria e fragmentos autobiográficos*. São Paulo: Unesp, 1997.

Com exceção dos vírus, todos os seres vivos são constituídos por unidades básicas chamadas *células*.

Nos organismos multicelulares, as células arranjam-se hierarquicamente para formar os tecidos. Por exemplo, os meristemas de crescimento, nos vegetais, e os ossos, nos animais. Os tecidos, por sua vez, reúnem-se para formar órgãos como a raiz, num vegetal, ou o esqueleto, num animal. Os órgãos, trabalhando em conjunto, formam os sistemas ou aparelhos do corpo (sistemas de transporte da seiva bruta e elaborada, no vegetal, ou o sistema locomotor e muscular, no animal). Todos juntos compõem o ser vivo. A responsabilidade funcional das células diz respeito à fotossíntese, à respiração, à excreção, à reprodução etc.

Para conhecer os mecanismos que sustentam e mantêm a vida dos seres vivos, é necessário compreender a unidade que os compõe e seu ambiente. Por isso, neste caderno e nos demais, estudaremos a célula.

Os padrões celulares

Com o aprimoramento das técnicas microscópicas, identificaram-se padrões na organização estrutural das células. Elas foram separadas em *procarióticas* (do grego *pro* = primeiro, primitivo e *carion* = núcleo) e *eucarióticas* (do grego *eu* = verdadeiro e *carion* = núcleo).

O principal critério para distinguir células procarióticas de eucarióticas é a presença ou a ausência de uma película que envolve o material genético, a membrana nuclear ou carioteca (do grego *teca* = que guarda ou protege).

Ainda não é hora de estudar com profundidade a estrutura e o funcionamento celular. Por enquanto, vamos comparar células procarióticas e eucarióticas para aprender a reconhecê-las e, aos poucos, nos iremos familiarizando com alguns conceitos.

Todas as células têm características comuns. Por exemplo, precisam obter alimento, produzir energia e construir proteínas, substâncias essenciais à vida. Além disso, devem coordenar todas essas atividades.

Para qualquer padrão celular, as estruturas mínimas são:

1. **membrana plasmática:** o envoltório limitante da célula; regula as trocas de substâncias entre o meio interno e o externo.
2. **hialoplasma** ou **citoplasma:** o interior celular, formado por uma solução (mistura) de substâncias, por exemplo, água, sais minerais, açúcares, proteínas etc. é o lugar onde ocorrem reações químicas importantes para a vida celular.
3. **ribossomos:** estruturas granulares imersas no citoplasma que participam da produção das proteínas de que as células necessitam.
4. **cromatina:** o material genético ou hereditário, também localizado no citoplasma, disposto em fios ou filamentos. A cromatina coordena todas as atividades da célula e tem a capacidade de se duplicar.

As estruturas mínimas para qualquer padrão celular aproximam-se bastante daquelas encontradas nas bactérias.

Comparando os padrões celulares

A célula procariótica da bactéria, estruturalmente a mais simples


As bactérias têm organização estrutural celular simples, com todos os elementos indispensáveis a qualquer célula.

Dizemos tratar-se da estrutura celular mais simples porque dela não constam, além da carioteca (que só aparece nas células eucarióticas), sistemas membranosos e outras estruturas citoplasmáticas chamadas *organelas*.

As bactérias têm uma particularidade: uma rede envolvente, externa à membrana plasmática, denominada *parede bacteriana* ou *membrana esquelética*, cuja função é dar proteção mecânica.

225-1


_BB1_selene_C1.indb 1 2/11/16 5:47 PM



Células procarióticas das bactérias, estruturalmente as mais simples. Dimensão aproximada: 1,5 µm.

As células eucarióticas animal e vegetal, estruturalmente as mais complexas


As células eucarióticas têm carioteca e organização estrutural complexa. São ricas em detalhes citoplasmáticos, formados por elementos membranosos e pelas organelas. Estas geralmente têm formas e funções definidas, relacionadas à manutenção da eficiência celular, como veremos mais adiante.



Células eucarióticas, estruturalmente as mais complexas. Observe a riqueza dos detalhes citoplasmáticos, as organelas. Dimensão aproximada de 80 µm.

A estrutura geral de uma célula eucariótica

A seguir, isolamos e listamos os principais componentes da célula eucariótica, cujo funcionamento depende da integração dessas partes.



Retículo endoplasmático: cavidade delimitada pela membrana plasmática. O retículo é classificado como *granular* (ou rugoso ou ergastoplasma), quando está aderido aos ribossomos. Quando não há ribossomos, o retículo é denominado *agranular* (ou liso).
- funções: transporte, armazenamento e síntese de substâncias.

Aparelho de Golgi: é um conjunto de membranas em forma de sáculos achatados que se comunica com o retículo.
- funções: concentrar os materiais elaborados no retículo e eliminá-los.

Lisossomo: é uma organela membranosa arredondada, originada no brotamento do Golgi, cheia de enzimas digestivas.
- funções: digestão de alimentos vindos de fora da célula e eliminação de organelas velhas.

Mitocôndria: é uma bolsa membranosa em forma de bastonete.
- função: respiração celular, isto é, liberação de energia através da degradação de substâncias (sobretudo dos açúcares) com uso do gás oxigênio.

Centríolos: são pequenas estruturas tubulares não membranosas do hialoplasma (de vegetais que produzem frutos – as angiospermas).
- função: participar da divisão celular.

Cloroplasto: é uma organela membranosa presente somente nas células vegetais.
- função: transformar energia luminosa em energia química na produção de substâncias como os açúcares e o gás oxigênio – processo conhecido por *fotossíntese.*

Vacúolo: é uma estrutura membranosa atuante em vários processos. Há, por exemplo, vacúolos de digestão, vacúolos de contração (ou pulsação), vacúolos de suco celular e vacúolos de eliminação.

Parede celulósica: é um revestimento externo à membrana plasmática, exclusivo das células vegetais. É formada por uma substância denominada *celulose.*
- função: proteção mecânica.

Apesar de todo o avanço científico e tecnológico, ainda há muito o que aprender sobre as células. Leia o texto a seguir.

_BB1_selene_C1.indb 2 2/11/16 5:47 PM

Os vírus, seres vivos acelulares

A gripe acomete os seres humanos desde as mais antigas civilizações. Você já ficou gripado, apresentando sintomas como calafrios, dores musculares, mal-estar e coriza? Provavelmente sim.

A gripe é causada por um tipo de vírus que infecta nossas células e se reproduz dentro delas, liberando substâncias nocivas a nosso organismo.

Os vírus diferem de todos os outros seres vivos, porque não são formados pelas estruturas mínimas celulares, mas por duas substâncias: proteínas e ácidos nucleicos. As proteínas, nesse caso chamadas *capsídeos*, envolvem e protegem o material genético, isto é, os ácidos nucleicos, que podem ser moléculas de ácido desoxirribonucleico (DNA) ou de ácido ribonucleico (RNA); nunca as duas num mesmo vírus.

Acredita-se que os vírus se tenham originado de células que se tornaram parasitas intracelulares obrigatórios e sofreram simplificação estrutural durante a evolução biológica.

Os vírus só manifestam características de seres vivos na reprodução. Nesse aspecto, devemos considerar: primeiro, a necessidade da duplicação do conteúdo genético; segundo, a da síntese proteica do capsídeo. Portanto, os vírus dependem do aparelho estrutural e funcional da célula hospedeira.

Tomemos, a título de exemplo, a multiplicação viral da gripe. Inicialmente, os vírus inalados aderem às células hospedeiras, por exemplo, do nariz ou da garganta. Então, atravessam a membrana celular e, no citoplasma, os capsídeos serão digeridos. Livres, os RNAs virais começam a construção de novos RNAs, idênticos a eles, e também de moléculas de RNA capazes de elaborar o capsídeo, usando as enzimas e os elementos químicos da célula infectada. O surgimento da nova população viral dentro da célula hospedeira é feito pela associação do capsídeo com as moléculas do RNA que, uma vez libertas, podem atacar outras células sadias. Algumas das células que hospedam o vírus da gripe acabam morrendo.




Ilustração artística de vírus que parasita bactérias: trata-se de um bacteriófago.

Exercícios

1. (Unicamp) Considere os seguintes componentes celulares:

I – parede celular.
II – membrana nuclear.
III – membrana plasmática.
IV – DNA

É correto afirmar que as células de
a) fungos e protozoários possuem II e IV.
b) bactérias e animais possuem I e II.
c) bactérias e protozoários possuem II e IV.
d) animais e fungos possuem I e III.


2. (Mackenzie) Em comum, as células de cianobactérias, algas e plantas têm
a) parede celulósica.
b) pigmento clorofila.
c) cloroplasto.
d) núcleo organizado.
e) pigmentos carotenoides.

Estudo orientado

exercícios

1. (Unicamp – modificado) São estruturas encontradas em vegetais
a) parede celular, grana, mitocôndria, glândula sebácea, DNA.
b) mitocôndria, carioteca, axônio, núcleo, estroma.
c) mitocôndria, vacúolo, tilacoide, cromossomos.
d) dendrito, cloroplasto, DNA, endométrio.

2. (Unesp) A figura representa os esquemas de duas células.



Adaptado de: macanicacelular.webnode.com.br. Acesso em: 02 fev. 2016.

225-1


_BB1_selene_C1.indb 3 2/11/16 5:47 PM

Porém, o ilustrador cometeu um engano ao identificar as estruturas celulares. É correto afirmar que

a) II é uma célula vegetal e o engano está na identificação do complexo golgiense nesta célula, uma vez que este aparece nas células animais, mas não em células vegetais.
b) II é uma célula animal e o engano está na identificação do vacúolo em ambas as células, além de este ser característico de células vegetais, mas não de animais.
c) II é uma célula animal e o engano está na identificação dos centríolos nesta célula, uma vez que estes são característicos de células vegetais, mas não de animais.
d) I é uma célula animal e o engano está na identificação das mitocôndrias em ambas as células, além de estas ocorrerem em células animais, mas não em células vegetais.
e) I é uma célula vegetal e o engano está na identificação da membrana plasmática, nesta célula, uma vez que esta ocorre em células animais, mas não em células vegetais.

3. (Enem) Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem.

Perfil celular das linhagens de microalgas



	Linhagem I	Linhagem II	Linhagem III	Linhagem IV	Linhagem V
Núcleo	20	20	20	20	20
Retículo endoplasmático	20	35	15	40	35
Complexo golgiense	50	40	35	20	15
Mitocôndrias	10	5	30	20	30

Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura?

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

roda de leitura

Vida: podemos conceituá-la?

Estamos cercados por vida. Os seres vivos estão espalhados por todo o planeta Terra, podendo habitar os ambientes mais inóspitos como desertos ou regiões polares. No dia a dia, podemos deparar vários organismos, dos mais diversos tamanhos e formas.

Mesmo nas grandes cidades, onde os problemas decorrentes da poluição e do desmatamento têm gerado o desaparecimento de muitas plantas e animais, ainda existem diferentes árvores, insetos, pássaros, pequenos mamíferos etc. Na verdade, nem é preciso sair de casa para encontrar seres vivos. Quem nunca acordou com o zumbido de um mosquito ou encontrou o açucareiro povoado por formigas? E nós, afinal? Não somos também seres vivos?

A vida é um fenômeno intrigante. Inicialmente, não parece ser um grande enigma; afinal, de modo geral, é muito fácil distinguir um organismo vivo de um não vivo – peixes e formigas estão vivos, enquanto velas, cristais e nuvens não estão. No entanto, essa questão se torna mais difícil quando tentamos classificar casos limítrofes como os vírus ou a sopa bioquímica envolvendo fragmentos de RNA dos laboratórios de genética: casos limítrofes como os vírus levantam a

_BB1_selene_C1.indb 4 2/11/16 5:47 PM

questão geral de se a vida é preta ou branca, como parece à primeira vista, ou se ela também tem tons de cinza.

A grande diversidade de seres vivos encontrada na Terra nos leva a questionar qual ou quais propriedades esses organismos teriam em comum. Para dificultar ainda mais as coisas, é preciso levar em consideração que, quando a vida surgiu no planeta, ela apresentava formas transientes, anteriores ao surgimento das células. Outro aspecto que se deve ter em conta é a possibilidade de existirem formas extraterrestres de vida. Alguns cientistas – como Matsuura, por exemplo – acreditam que o caráter do planeta Terra não é excepcional, mas apenas um dentre os vários possíveis nichos de vida no Universo (essa concepção é conhecida como princípio da mediocridade). Outros consideram possível a existência de diferentes tipos de vida baseados não no carbono, mas no silício, apesar de este apresentar ligações químicas mais fracas que as do carbono e ter suas cadeias rompidas em presença de água. Existe ainda o estudo da Vida Artificial, que é relativamente novo e interdisciplinar, procurando, a partir do uso da computação e da robótica, bem como da manipulação gênica e de outros métodos da biotecnologia, construir formas completamente novas e genuínas de vida, para compreender o que seria verdadeiro em termos universais acerca da vida e o que seriam simplesmente aspectos particulares ou contingentes. Assim, seria insatisfatório estudar e definir vida com base apenas nas formas encontradas atualmente no nosso planeta. Para que um conceito abranja todos os seres vivos, é preciso considerar as formas encontradas no passado, além de incluir o estudo da Vida Artificial, ou seja, não só a "vida-como--nós-a-conhecemos" em seus espécimes terrestres, mas também a "vida-como-ela-poderia-ser" .

Por essa dificuldade de definir vida e pela tendência experimentalista que hoje predomina na biologia, originou-se entre os biólogos uma atitude cética a respeito da conceituação de vida. Grande parte deles passou a ignorar essa questão, seja por considerá-la muito difícil, seja por acreditar que uma definição de vida não teria nenhuma importância prática para a ciência. Essa posição tomada por boa parte dos biólogos – que, por definição, são os estudiosos da vida – causa espanto. Afinal, era de esperar que eles fossem os primeiros a procurar definir de forma clara seu objeto de investigação. No entanto, a visão atual sobre a definição de vida no campo da biologia não reflete essa expectativa natural, como destaca Mark Bedau:

> *Havia um tempo em que a natureza da vida dizia respeito aos filósofos – pense em Aristóteles e Kant –, mas a maioria dos filósofos atualmente ignora essa questão, talvez porque ela pareça ser "científica" demais. Ao mesmo tempo, enquanto alguns biólogos fazem comentários a respeito da vida, o campo da biologia apresenta poucas discussões sérias e corroboradas da questão em geral, talvez porque esse tópico pareça "filosófico" demais.*

Mayr, por exemplo, afirma que os esforços para definir vida são fúteis, na medida em que está inteiramente claro que não há substância, objeto ou força especial que possa ser identificada com a vida. Ele acrescenta, no entanto, que o processo da vida poderia ser definido e compreendido, visto que existe uma diferença real entre os seres vivos e os objetos inanimados. Existiriam características comuns a todos os processos vivos e inexistentes nos processos inanimados. A forma como Mayr aborda o problema da definição de vida, colocando o agrupamento de características comuns aos processos vivos como a única maneira de diferenciá-los dos processos inanimados, é uma atitude comum entre os biólogos, tendo sido denominada por Emmeche visão tradicional sobre a definição de vida. *Na tentativa de encontrar definições para a vida, alguns cientistas formularam listas buscando destacar as características que seriam comuns a todos os seres vivos. Essas características serviriam para agrupar os seres vivos e, assim, distingui-los dos não vivos. Muitas listas foram criadas, como a de Crick, que apresentava aspectos como autorreprodução, evolução e metabolismo; a de Farmer e Belin, que citava oito características comuns aos seres vivos: processo, autorreprodução, armazenamento de informações, metabolismo, interações funcionais com o ambiente, estabilidade sob perturbações e capacidade de evoluir; e a de Mayr, que também listou oito características: organização complexa e adaptativa; singularidade química, no sentido das propriedades extraordinárias observadas nas macromoléculas normalmente encontradas em seres vivos, mas não na matéria inanimada; qualidade (onde Mayr faz um contraste entre o mundo físico como um mundo de quantificação e o mundo biológico como um mundo de qualidades, diferenças individuais, sistemas de comunicação, interações em ecossistemas etc.); individualidade e variabilidade; presença de um programa genético; natureza histórica; seleção natural; e indeterminação (incluindo a emergência de qualidades genuinamente novas no curso da evolução biológica).*

A tentativa de caracterizar a vida por meio de listas de características é cercada por problemas de solução difícil ou até mesmo impossível. Um deles diz respeito ao número e ao tipo das propriedades que devem ser incluídas numa lista de condições necessárias e suficientes para a vida. De todas as listas possíveis de propriedades, qual seria a mais correta? Como

_BB1_selene_C1.indb 5 2/11/16 5:47 PM

poderíamos garantir que uma propriedade essencial não foi deixada de fora? Ou que não foi incluída uma propriedade dispensável? Não temos como responder a essas perguntas, pelo simples fato de que não podemos ter acesso à essência da vida, àquilo que define essencialmente um sistema como vivo. E há ainda o problema das chamadas "formas limítrofes" como os vírus e outras estruturas moleculares que apresentam, ao mesmo tempo, propriedades características da matéria bruta e de seres vivos. O próprio Mayr, por exemplo, reconheceu que sua lista provavelmente seria incompleta e um pouco redundante. Na verdade, todas as caracterizações da vida produzidas por meio de listas tendem a ser incompletas ou redundantes; afinal, não basta fornecer uma lista de propriedades definidoras de vida; é preciso relacionar essas características e enquadrá-las em algum paradigma específico da biologia. Deve-se atentar, então, para o modo como os conceitos adquirem significado num paradigma:

> *Em um paradigma, os conceitos são definidos em termos de outros conceitos, ou seja, eles não adquirem significado de maneira isolada e tampouco por meio de uma relação entre o ato de definir (isto é, de dar um significado particular a um conceito) e a realidade. Ao contrário, definir um conceito implica inseri-lo numa rede de conceitos que se sustentam mutuamente e conferem significado uns aos outros. Essa rede de conceitos não pretende capturar a realidade essencial do que está sendo definido (por exemplo, a vida). O que acontece é que o conceito que está sendo definido adquire um significado específico em virtude de suas conexões com os demais conceitos na rede.*

Mark Bedau exemplifica a necessidade de buscar causas para as características comuns aos seres vivos num trecho muito interessante de seu artigo "The Nature of Life", no qual faz uma analogia entre uma lista de características para a vida e uma síndrome médica.

> *A lista deve se referir a algo como uma síndrome médica – uma coleção de sintomas para os quais não existe causa. Mas, quando médicos descobrem a coexistência das características de uma lista de sintomas, eles buscam uma causa subjacente.*

Quando o conceito de "vida" adquire significado no contexto de um paradigma, é importante verificar se as características dos seres vivos, antes meros tópicos de uma lista incompleta, passam a ser explicadas por meio de causas subjacentes, tornando-se, assim, significativas no contexto daquele paradigma.

Claus Emmeche propõe os seguintes requisitos básicos para uma definição satisfatória de vida: (i) uma definição deve ser universal e coerente com a compreensão dos sistemas vivos na ciência moderna; (ii) ser estruturada de modo a proporcionar uma compreensão clara e uma transmissão fácil de seu conteúdo no meio científico; e (iii) estar inserida num paradigma específico, de modo a apresentar uma sólida base teórica.

Para que uma definição de vida seja considerada universal, é preciso que apresente conceitos genéricos, capazes de abranger todas as possíveis formas de vida, e não apenas a vida da maneira como a conhecemos na Terra – baseada em carbono, DNA, proteínas etc. A coerência dos conceitos de vida com os conceitos já existentes nas áreas da biologia, física e química modernas é essencial; afinal, essa definição deve fazer parte da ciência e, para isso, precisa ser compatível com ela. Além de apresentar base científica, uma definição de vida precisa ser bem organizada, com conceitos claros e bem definidos, de forma que possam ser facilmente transmitidos e compreendidos por todos. E, finalmente, o fato de estar inserida num paradigma específico evita que ela se torne mais uma lista de características; afinal, as características apresentadas serão apenas aquelas que se mostram relevantes à luz do paradigma. Na medida em que a tarefa de definir "vida" é entendida em termos da explicitação das relações desse conceito com os demais conceitos incluídos num paradigma (ou paradigmas) da biologia teórica, observando-se os requisitos discutidos acima, torna-se mais fácil levar a cabo essa tarefa, em comparação com a simples proposição de listas de características. Assim, é possível contrapor-se à visão comum no campo da biologia de que definir vida é muito difícil e provavelmente inútil para o crescimento do conhecimento biológico. Como propõem Emmeche e El-Hani:

> *Na medida em que não se estão buscando as propriedades essenciais dos sistemas vivos, não se trata de descobrir alguma força ou substância especial que caracterize a vida e tampouco de propor um conjunto de propriedades cruciais para a classificação de um sistema como vivo, mas apenas de identificar propriedades que deem significado ao conceito "vida" à luz de uma rede paradigmática de conceitos.*

Ao deixar-se de lado o procedimento de listar características, concebendo-se a tentativa de definir vida em termos das relações desse conceito com os demais conceitos que são parte de um ou mais paradigmas da biologia, pode-se perceber que não só é possível definir vida como já existem na biologia pelo menos três definições teoricamente satisfatórias, à luz dos requisitos apresentados acima. Essas definições são encontradas na teoria da autopoiese, na biologia evolutiva neodarwinista e na biossemiótica.

TAVARES, Marina de Lima. *A Terra é viva? Hipótese Gaia e definições de vida*. Salvador, 2000. Adaptado.

225-1

_BB1_selene_C1.indb 6 2/11/16 5:47 PM

pesquisar e ler

Em *Vida: experiência inacabada*, Salvador Edward Luria se propõe descrever o processo histórico da vida, do qual também fazemos parte, abordando os genes e as células, a herança biológica e a questão da energia, até chegar ao homem e sua mente. "Que é o homem?", pergunta Pascal, citado por Luria. E responde: "Um nada em face do infinito, um infinito em face do nada." (Trad. de Ana Mazur Spira. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1979.)

Já vimos que não é fácil definir a vida. Mas podemos definir a morte? Esse é o intuito de José Luiz de Sousa Maranhão em *O que é morte*, livro que aborda de forma crítica e provocante questões como a abreviação e o prolongamento da vida humana e as principais concepções filosóficas a respeito do morrer. Discute-se também como a morte pode mascarar as injustiças sociais numa sociedade capitalista. No final, você encontra indicações de leitura e aprofundamento sobre o tema. (*Coleção Primeiros Passos*. São Paulo: Brasiliense, 1999.)

navegar

http://cienciahoje.uol.com.br

Projeto de divulgação científica vinculado à SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), oferece um panorama da produção intelectual e tecnológica de universidades, institutos e centros de pesquisa nacionais e dos avanços da ciência internacional.

www.scielo.br

Biblioteca eletrônica que abrange coleções selecionadas de periódicos científicos brasileiros (Scientific eletronic library *on-line*).

_BB1_selene_C1.indb 7 2/11/16 5:47 PM

Se devemos ser os timoneiros adequados deste planeta, precisamos saber como e por que ele funciona do modo como o faz.

Peter H. Haven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn. *Biologia Vegetal*, 2001.

A fonte de energia para os processos da vida, aqui na Terra, é a luz do Sol, que entra nos sistemas biológicos por obra de células capazes de convertê-la em energia química. Esse processo é conhecido como *fotossíntese*.

A fotossíntese desempenha um importante papel no funcionamento e na sobrevivência de qualquer ecossistema. Menos de 1% de toda a energia luminosa que alcança o nosso planeta é capturada e convertida em energia química.

Maurício Moraes



A vida tem no Sol sua principal fonte de energia. Calcula-se que a quantidade de energia solar que chega na Terra é de 13×10^{23} calorias por ano. Cerca de 30% dessa energia é imediatamente refletida para o espaço na forma de luz. 20% é absorvida pela atmosfera terrestre. Grande parte dos 50% restantes é absorvida pelo nosso planeta e convertida em calor. O calor serve para evaporar a água dos oceanos, produzindo as nuvens, que ocasionam chuva e neve. A combinação de outros fatores e a energia solar gera movimentos do ar e da água dos oceanos, agindo de forma a estabelecer os padrões climáticos na superfície da Terra. Menos de 1% dessa energia solar é transformada em energia química no processo da fotossíntese e pode, então, ser assimilada pelos demais seres vivos.


O processo da fotossíntese resulta na produção de moléculas orgânicas altamente energéticas, os carboidratos, alimento de muitos organismos. Antes de conhecer melhor a fotossíntese, convém examinar os princípios gerais das reações químicas que governam as transformações de energia.

Podemos dizer, em linhas gerais, que o organismo começa a construir a matéria viva quando substâncias vindas de fora, como os alimentos, são desmontadas em peças pequenas para, mais adiante, ser remontadas conforme as necessidades celulares e do organismo como um todo. Por exemplo, o crescimento, a cicatrização de um ferimento, a produção de sangue etc.

Como já foi dito no caderno 2, o conjunto das inúmeras reações químicas (ou bioquímicas) do ser vivo, mantendo e sustentando a vida, é chamado *metabolismo*.

Podemos considerar *metabolismo* tanto as atividades químicas de uma célula como o somatório das atividades celulares do organismo inteiro.

O metabolismo celular envolve reações de degradação e síntese de moléculas. Diferentemente do que ocorre em um laboratório de química, essas reações acontecem sequencialmente, isto é, os produtos formados são prontamente usados como reagentes na etapa seguinte e assim sucessivamente, até a formação do produto final. Por isso, credita-se muita eficiência ao metabolismo dos seres vivos – economia de energia e resíduos moleculares pequenos.



Esquema da relação entre a degradação e a síntese, envolvendo o uso da energia. Por exemplo, a degradação da glicose acontece numa sequência de eventos. A energia liberada é armazenada e transportada por um composto energético para ser subsequentemente usada na construção de proteínas.

As reações químicas que liberam energia são chamadas *reações exergônicas*, e as que absorvem energia, *reações endergônicas*.

Tais reações podem ser comparadas a uma colina energética: as reações exergônicas ocorrem no sentido da descida; as endergônicas, no sentido da subida. Por exemplo, uma pedra que rola colina abaixo libera energia, e uma pedra movimentando-se colina acima exige suprimento de energia.

_BB1_selene_C1.indb 8 2/11/16 5:47 PM




Ilustração da analogia entre as reações químicas exergônicas e endergônicas. A reação química produtora de energia é a pedra rolando colina abaixo (quando atingir a base da colina, terá menos energia potencial do que quando estava no topo). Para se deslocar de volta ao topo da colina, a pedra precisará consumir a mesma soma de energia que liberou ao rolar (naturalmente, considera-se pouco provável a absorção dessa energia pela pedra para voltar ao topo).

Molécula de ATP, a moeda energética dos seres vivos

Na fotossíntese, a energia da luz é usada para a construção de substâncias. As principais são os carboidratos, que servem como a base alimentar de muitos organismos, os herbívoros, que por sua vez serão comidos por outros, os carnívoros. Uma parte da energia inicial do processo da fotossíntese vai sendo transferida para os seres vivos, e a outra parte é perdida sob a forma de calor.

Stock Photos



A energia química dos alimentos sendo transformada em movimento.

Os alimentos armazenam quantidade de energia elevada ("pedra colina acima") e, durante sua degradação ("pedra colina abaixo"), vai ocorrendo o desprendimento dessa energia que, na célula, é usada em sínteses macromoleculares, transporte de matéria e movimento.

Contudo, a energia liberada pela reação de quebra do alimento não pode ser usada de imediato e não convém perdê-la. Ela precisa ser armazenada em moléculas especiais – a principal é o ATP (adenosina tri-fosfato).





Ilustração esquemática do ciclo energético envolvendo o ATP e seus usos pela célula a partir da degradação da glicose.

A molécula de ATP é uma ligação entre moléculas de adenina, ribose e três grupos fosfatos. Observe:



A estrutura molecular do ATP e a sua representação esquemática (no detalhe).

A molécula de ATP cumpre nos seres vivos as funções de armazenamento e transporte de energia para usos exatos e em velocidade adequada.

Os dois últimos fosfatos apresentam ligações de "alta energia". Quando ocorre seu desprendimento, libera-se uma energia equivalente a 8 000 calorias por mol de ATP (para cada fosfato), que é usada no trabalho celular.

A energia pode se apresentar nos seres vivos sob duas formas distintas: as reservas (por exemplo, lipídios e carboidratos) e as moléculas de ATP. Os depósitos de lipídios e de carboidratos representam um acúmulo de energia sob forma estável e concentrada. Já o ATP é um composto instável e facilmente acessível. Por isso, podemos comparar as reservas com dinheiro no banco, e as moléculas de ATP, com moedas no bolso. O dinheiro no banco é estável e pode ser acumulado. As moedas no bolso são dinheiro prontamente utilizável.

A seguir, veremos como a energia luminosa é transformada em energia química na síntese dos carboidratos pelos vegetais.

225-1

_BB1_selene_C1.indb 9 2/11/16 5:47 PM

A transformação da energia luminosa em energia química: o processo da fotossíntese

Há aproximadamente 360 anos, estudos pioneiros sobre a alimentação dos vegetais resultaram na compreensão de todo o processo da fotossíntese, identificando os compostos – luz, gás carbônico e água – que possibilitaram a construção de uma equação química global:

equação química da fotossíntese:

$$(6)\ \mathbf{CO_2} + (12)\ \mathbf{H_2O} \xrightarrow[\text{(energia)}]{\text{luz}} (1)\ \mathbf{C_6H_{12}O_6} + (6)\ \mathbf{O_2} + (6)\ \mathbf{H_2O}$$

gás carbônico | água | glicose | oxigênio | água

A equação química não reflete os eventos fotossintéticos que acontecem nos vegetais com clorofila, como veremos a seguir.


Vamos relembrar nossa "colina energética" (reações químicas exergônicas e endergônicas) e também propor, para um melhor entendimento deste tópico, o enunciado da primeira lei da termodinâmica: *a energia pode ser transformada, mas não pode ser criada ou destruída* (exceto para a fissão atômica, onde certa quantidade de massa é convertida em energia).

A fotossíntese é um processo complexo – embora seu princípio fundamental seja simples –, constituído por sucessivas reações metabólicas nas quais se processa a transformação da energia luminosa em química para construir os carboidratos, podendo essa energia ser usada para as necessidades da célula e dos outros seres vivos que se alimentam direta ou indiretamente das plantas.

Nos vegetais, a fotossíntese acontece em organelas membranosas mergulhadas no citoplasma. Trata-se dos cloroplastos, que têm, geralmente, forma elíptica, com aproximadamente 12 µm de diâmetro e 1 a 2 µm de espessura.

Os estudos da ultraestrutura do cloroplasto mostraram que ele está envolvido por uma dupla camada de membranas externas e numerosas membranas internas que se arranjam em bolsas achatadas chamadas *tilacoides*. A organização dos tilacoides forma estruturas que lembram pilhas de moedas. Cada pilha é designada por *granum* (que quer dizer grão, em latim; no plural, *grana*).

Nos tilacoides, encontram-se moléculas de clorofila, arrumadas de forma a capturar a luz solar com muita eficiência.



Desenho esquemático das estruturas envolvidas no processo da fotossíntese. No plano macroscópico, a folha. No plano microscópico, as células da epiderme foliar evidenciando os cloroplastos e a sua organização interna. No plano molecular, a molécula de clorofila – a mais comum chamada de clorofila a *– arrumada de maneira a captar a energia luminosa.*


225-1

_BB1_selene_C1.indb 10 2/11/16 5:47 PM

Visão geral do processo fotossintético

Podemos dividir a fotossíntese em 2 fases: a fotoquímica e a química.

Esquema da fotossíntese



Esquema das reações químicas das fases da fotossíntese na folha de um vegetal, o órgão-sede. Note que na fase fotoquímica os ingredientes luz e água são usados para formar ATP e extrair os hidrogênios, que serão aproveitados na fase seguinte, a química. O gás oxigênio liberado provém da hidrólise (melhor fotólise) da água. Na etapa química, o carbono retirado do gás carbônico combina-se com os hidrogênios na construção da glicose e de outras substâncias.

a fase fotoquímica

Nessa fase são exigidos os seguintes "ingredientes": luz solar, água e clorofilas.

A luz, ao incidir sobre as folhas dos vegetais, excita as moléculas de clorofila, que passam, então, seus elétrons para outros orbitais ou níveis energéticos. A transferência desses elétrons por aceptores e transportadores libera energia para a formação de moléculas de ATP. Esse evento é chamado *fotofosforilação*, isto é, adição de fosfato (ADP + Pi[1] → ATP) na presença de luz. Bioquimicamente, reconhecem-se a fotofosforilação cíclica e a acíclica.

Ao mesmo tempo, a luz e as enzimas agem sobre as moléculas de água, que são quebradas, fornecendo elétrons (e^-), prótons de hidrogênio (H^+) e átomos de oxigênio – que, unidos dois a dois, formam o gás oxigênio (O_2). Esse passo metabólico da fotossíntese é denominado *fólise da água*.

Os elétrons são usados na fotofosforilação acíclica; o hidrogênio é captado por moléculas de NADP – a mesma da respiração, acrescida de fósforo (P) – e levado para a fase seguinte; o gás oxigênio é liberado para a atmosfera.

A fase fotoquímica também recebe a designação *fase de claro* ou *luminosa* porque, como percebemos, a luz é imprescindível para "ativar" as moléculas de clorofila e de água.

a fase química

Na fase química, estão postos os elementos necessários para a síntese dos carboidratos, principalmente a glicose.

1. Pi: notação química de fosfato inorgânico.

A fotofosforilação acíclica




Ilustração esquemática: na fotofosforilação acíclica, a luz excita os elétrons, que passam por uma cadeia de aceptores e transportadores. A energia liberada no processo de bombeamento de H^+ pelas membranas internas também é usada para a síntese de ATP. Contudo, esse processo funciona acoplado à reação da fotólise da água, que repõe os elétrons perdidos pela clorofila e fornece íons H^+ ao NADP.

225-1

_BB1_selene_C1.indb 11 2/11/16 5:47 PM

A fotofosforilação cíclica




Ilustração esquemática: na fotofosforilação cíclica, a luz excita os elétrons, que passam por uma cadeia de aceptores e transportadores. A energia liberada no processo é usada para regenerar moléculas de ATP.


Note que na fase anterior foram formados e estão disponíveis, *energia*, sob a forma de moléculas de ATP, e *hidrogênios* (no aceptor e transportador $NADPH^+$), que serão usados num ciclo chamado *ciclo das pentoses* ou de *Kalvin-Benson*, em homenagem a seus descobridores. É nesse ciclo que o gás carbônico (CO_2) participa das reações, contribuindo com o *carbono* (C).

No ciclo das pentoses, além dos carboidratos, são sintetizados alguns aminoácidos, vitaminas e partes de lipídios.

A fase química também é chamada fase de escuro, mas atenção: *essas reações não acontecem durante a noite,* como o nome pode sugerir. Justifica-se a designação porque todas as reações do maquinário bioquímico nessa fase não demandam participação da energia luminosa.

Luz e fotossíntese

Ao atravessar um prisma, a luz "branca" é decomposta em cores, indicando que nela existem diferentes comprimentos de onda e energia (o assunto será tratado com maiores detalhes nos cadernos de Física, fique atento e faça as devidas relações), conforme a ilustração a seguir.



A luz solar é uma forma de energia radiante composta por vários comprimentos de onda.

225-1

_BB1_selene_C1.indb 12 2/11/16 5:47 PM

Você acha que a qualidade da luz pode, então, interferir no processo fotossintético dos vegetais? Observe a seguir um esquema de experimento.

(UFRJ-modificado) Com o objetivo de estudar a ação da luz na fotossíntese, montou-se a seguinte experiência:

Em um pequeno aquário foi colocada uma célula de alga verde Spirogyra.

Dentro do aquário foram introduzidas também bactérias móveis, aeróbicas, que são atraídas para as áreas onde exista oxigênio em abundância.

O aquário foi, então, iluminado por um feixe de luz branca que passava por um prisma antes de chegar à alga; a luz branca, ao passar pelo prisma, decompôs-se nas cores básicas, de modo que cada região da célula foi iluminada por uma cor diferente, como mostra o resultado abaixo.




Ilustração esquemática de experimento para verificar a relação dos diferentes comprimentos de onda da luz com a taxa de fotossíntese.

Depois de certo tempo, as bactérias que só sobrevivem em ambientes aeróbicos, isto é, com o gás oxigênio, deslocam-se para os espectros de luz azul e vermelha. Isso demonstra que as atividades da fotossíntese estão nesses comprimentos de onda, 400-460 e 650-700 nanômetros, respectivamente.

Começamos a compreender que os pigmentos fotossintetizantes – as moléculas de clorofila – têm a propriedade de *absorver* determinados comprimentos de onda, refletindo os demais.

Chamamos de *espectro de ação da luz* os diferentes comprimentos de onda em função da taxa em que ocorre a fotossíntese.





Gráfico que relaciona a taxa de liberação do gás oxigênio da fotossíntese em função do comprimento de onda da luz. As maiores quantidades do gás produzido e liberado no ambiente situam-se nos comprimentos de onda do azul e do vermelho.

Os fatores que limitam a fotossíntese

A fotossíntese é afetada por diversos fatores, dentre os quais se destacam a temperatura e o gás carbônico.


a temperatura: acima de 45º, ocorre a diminuição da fotossíntese e também de outras reações bioquímicas vitais, porque as moléculas proteicas da clorofila e as enzimas são desnaturadas.



O processo da fotossíntese envolve inúmeras reações químicas das quais participam as enzimas. A contínua elevação da temperatura aumenta os choques moleculares, e a velocidade do processo também aumenta até certo ponto; acima dos 45º – como já foi visto em aulas anteriores –, desnaturam-se as proteínas enzimáticas e a fotossíntese cessa.

A concentração de gás carbônico (CO_2): no ambiente natural, a baixa concentração desse gás – aproximadamente 0,03% do volume da atmosfera – limita a taxa máxima da fotossíntese. Em condições ideais de água, luz, temperatura e CO_2 (até cerca de 0,3% no vegetal), observa-se um aumento progressivo da fotossíntese.

_BB1_selene_C1.indb 13 2/11/16 5:47 PM



A fotossíntese precisa fixar o gás carbônico para produzir a glicose. Aumentando-se a disponibilidade desse gás no ambiente, a velocidade da reação aumenta. O inverso também é verdadeiro. No gráfico, observa-se a estabilização do processo após determinado intervalo de tempo porque outros fatores – não o CO_2 – o estão limitando.

Outros processos que transformam a energia nas células

Além da fotossíntese, existem outros mecanismos energéticos no mundo dos seres vivos, realizados principalmente por algumas poucas espécies de bactérias.

Esses mecanismos energéticos bacterianos possibilitam a sobrevivência e o desenvolvimento de muitos outros seres vivos. Por exemplo, nas águas dos oceanos profundos, a mais de 4 000 metros, comunidades de bactérias quimiossintetizantes são a base da pirâmide alimentar, sustentando variada fauna de organismos até recentemente desconhecidos.

Além da fotossíntese, são as seguintes as equações químicas globais que possibilitam a produção dos carboidratos (por exemplo, a glicose):

equação química da fotossíntese bacteriana:

$$(6)\ \mathbf{CO_2} + (12)\ \mathbf{H_2S} \xrightarrow[\text{(+ bacterio-clorofila)}]{\text{luz (energia)}} (1)\ \mathbf{C_6H_{12}O_6} + (12)\ \mathbf{S} + (6)\ \mathbf{H_2O}$$

gás carbônico; gás sulfídrico; glicose; enxofre; água

Em vegetais, algas e cianobactérias, a fotossíntese combina o gás carbônico (CO_2) com os hidrogênios da água para formar a glicose. Mas existem alguns tipos de bactérias, as sulfobactérias, que usam o gás sulfídrico (H_2S), e não a água, como fonte de hidrogênios. Antes de ser excretado, o enxofre acumula-se temporariamente no citoplasma dessas bactérias. O pigmento usado na fotossíntese bacteriana, semelhante à clorofila, é denominado *bacterioclorofila*.

equação química da quimiossíntese:

$$(2)\ \mathbf{H_2S} + \mathbf{O_2} \xrightarrow{\text{energia}} (2)\ \mathbf{S} + (2)\ \mathbf{H_2O}$$

gás sulfídrico; oxigênio; enxofre; água

$$(6)\ \mathbf{CO_2} + (6)\ \mathbf{H_2O} \longrightarrow (1)\ \mathbf{C_6H_{12}O_6} + (6)\ \mathbf{O_2}$$

gás carbônico; água; glicose; água

Na quimiossíntese, a energia não provém da luz, mas de uma reação de oxidação – no caso, do gás sulfídrico.

Exercícios

1. (Fuvest) Frequentemente os fungos são estudados juntamente com as plantas, na área da Botânica. Em termos biológicos, é correto afirmar que essa aproximação
a) não se justifica, pois a organização dos tecidos nos fungos assemelha-se muito mais à dos animais que à das plantas.
b) se justifica, pois as células dos fungos têm o mesmo tipo de revestimento que as células vegetais.
c) não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da encontrada nas plantas.
d) se justifica, pois os fungos possuem as mesmas organelas celulares que as plantas.
e) se justifica, pois os fungos e as algas verdes têm o mesmo mecanismo de reprodução.

2. (PUC) Suponha que se queira manter animais aquáticos herbívoros em um aquário. Para garantir a sobrevivência desses animais durante certo tempo, seria aconselhável adicionar ao ambiente
a) plantas aquáticas e algas que, além de servirem de alimento para os animais, forneceriam oxigênio ao meio, caso fosse iluminado.
b) plantas aquáticas e algas que, além de servirem de alimento para os animais, forneceriam oxigênio ao meio, mesmo que esse não fosse iluminado.
c) fungos e bactérias que, além de servirem de alimento para os animais, forneceriam gás carbônico ao meio, caso esse fosse iluminado.
d) fungos e bactérias que, além de servirem de alimento para os animais, forneceriam gás carbônico ao meio, mesmo que esse não fosse iluminado.
e) zooplâncton que, além de servir de alimento para os animais, forneceria oxigênio ao meio, caso esse fosse iluminado.

_BB1_selene_C1.indb 14 2/11/16 5:47 PM

Estudo orientado

exercício

1. (Unesp) Um vaso com uma planta de folhas verdes foi colocado sobre uma mesa, no centro de um quarto totalmente vedado, de modo a impedir a entrada da luz externa, e ali permaneceu por 24 horas.
Durante as 12 primeiras horas (período I), a planta foi iluminada com luz verde de comprimento de uma onda na faixa de 500 a 550 nm. Nas 12 horas seguintes (período II), a planta foi iluminada com luz laranja avermelhada, de comprimento de onda na faixa de 650 a 700 nm.
Considerando a incidência da luz sobre a planta e a taxa fotossintética, é correto afirmar que, aos olhos de um observador não daltônico que estivesse no quarto, as folhas da planta se apresentariam

a) de cor verde no período I e enegrecido no período II, e a taxa de fotossíntese seria maior no período II e reduzido ou nulo no período I.
b) enegrecido no período I e de cor vermelha no período II, e a taxa de fotossíntese seria maior no período I e reduzida ou nula no período II.
c) enegrecido no período I e enegrecido no período II, e em ambos os períodos a planta não realizaria fotossíntese, mas apenas respiração.
d) de cor verde no período I e de cor vermelha no período II, e a taxa de fotossíntese seria maior no período I do que no período II.
e) de cor verde no período I e de cor verde no período II, e a taxa de fotossíntese seria a mesma em ambos os períodos.

2. (UFPI) Analise as duas reações a seguir:

Reação I

$$C^{18}O_2 + H_2O \xrightarrow[\text{Clorofila}]{\text{Luz}} (CH_2O)_n + {}^{18}O_2$$

Reação II

$$CO_2 + H_2{}^{18}O_2 \xrightarrow[\text{Clorofila}]{\text{Luz}} (CH_2O)_n + {}^{18}O_2$$

Por meio da análise das reações mostradas podemos afirmar que

a) a reação I está correta, confirmando que o O_2 é proveniente do CO_2.
b) a reação II está correta, confirmando que o O_2 é proveniente do H_2O.
c) as reações I e II estão corretas, pois o O_2 provém tanto do CO_2 como de H_2O.
d) as reações I e II não fornecem informações suficientes para concluir a origem do O_2 liberado.
e) as reações I e II estão erradas, pois o O_2 liberado é proveniente da molécula de clorofila.

roda de leitura

O carpete (verde) do Sol

Se para os insetos herbívoros suas plantas-hospedeiras representam alimento, refúgio ou local para reprodução, para os vegetais a presença desses animais significa um problema, por reduzir suas chances de sobrevivência. Nessa relação assimétrica e conflituosa, as plantas tentam escapar da interação enquanto os insetos desenvolvem mecanismos de contra-ataque. Essa "corrida armamentista" evolutiva acabou favorecendo a propagação de especialistas – herbívoros cujos ataques ficaram restritos a espécies vegetais aparentadas. Mas por que esses insetos vorazes não comem suas hospedeiras até esgotá-las? Perguntas como essa movem a pesquisa ecológica contemporânea.

O combustível que gratuita e generosamente movimenta a economia da natureza é a energia solar. Plantas e outros organismos fotossintetizantes crescem com o Sol, e uma parcela preciosa desse crescimento (a produção primária líquida) sustenta os sistemas vivos em nosso planeta – incluindo os agroecossistemas, de onde extraímos ou podemos extrair comida. São os produtos da fotossíntese que formam a base das teias alimentares e todos os grandes ecossistemas, mesmo aqueles que prosperam onde os raios de Sol nunca chegam, como ocorre em cavernas profundas e no assoalho oceânico.

É certo que muitos animais nunca se alimentam de folhas, frutos, raízes ou de qualquer outra estrutura de origem vegetal, mas mesmo os consumidores estritamente carnívoros dependem de presas ou de hospedeiros que se alimentam de plantas. Se os produtores, por alguma razão, começassem a desaparecer, as teias alimentares sucumbiriam com eles, os consumidores (herbívoros e carnívoros) logo morreriam de fome e desapareceriam. A exuberância da vida na Terra voltaria a ser protagonizada exclusivamente por grumos de microrganismos quimiossintetizantes.

O consumo de tecidos vegetais vivos – herbivoria – é um processo ecológico fundamental, mas isso não significa que as plantas vivam, cresçam e prosperem para alimentar seus consumidores. Para os herbívoros, suas plantas-hospedeiras podem representar, além de alimento, um refúgio temporário ou mesmo um lugar para se estabelecer e criar os filhos – alguns insetos diminutos, por exemplo, são capazes de encontrar tudo de que necessitam para viver debaixo de uma única folha.

_BB1_selene_C1.indb 15 2/11/16 5:47 PM

Para as plantas, no entanto, a presença de herbívoros representa um problema, pois a ação deles tende a reduzir as chances de sobrevivência e reprodução dos indivíduos atacados, principalmente em certas fases da vida, mesmo quando os danos aparentes não são muito grandes. Uma plântula que teve partes de suas folhas comidas, por exemplo, pode deixar de crescer no ritmo de antes, ficando definitivamente para trás na corrida com as plântulas vizinhas pelos escassos raios de Sol que atingem o chão da floresta.

A relação entre plantas e animais herbívoros é, assim, assimétrica e conflituosa, cheia de truques e armadilhas. Em certo sentido, podemos dizer que as plantas estão tentando escapar da interação: a evolução aprimorou ao longo das gerações defesas que de alguma forma dificultam ou impedem a ação dos herbívoros; estes, por sua vez, tentam manter as plantas sob controle, desenvolvendo mecanismos de contra-ataque que de algum modo contornem as barreiras impostas pelas plantas.

Mesmo dispondo de sistemas de defesa (espinhos, baixa concentração de nutrientes, acumulação de compostos químicos repelentes, tóxicos ou indigestos), nenhuma planta está livre ou 100% imune aos herbívoros; para isso, ela teria que evitar todos os diferentes tipos de ataque a que está exposta. Por sua vez, os herbívoros não são capazes de atacar e se alimentar de qualquer planta; para isso, teriam que superar barreiras muito diversas, impostas por inúmeras e diferentes espécies vegetais – em poucos hectares de floresta tropical, por exemplo, convivem ervas, arbustos, árvores e trepadeiras de centenas de espécies.

Cada novo sistema de defesa que surge funciona como um filtro, com o qual as plantas se livram de alguns herbívoros, mas não de todos. Ao longo da história evolutiva, essa "corrida armamentista" de certa forma favoreceu a propagação de especialistas – herbívoros cujos ataques ficaram restritos a plantas de espécies aparentadas (em geral, integrantes de um mesmo gênero ou de uma mesma família botânica)–, o que por sua vez gerou um aumento no número de espécies (vegetais e animais) envolvidas nessa trama de interações. Como resultado, cada planta tende a ter a sua própria carga de herbívoros especializados; bem diferente, por exemplo, da carga de herbívoros das plantas não aparentadas que estão crescendo a seu lado.

Se são tão numerosos e vorazes, por que os insetos herbívoros simplesmente não comem suas plantas-hospedeiras até esgotá-las (como, aliás, costumam fazer nas áreas de cultivos)? Como é possível que florestas e outras paisagens naturais, que recobrem a Terra como um "carpete verde do Sol", permaneçam verdes, se há dentro delas tantas bocas a devorá-las? Questões gerais como essas sintetizam uma série de perguntas mais específicas e detalhadas que, ao longo das últimas décadas, movimentaram uma das áreas mais ativas e excitantes da pesquisa ecológica contemporânea: o estudo de populações de insetos herbívoros.

De um ponto de vista ecológico, os insetos herbívoros cumprem papéis fundamentais. Primeiro, são os principais consumidores da produção primária terrestre; e, segundo, porque são atacados e servem de alimento para um amplo e variado elenco de inimigos naturais, incluindo muitas outras espécies de insetos (predadores e parasitóides, por exemplo).

COSTA, Felipe A. P. L.,
revista *Ciência Hoje*, jun. 2003. Adaptado.

pesquisar e ler

A luz e a vida das plantas, de Jean M. Whatley e Frederick R. Whatley, amplia a discussão desta aula. Examina a natureza da luz e os pigmentos vegetais que, capturando essa energia, promovem o desenvolvimento da planta. Um capítulo é dedicado a sugestões de trabalhos práticos, por exemplo, a construção de um solarímetro – instrumento que mede indiretamente a intensidade de luz; experiências de germinação das sementes e do fenômeno do estiolamento, quando os vegetais ficam privados da luz solar. Na perspectiva ambiental, descreve a luz como importante fator dos ecossistemas terrestres e aquáticos. (São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária e Edusp, 1982.)

passear

Discutimos a conversão, no plano celular, da energia da luz solar em energia química, no processo designado por *fotossíntese*. Então, por que não conhecer melhor os seres vivos fotossintetizantes, tão importantes para a manutenção da vida? Convide amigos e parentes para uma visita ao Jardim Botânico e ao acervo do Museu de Botânica do Instituto de Botânica de São Paulo, na Av. Miguel Estéfano, 3031/3687, Água Funda. Telefones: 5073.6300 / 5073.9963.

Se tiver acesso à Internet, o *site* é: www.ibot.sp.gov.br. Há um ônibus que sai da estação Saúde do Metrô e passa em frente ao Instituto. O ingresso é de R$ 2,00 (dois reais). No Jardim Botânico, você pode encontrar as mais variadas espécies de vegetais dos principais ecossistemas do estado de São Paulo: mata atlântica, cerrado, campos e lagos. No Museu, pode conhecer a história evolutiva de algumas plantas e os vários produtos extraídos comercialmente das algas.

_BB1_selene_C1.indb 16 2/11/16 5:47 PM

O processo da respiração celular produz ATP

Numa ocorrência decisiva, o oxigênio – venenoso então aos organismos – começou a acumular-se na atmosfera, causando um imenso desastre ecológico aos organismos primitivos [...] *algumas moléculas de oxigênio (O_2) sofriam divisão quando absorviam energia do raio ultravioleta e formavam átomos simples de oxigênio. Quando estes foram recombinados com o oxigênio, formavam-se moléculas de ozônio (O_3). O ozônio formou um escudo protetor em volta da Terra* [...] *com isso, preparava-se um ambiente para um tipo de vida mais complexo* [...] *os responsáveis pela transição fundamental da água para a terra.*

Cheryl Simon e Ruth S. DeFries.
***Uma Terra, um futuro.* 1992. Adaptado.**

No processo da respiração celular, os carboidratos (principalmente a glicose) são degradados e os átomos de hidrogênio são separados dos átomos de carbono, que se combinam com o oxigênio. Elétrons tirados do hidrogênio passam de níveis energéticos mais altos para mais baixos, e a energia é liberada para a regeneração das moléculas de ATP (ADP + Pi + energia ⟶ ATP).

Tanto na presença quanto na ausência do gás oxigênio, a glicose pode ser usada como fonte de energia pelas células. Mas o rendimento máximo de energia é obtido sob condições aeróbicas (com o gás oxigênio). A equação global da respiração celular pode ser escrita da seguinte forma:


$$\underset{\text{glicose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{gás oxigênio}}{(6)\,O_2} \longrightarrow \underset{\text{gás carbônico}}{(6)\,CO_2} + \underset{\text{água}}{(6)\,H_2O} + \underset{\text{(adenosinas tri-fosfatos)}}{\textbf{energia}\ (\text{ATPs})}$$

A respiração celular ocorre em organelas membranosas do citoplasma, as *mitocôndrias*, em todas as células dos seres vivos eucarióticos: protistas, fungos, animais e vegetais.

As mitocôndrias têm, geralmente, forma de bastonete, comprimento aproximado de 4 µm e diâmetro de 0,6 µm. Encontram-se imersas no hialoplasma. Seu número é variável, dependendo do tipo e das necessidades energéticas da célula. Por exemplo, a alga verde unicelular *Microsterias* tem uma só mitocôndria; a ameba, até 500 000; e uma célula do fígado de mamífero, aproximadamente 1 000.


Através de estudos microscópicos sofisticados, foi possível conhecer a estrutura das mitocôndrias: fazendo limite com o hialoplasma, existe uma membrana externa e contínua; abaixo dessa membrana, existe outra, a interna, bastante invaginada, formando pregas que se projetam para o interior da organela, chamadas *cristas mitocondriais*.

As mitocôndrias são preenchidas por um fluido, a *matriz mitocondrial,* constituída por água, enzimas, ribossomos, RNA e DNA.



As mitocôndrias são consideradas o centro respiratório da célula, os conversores de energia aproveitável para o metabolismo.

Visão geral do processo da respiração celular



Esquema dos principais passos do metabolismo energético numa célula eucariótica. Observe que a energia, em forma de moléculas de ATP, é formada em diversas fases: 1) a glicólise, a partir da glicose, 2) o ciclo de Krebs e 3) a cadeia respiratória.

As células que consomem o gás oxigênio (O_2), ditas *aeróbicas*, utilizam três mecanismos para retirar a energia dos alimentos: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons – os dois últimos estão muito ligados.

225-1

_BB1_selene_C1.indb 17 2/11/16 5:47 PM

a glicólise

Steve Raymer/Corbis



Na ausência do gás oxigênio, as células dos animais formam uma substância chamada ácido láctico, que, quando acumulada no tecido muscular, causa fortíssimas contrações (cãibras).

Quando a molécula de glicose atravessa a membrana plasmática, uma série de reações químicas dá início ao processo, do qual participam mais de 10 enzimas, promovendo transformações graduais na glicose, até formarem-se duas moléculas de ácido pirúvico. O resultado dessa fase é a regeneração de 2 ATPs.

A glicólise é, do ponto de vista do rendimento energético, um mecanismo pouco eficiente, considerado bastante rudimentar.

A glicólise também é chamada *fase anaeróbica da respiração celular*, porque não ocorre o consumo de gás oxigênio. Os ácidos pirúvicos podem formar produtos diferentes para cada organismo. Por exemplo, nos fungos microscópicos, os levedos, o ácido pirúvico é transformado em álcool (fermentação alcoólica); e em algumas células de vertebrados, como as musculares, em ácido láctico (fermentação láctica).





Diagrama representando a sequência das reações químicas e os produtos formados com a quebra gradual da glicose. Note que em nenhuma dessas reações participa o gás oxigênio. Ele será usado apenas na "etapa final" da respiração, na cadeia transportadora de elétrons.

o ciclo de Krebs

Quando atravessam a membrana da mitocôndria, os ácidos pirúvicos são dirigidos por uma série de enzimas a participar de um mecanismo chamado *ciclo dos ácidos tricarboxílicos* ou *ciclo de Krebs* – homenagem ao bioquímico alemão Hans Krebs, que o descobriu em 1938.

Em linhas gerais, os ácidos pirúvicos reagem com outras substâncias na matriz mitocondrial, formando o composto acetil-coenzima-A. E, daí para o Krebs, interagem compostos, num processo cíclico, com 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos.

Durante essa fase, ocorrem a retirada do carbono e a do hidrogênio, designadas, respectivamente, por *descarboxilação* e *desidrogenação*. O carbono é liberado para o meio sob a forma de gás carbônico. O hidrogênio é reativado por aceptores e transportadores, sendo os principais os nucleotídeos FAD (flavina-adenina-dinucleotídeo) e NAD (nicotinamida-adenina-dinucleotídeo).



Representação esquemática do ciclo de Krebs.
A reação tem início com o ácido oxalacético (4C) e o acetil-CoA, compondo o ácido cítrico (6C). Ao final de uma série de reações químicas, o ácido oxalacético é regenerado, formando uma molécula de ATP, três moléculas de $NADH_2$, uma de $FADH_2$ e duas moléculas de CO_2.

225-1

_BB1_selene_C1.indb 18 2/11/16 5:47 PM


Como observamos, a finalidade do ciclo de Krebs é "moer" os produtos da glicólise, produzindo resíduos como o carbono e o hidrogênio. Considera-se baixo o rendimento energético do Krebs, já que regenera apenas duas moléculas de ATP.

a cadeia transportadora de elétrons

A cadeia transportadora de elétrons é um sistema formado por um conjunto de compostos enzimáticos e não enzimáticos, que contribui para o transporte do hidrogênio até o gás oxigênio (O_2).

Resumidamente, acontecem os seguintes eventos: um conjunto de compostos não enzimáticos chamados *citocromos* (a, a3, b e c) transfere os elétrons do átomo de hidrogênio – trazidos pelo FAD(H_2) e NAD(H_2) – até o aceptor final, que é o O_2; este ativa-se (1/2 O_2^-) e combina-se com o hidrogênio ($2H^+$), formando água (H_2O).


Pesquisas mostraram que, em pontos específicos da cadeia, são regeneradas 36 moléculas de ATP por molécula de glicose consumida. Por isso, a cadeia transportadora de elétrons é considerada a mais energética das fases da respiração celular.



Visão geral do processo da respiração celular e um exemplo do uso dos produtos, isto é, as moléculas de ATP.

225-1


_BB1_selene_C1.indb 19 2/11/16 5:47 PM



Esquema da cadeia transportadora de elétrons, que ocorre nas cristas da mitocôndria. Os elétrons são transferidos para os citocromos até o oxigênio, que, reduzido, reage com o hidrogênio formando água, o produto final da respiração celular. Ênfase deve ser dada no entendimento da função do gás oxigênio – produzido na fotossíntese, combina-se com os hidrogênios retirados da molécula de glicose, tornando-os metabolicamente menos reativos.

O rendimento energético da respiração celular

A reação de oxidação da glicose, medida no calorímetro, desprende uma energia equivalente a 690 000 cal/mol. Como você deve estar lembrado, a saída de um grupo fosfato da molécula de ATP libera energia de 8 000 cal/mol; então, o rendimento energético da respiração celular é 38 ATP × 8 000 cal/mol = 304 000 cal/mol.




Desenho esquemático do rendimento energético da mitocôndria: é alto quando o comparamos com o de uma locomotiva.

Portanto, a célula consegue extrair aproximadamente 46% da energia da glicose. Os 54% restantes são dissipados em calor, que, como você estudará nos próximos cadernos de Bio A, mantém a temperatura corpórea de organismos homeotérmicos, como o nosso.

Se considerarmos que a locomotiva, máquina inventada pelo homem, tem rendimento energético de apenas 8% do que lhe é fornecido, constatamos que as células aeróbicas têm um rendimento bastante alto.

Relação entre a fotossíntese e a respiração celular



Os cloroplastos, nas folhas e nas algas, captam a energia luminosa, convertendo água (H_2O) e gás carbônico (CO_2) em moléculas orgânicas e eliminando o gás oxigênio (O_2), um subproduto do processo conhecido como fotossíntese. As mitocôndrias fazem o inverso: fragmentam as moléculas orgânicas com consumo do O_2, para usar a energia liberada nas tarefas biológicas que mantêm a vida; esse processo denomina-se respiração celular.

A fotossíntese, como vimos, depende da qualidade da luz. O que acontece com o vegetal quando se aumenta ou se diminui a intensidade luminosa? E a respiração, depende da luz? Observe a seguir.




Gráfico de dois processos fisiológicos celulares, a fotossíntese e a respiração, em função da luz. Aumentando-se a intensidade luminosa, nota-se o aumento da velocidade da fotossíntese. A respiração celular não depende da luz, por isso, no gráfico, a velocidade da respiração mostra-se constante.


Até determinado ponto, aumentando-se a luz, há aumento da taxa da fotossíntese. A respiração, no entanto, é um processo que independe da luz.

_BB1_selene_C1.indb 20 2/11/16 5:47 PM

Podemos perceber, no gráfico, que existe um ponto onde a taxa de fotossíntese iguala-se à da respiração: é o chamado *ponto de compensação fótico* (PC), *fotótico* ou *luminoso*.

O ponto de compensação fótico é uma relação que se faz entre a fotossíntese e a respiração celular, indicando que numa certa intensidade de luz, todo o gás oxigênio (O_2) produzido por fotossíntese é consumido pela respiração, e todo o gás carbônico (CO_2) produzido por respiração é consumido pela fotossíntese. Esquematicamente, temos:

F = fotossíntese
R = respiração



Se existe uma relação entre luz, fotossíntese e respiração, existirão situações nas quais a fotossíntese é maior ou menor do que a respiração celular? Em quais condições esses eventos podem acontecer? Novamente, analise o gráfico:






Gráfico que apresenta o chamado ponto de compensação fótico ou luminoso. O ponto é determinado quando, numa certa intensidade de luz, a velocidade relativa da fotossíntese iguala-se à velocidade relativa da respiração.

Interpretando o gráfico acima, preencha os espaços com os símbolos < (menor que) ou > (maior que). Indique os gases envolvidos nos processos do metabolismo energético:



a) Amanhecer: a energia dos primeiros raios luminosos é suficiente para o início do processo da fotossíntese. b) Meio-dia: a intensidade da energia solar é forte (descontando-se as nuvens), coroando todas as formas vegetais; nessa situação, a velocidade relativa da fotossíntese supera a da respiração. c) Noite: na ausência de luz, a fotossíntese cessa.

Reveja o conceito de ponto de compensação fótico e identifique no gráfico, em F_1 ou F_2, respectivamente, qual dos dois tipos de vegetais alcança primeiro o P.C.: vegetais de "sombra" (*umbrófilos*) – por exemplo, a samambaia – ou vegetais de "sol" (*heliófilos*) – por exemplo, o ipê.



Nem todas as espécies vegetais atingem ao mesmo tempo o ponto de compensação fótico. As plantas com baixo requerimento de luz, ditas "de sombra" ou umbrófilas, atingem o ponto de compensação antes daquelas que precisam de muita luminosidade, chamadas "de sol" ou heliófilas. No gráfico, F_1) tipo de vegetal umbrófilo e F_2) tipo de vegetal heliófilo.

A origem das mitocôndrias e dos cloroplastos

Sobre a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos das células eucarióticas, também conhecida como *Teoria Endossimbiótica*, leia o que diz a professora Sônia Lopes, da Universidade de São Paulo (USP), em seu livro:

Supõe-se que os primeiros eucariontes eram anaeróbios e que tinham por hábito englobar bactérias como alimento. Em algum momento da evolução desses organismos, algumas dessas bactérias, que já tinham a capacidade de realizar a respiração, eram mantidas no citoplasma dos eucariontes sem ser degradadas. Essas bactérias teriam sido mantidas por dar vantagens aos eucariontes, uma vez que realizavam para eles a respiração.

A respiração é um processo de liberação de energia dos alimentos muito mais eficiente que a fermentação. Para a bactéria, essa condição também era vantajosa, pois recebia proteção e nutrientes dos eucariontes. Essa relação simbiótica com benefícios para ambos os indivíduos (mutualismo) teria se perpetuado, e essas bactérias teriam dado origem às atuais mitocôndrias.

Algum tempo depois de estabelecida essa relação simbiótica, alguns eucariontes iniciaram outra relação simbiótica, desta vez com cianobactérias. Estas realizavam a fotossíntese para o eucarionte e dele recebiam proteção. Essa relação mostrou-se tão vantajosa que se perpetuou, e essas cianobactérias teriam dado origem aos atuais cloroplastos.

Existem fortes evidências a favor dessa hipótese. A mais importante delas refere-se ao fato de que os atuais cloroplastos e mitocôndrias são as únicas organelas citoplasmáticas que possuem seu próprio ácido nucleico, sendo capazes de se dividir independentemente do comando do material genético da célula.

LOPES, Sônia. *Bio*. São Paulo: Scipione, 1998.

225-1

_BB1_selene_C1.indb 21 2/11/16 5:47 PM

Outros processos que formam energia nas células

Além do processo da respiração celular, existem outros mecanismos energéticos capazes de formar ATP a partir da quebra da molécula de glicose no mundo dos seres vivos, realizados principalmente por alguns poucos grupos de bactérias e de fungos. Trata-se da *fermentação* e da *respiração anaeróbica*. Contudo, levando-se em conta a eficiência, isto é, a produção de moléculas de ATP, o rendimento é baixo, quando comparado com a respiração. A seguir, vamos examinar as equações químicas globais.

a fermentação alcoólica

$$\underset{\text{glicose}}{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow (2)\ \underset{\substack{\text{álcool}\\\text{etílico}}}{C_2H_5OH} + (2)\ \underset{\substack{\text{gás}\\\text{carbônico}}}{CO_2} + \textbf{energia}\ (ATP)$$

Percebe-se que, na fermentação, a glicose é degradada parcialmente – e sem o uso do gás oxigênio – para a obtenção de energia. Os resíduos produzidos na fermentação alcoólica são o álcool e o gás carbônico.

A fermentação já era conhecida na Antiguidade – existe inclusive um relato desse processo na Bíblia: Noé cultivou uvas e com elas fabricou vinho. Atualmente, os processos fermentativos contam com alta sofisticação tecnológica. São usados principalmente nas indústrias que produzem álcool (combustíveis e bebidas) e na panificação.

Algumas bactérias e também células dos animais são capazes de realizar a fermentação chamada *láctica*, quando há necessidade de muita energia, mas a concentração do gás oxigênio é baixa. Nessa situação, o acúmulo do ácido láctico no ambiente intracelular provoca o abaixamento do pH e, como já foi visto, pode desnaturar as proteínas. Uma das causas de dor e cãibras após intenso esforço físico nos humanos é a fermentação láctica, conforme a equação química que se segue.

a fermentação láctica

$$\underset{\text{glicose}}{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow \underset{\substack{\text{ácido láctico}\\ CH_3CH(OH)COOH}}{} + \textbf{energia}\ (ATP)$$

a respiração anaeróbica

$$\underset{\text{glicose}}{C_6H_{12}O_6} + (4)\ \underset{\text{nitrato}}{NO_3} \longrightarrow (6)\ \underset{\substack{\text{gás}\\\text{carbônico}}}{CO_2} + (6)\ \underset{\text{água}}{H_2O} + (2)\ \underset{\text{nitrogênio}}{N_2} + \textbf{energia}\ (ATP)$$

Na respiração anaeróbica, o oxigênio é substituído pelo nitrato. Veremos na frente A de Biologia que a respiração anaeróbica, promovida pelas bactérias, cumpre um importante papel no chamado *ciclo do nitrogênio*.

Exercício

1. (Fatec) Os esquemas a seguir evidenciam três maneiras diferentes por meio das quais a glicose pode ser utilizada como fonte de energia necessária à manutenção da vida.

Esquema 1

glicose
↓ glicólise
ácido pirúvico
↓ fermentação
etanol, CO_2 e ATP

Esquema 2

glicose
↓ glicólise
ácido pirúvico
↓ fermentação
ácido láctico e ATP

Esquema 3

glicose
↓ glicólise
ácido pirúvico
↓ ciclo de Krebs
↓ cadeia respiratória
H_2O, CO_2 e ATP

Assinale a alternativa correta sobre esses esquemas.

a) Os esquemas 1 e 3 ocorrem em ambientes totalmente anaeróbios para a produção de pães e bolos.

_BB1_selene_C1.indb 22 2/11/16 5:47 PM

b) O esquema 1 exibe a fermentação alcoólica realizada nas mitocôndrias de leveduras com consumo de oxigênio.
c) O esquema 2 revela um processo aeróbio realizado nas mitocôndrias de lactobacilos e de células musculares humanas.
d) O esquema 3 demonstra um processo aeróbio em que o gás oxigênio atua como agente oxidante de moléculas orgânicas.
e) Os esquemas 1, 2 e 3 evidenciam processos aeróbios de obtenção de energia que ocorrem em plantas e animais em geral.

Estudo orientado

exercícios

1. (Enem) Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia.
O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da
a) liberação de gás carbônico.
b) formação de ácido láctico.
c) formação de água.
d) produção de ATP.
e) liberação de calor.

2. (PUC) Em uma célula vegetal, o gás carbônico liberado a partir de reações que ocorrem em uma organela (I) é utilizado em reações que ocorrem em outra organela (II). Nessa afirmação a organela indicada por I é
a) a mitocôndria e o gás carbônico liberado são usados na organela II para a realização da respiração celular.
b) a mitocôndria e o gás carbônico liberado são usados na organela II para a realização da fotossíntese.
c) o cloroplasto e o gás carbônico liberado são utilizados na organela II para a realização da respiração celular.
d) o cloroplasto e o gás carbônico liberado são utilizados na organela II para a realização da fotossíntese.
e) o cloroplasto e a indicada por II, a mitocôndria, onde ocorrem, respectivamente, a respiração celular e a fotossíntese.

3. (Fuvest) Considere a situação hipotética de lançamento, em um ecossistema, de uma determinada quantidade de gás carbônico, com marcação radioativa no carbono. Com o passar do tempo esse gás se dispersaria pelo ambiente e seria incorporado por seres vivos. Considere as seguintes moléculas:

I. Moléculas de glicose sintetizadas pelos produtores.
II. Moléculas de gás carbônico produzidas pelos consumidores a partir da oxidação da glicose sintetizadas pelos produtores.
IV. Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores.

Carbono radioativo poderia ser encontrado nas moléculas descritas em
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

roda de leitura

Bactérias vivem sem oxigênio e sem luz do Sol

Definir quais são as condições básicas para manter a vida na Terra é uma tarefa cada vez mais complexa. Há tempos se sabe da existência de organismos extremófilos, capazes de sobreviver em ambientes inóspitos e improváveis – pelo menos aos humanos. Mas uma nova descoberta acaba de levar a vida um pouco mais longe. No caso, para baixo.

Um grupo formado por pesquisadores de diversos países encontrou, em escavações numa mina de ouro na África do Sul, bactérias vivendo em rochas a 2,8 mil metros de profundidade. Se parasse por aqui, já seria uma notável descoberta, mas a história continua.

Trata-se da primeira comunidade microbial até hoje descoberta que depende exclusivamente de hidrogênio e enxofre produzido geologicamente. Mais: os organismos encontrados, pertencentes ao filo Firmicutes, são completamente independentes da energia derivada da luz solar. De onde retiram energia para se manter? Da conversão de moléculas de água por minerais radioativos como urânio e tório.

Se esse cenário parece estranho às formas de vida superficiais ou aquáticas, o mesmo não ocorre para as bactérias agora descobertas. Segundo o estudo, publicado na edição de 20 de outubro da revista Science, *os microrganismos estão no interior do planeta há dezenas de milhões de anos.*

"São bactérias realmente únicas, no mais puro sentido da palavra", disse Li-Hung Lin, da Universidade Nacional de Taiwan, primeiro autor do artigo. "Essa descoberta mostra que conhecemos surpreendentemente muito pouco a respeito da origem, da evolução e dos limites da vida na Terra", disse outra autora, Lisa Pratt, da Universidade de Indiana, em comunicado da instituição.

_BB1_selene_C1.indb 23 2/11/16 5:47 PM

A descoberta tem diversas implicações. Uma imediata é a expansão da bioesfera terrestre, ou seja, da camada em que ocorre vida no planeta. Outra é que se formas de vida encontram maneiras de sobreviver em situações tão extremas na Terra, o mesmo – ou ainda mais – poderia ocorrer em outros planetas, como Marte.

Em 1996, um estudo apontou a existência de bactérias no meteorito ALH84001, encontrado 12 anos antes na Antártica e que teria sido lançado de Marte por um impacto de outro meteorito no planeta. Também publicado na Science*, o artigo escrito por David McKay, da Nasa, e colaboradores provocou muita polêmica. Apesar de os autores serem categóricos em afirmar que não se trata de organismos terrestres, outros apontaram que o meteorito teria sido contaminado na Terra.*

Agência Fapesp, 24 out. 2006.

gabarito

aula 1

1. c

2. b

3. a

aula 2

1. a

2. b

aula 3

1. a

2. b

3. e

225-1

_BB1_selene_C1.indb 24 2/11/16 5:47 PM