

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 4

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

Obsah

- 1 Derivace vyšších řádů
- 2 Fyzikální význam derivace
- 3 Diferenciál funkce
- 4 L'Hospitalovo pravidlo
- 5 Asymptoty grafu funkce

Derivace vyšších řádů

Definice (druhá derivace)

Nechť f je funkce a f' je její derivace. Pokud existuje vlastní derivace funkce f' v bodě c , nazýváme ji **druhou derivací** funkce f v bodě c a značíme ji $f''(c)$.

Derivace vyšších řádů

Definice (druhá derivace)

Nechť f je funkce a f' je její derivace. Pokud existuje vlastní derivace funkce f' v bodě c , nazýváme ji **druhou derivací** funkce f v bodě c a značíme ji $f''(c)$.

Poznámka (derivace vyšších řádů)

Podobně lze definovat i derivace vyšších řádů. Namísto zápisů jako f'''' pak píšeme spíše $f^{(4)}$, $f^{(5)}$, ...

Derivace vyšších řádů

Definice (druhá derivace)

Nechť f je funkce a f' je její derivace. Pokud existuje vlastní derivace funkce f' v bodě c , nazýváme ji **druhou derivací** funkce f v bodě c a značíme ji $f''(c)$.

Poznámka (derivace vyšších řádů)

Podobně lze definovat i derivace vyšších řádů. Namísto zápisů jako f'''' pak píšeme spíše $f^{(4)}$, $f^{(5)}$, ...

Příklad

Derivací funkce $f(x) = x^3 + \sin x$ je funkce $f'(x) = 3x^2 + \cos x$.
Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí

$$f''(x) = (f')'(x) = 6x - \sin x.$$

Pohyb hmotného bodu po přímce

Poznámka (dráha, rychlost a zrychlení)

Předpokládejme, že hmotný bod (dále jen HB) se pohybuje po přímce (po ose x) tak, že v čase t sekund se nachází na souřadnici $s(t)$ (měřeno v metrech).

Pohyb hmotného bodu po přímce

Poznámka (dráha, rychlost a zrychlení)

Předpokládejme, že hmotný bod (dále jen HB) se pohybuje po přímce (po ose x) tak, že v čase t sekund se nachází na souřadnici $s(t)$ (měřeno v metrech).

Označme $v_h(c)$ průměrnou rychlost HB mezi časovými okamžiky $t = c$ a $t = c + h$, kde $h \neq 0$. Platí

$$v_h(c) = \frac{s(c+h) - s(c)}{h}.$$

Pohyb hmotného bodu po přímce

Poznámka (dráha, rychlost a zrychlení)

Předpokládejme, že hmotný bod (dále jen HB) se pohybuje po přímce (po ose x) tak, že v čase t sekund se nachází na souřadnici $s(t)$ (měřeno v metrech).

Označme $v_h(c)$ průměrnou rychlost HB mezi časovými okamžiky $t = c$ a $t = c + h$, kde $h \neq 0$. Platí

$$v_h(c) = \frac{s(c+h) - s(c)}{h}.$$

Okamžitou rychlost HB v čase $t = c$ získáme jako

$$\lim_{h \rightarrow 0} v_h(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(c+h) - s(c)}{h}.$$

Uvedená limita je však rovna $s'(c)$ přímo z definice derivace.

Analogicky zjistíme, že **okamžité zrychlení** HB v čase c je rovno $s''(c)$.

Příklad na pohyb hmotného bodu po přímce (1/2)

Hmotný bod se pohybuje po přímce. Závislost jeho dráhy (v metrech) na čase (v sekundách) je popsána funkcí

$$s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t.$$

Příklad na pohyb hmotného bodu po přímce (1/2)

Hmotný bod se pohybuje po přímce. Závislost jeho dráhy (v metrech) na čase (v sekundách) je popsána funkcí

$$s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t.$$

Určete:

- okamžitou rychlost a okamžité zrychlení HB v časech $t_1 = 0$ a $t_2 = 4$;
- časy, v nichž se mění směr pohybu HB, a okamžitou rychlost a zrychlení HB v těchto časech.

Příklad na pohyb hmotného bodu po přímce (1/2)

Hmotný bod se pohybuje po přímce. Závislost jeho dráhy (v metrech) na čase (v sekundách) je popsána funkcí

$$s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t.$$

Určete:

- okamžitou rychlost a okamžité zrychlení HB v časech $t_1 = 0$ a $t_2 = 4$;
- časy, v nichž se mění směr pohybu HB, a okamžitou rychlost a zrychlení HB v těchto časech.

Řešení: Vypočítáme první i druhou derivaci funkce s :

$$s'(t) = 6t^2 - 18t + 12, \quad s''(t) = 12t - 18.$$

- Okamžitá rychlost HB v čase t_1 je $s'(t_1) = 12$ m/s.
- Okamžité zrychlení HB v čase t_1 je $s''(t_1) = -18$ m/s².
- Okamžitá rychlost HB v čase t_2 je $s'(t_2) = 36$ m/s.
- Okamžité zrychlení HB v čase t_2 je $s''(t_2) = 30$ m/s².

Příklad na pohyb hmotného bodu po přímce (2/2)

Časy, v nichž se mění směr pohybu HB, se poznají podle toho, že se v nich mění znaménko rychlosti, tedy znaménko s' . Máme

$$s'(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t^2 - 3t + 2) = 6(t - 1)(t - 2).$$

Příklad na pohyb hmotného bodu po přímce (2/2)

Časy, v nichž se mění směr pohybu HB, se poznají podle toho, že se v nich mění znaménko rychlosti, tedy znaménko s' . Máme

$$s'(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t^2 - 3t + 2) = 6(t - 1)(t - 2).$$

Rychlost HB je nulová v časech $t = 1$ a $t = 2$.

- Pro $t \in \langle 0, 1 \rangle$ je $s'(t) > 0$, tedy HB se pohybuje v kladném směru.
- Pro $t \in (1, 2)$ je $s'(t) < 0$, tedy HB se pohybuje v záporném směru.
- Pro $t \in (2, +\infty)$ je $s'(t) > 0$, tedy HB se pohybuje v kladném směru.

Příklad na pohyb hmotného bodu po přímce (2/2)

Časy, v nichž se mění směr pohybu HB, se poznají podle toho, že se v nich mění znaménko rychlosti, tedy znaménko s' . Máme

$$s'(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t^2 - 3t + 2) = 6(t - 1)(t - 2).$$

Rychlost HB je nulová v časech $t = 1$ a $t = 2$.

- Pro $t \in \langle 0, 1 \rangle$ je $s'(t) > 0$, tedy HB se pohybuje v kladném směru.
- Pro $t \in (1, 2)$ je $s'(t) < 0$, tedy HB se pohybuje v záporném směru.
- Pro $t \in (2, +\infty)$ je $s'(t) > 0$, tedy HB se pohybuje v kladném směru.

Vidíme, že ke změně směru pohybu dochází právě v časech $t = 1$ a $t = 2$.
Pro okamžité zrychlení dostáváme:

$$s''(1) = -6 \text{ m/s}^2,$$

$$s''(2) = 6 \text{ m/s}^2.$$

Derivace jako rychlost změny veličiny

Poznámka (rychlost a zrychlení)

Již víme, že rychlost je derivace dráhy podle času a že zrychlení je druhá derivace dráhy podle času, resp. první derivace rychlosti podle času. Tyto poznatky však platí obecněji.

Derivace jako rychlost změny veličiny

Poznámka (rychlost a zrychlení)

Již víme, že rychlost je derivace dráhy podle času a že zrychlení je druhá derivace dráhy podle času, resp. první derivace rychlosti podle času. Tyto poznatky však platí obecněji.

Předpokládejme, že funkce f popisuje závislost nějaké fyzikální nebo jiné veličiny na čase. Hodnota $f(t)$ může reprezentovat např.:

- teplotu procesoru v čase t ;
- objem vody v retenční nádrži v čase t ;
- celkový elektrický náboj, který protekl vodičem do času t ;
- množství nakažených při epidemii v čase t ;
- množství nerozpadlých jader radioaktivní látky v čase t .

Derivace jako rychlost změny veličiny

Poznámka (rychlost a zrychlení)

Již víme, že rychlost je derivace dráhy podle času a že zrychlení je druhá derivace dráhy podle času, resp. první derivace rychlosti podle času. Tyto poznatky však platí obecněji.

Předpokládejme, že funkce f popisuje závislost nějaké fyzikální nebo jiné veličiny na čase. Hodnota $f(t)$ může reprezentovat např.:

- teplotu procesoru v čase t ;
- objem vody v retenční nádrži v čase t ;
- celkový elektrický náboj, který protekl vodičem do času t ;
- množství nakažených při epidemii v čase t ;
- množství nerozpadlých jader radioaktivní látky v čase t .

Pak $f'(t)$ udává **okamžitou rychlost** změny veličiny v čase t a $f''(t)$ **okamžité zrychlení** změny veličiny v čase t .

Derivace jako rychlost změny veličiny – příklad

Závislost poloměru kruhu na čase je dána funkcí $r : t \mapsto r(t)$. Okamžitá rychlost změny poloměru je dána funkcí $v : t \mapsto v(t)$ a okamžité zrychlení funkcí $a : t \mapsto a(t)$.

Pomocí r, v, a vyjádřete funkce popisující okamžitou rychlost a zrychlení změny obsahu kruhu v závislosti na čase.

Derivace jako rychlost změny veličiny – příklad

Závislost poloměru kruhu na čase je dána funkcí $r : t \mapsto r(t)$. Okamžitá rychlost změny poloměru je dána funkcí $v : t \mapsto v(t)$ a okamžité zrychlení funkcí $a : t \mapsto a(t)$.

Pomocí r, v, a vyjádřete funkce popisující okamžitou rychlost a zrychlení změny obsahu kruhu v závislosti na čase.

Řešení: Ze zadání okamžitě plyne, že $v = r'$ a $a = v' = r''$.

Obsah kruhu v čase t je roven $S(t) = \pi(r(t))^2$.

Okamžitá rychlost a zrychlení změny obsahu kruhu v závislosti na čase jsou dány první a druhou derivací funkce S :

Derivace jako rychlost změny veličiny – příklad

Závislost poloměru kruhu na čase je dána funkcí $r : t \mapsto r(t)$. Okamžitá rychlost změny poloměru je dána funkcí $v : t \mapsto v(t)$ a okamžité zrychlení funkcí $a : t \mapsto a(t)$.

Pomocí r, v, a vyjádřete funkce popisující okamžitou rychlost a zrychlení změny obsahu kruhu v závislosti na čase.

Řešení: Ze zadání okamžitě plyne, že $v = r'$ a $a = v' = r''$.

Obsah kruhu v čase t je roven $S(t) = \pi(r(t))^2$.

Okamžitá rychlost a zrychlení změny obsahu kruhu v závislosti na čase jsou dány první a druhou derivací funkce S :

- $S'(t) = \pi \cdot 2(r(t))^1 \cdot r'(t) = 2\pi r(t)v(t),$
- $S''(t) = (2\pi r(t)v(t))' = 2\pi(r'(t)v(t) + r(t)v'(t)) = 2\pi(v(t))^2 + 2\pi r(t)a(t).$

Motivace k pojmu diferenciál funkce

Motivace

Předpokládejme, že známe (nebo umíme spočítat) hodnotu funkce f v jistém bodě c a také hodnotu $f'(c) \in \mathbb{R}$.

Zabývejme se otázkou, jak s využitím znalosti $f(c)$ a $f'(c)$ zjistit, jak se změní hodnota funkce f , posuneme-li se z bodu c do bodu $c + h$, kde h je „malé“. Zajímá nás tedy hodnota výrazu $f(c + h) - f(c)$.


Aproximujme funkci f lineární funkcí $L(x) = f'(c)(x - c) + f(c)$, jejímž grafem je tečna ke grafu f v bodě c . Pro „malé“ hodnoty h bude

$$f(c + h) \approx L(c + h) = f'(c)(c + h - c) + f(c) = f'(c)h + f(c),$$

takže

$$f(c + h) - f(c) \approx f'(c)h.$$

Geometrický význam diferenciálu funkce



Definice (diferenciál)

Nechť funkce f má v bodě c vlastní derivaci. Pak lineární funkci df_c danou předpisem

$$df_c(h) = f'(c)h$$

nazýváme diferenciálem funkce f v bodě c .

Diferenciál funkce

Definice (diferenciál)

Nechť funkce f má v bodě c vlastní derivaci. Pak lineární funkci df_c danou předpisem

$$df_c(h) = f'(c)h$$

nazýváme diferenciálem funkce f v bodě c .

Poznámka

Pro „malé“ hodnoty h je $df_c(h) \approx f(c+h) - f(c)$, resp.

$$f(c+h) \approx f(c) + df_c(h).$$

Příklad na diferenciál – přibližný výpočet odmocniny

Příklad

Pomocí diferenciálu přibližně vypočtěte $\sqrt{101}$.

Příklad na diferenciál – přibližný výpočet odmocniny

Příklad

Pomocí diferenciálu přibližně vypočtěte $\sqrt{101}$.

Řešení

Uvažme funkci $f(x) = \sqrt{x}$, bod $c = 100$ a číslo $h = 1$. Platí

$$\sqrt{101} = f(101) = f(c + h) \approx f(c) + df_c(h).$$

Máme $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$, takže $f'(c) = 1/20 = 0,05$. Tedy

$$\sqrt{101} \approx f(c) + df_c(h) = 10 + 0,05 \cdot 1 = 10,05.$$

Příklad na diferenciál – odhad chyby objemu

Příklad

Délka hrany krychle je $3\text{ m} \pm 2\text{ cm}$. Určete přibližně (užitím diferenciálu), jakou přesnost lze zaručit, jestliže z této nepřesně naměřené hodnoty vypočítáme objem krychle.

Příklad na diferenciál – odhad chyby objemu

Příklad

Délka hrany krychle je $3\text{ m} \pm 2\text{ cm}$. Určete přibližně (užitím diferenciálu), jakou přesnost lze zaručit, jestliže z této nepřesně naměřené hodnoty vypočítáme objem krychle.

Řešení

Uvažme funkci $V(x) = x^3$, bod $c = 3$ a chybu $h = 0,02$. Platí

$$V(c \pm h) \approx V(c) \pm dV_c(h).$$

Máme $V'(x) = 3x^2$, takže

$$dV_c(h) = V'(c) \cdot h = 3 \cdot 3^2 \cdot 0,02 = 0,54.$$

Tedy

$$V(3 \pm 0,02) \approx 3^3 \pm 0,54 = 27 \pm 0,54\text{ m}^3.$$

Vypočítaný objem krychle je zaručen s přesností přibližně $\pm 0,54\text{ m}^3$.

L'Hospitalovo pravidlo

Věta (L'Hospitalovo pravidlo)

Nechť f, g jsou funkce, $c \in \mathbb{R}^*$ a předpokládejme, že platí **jedna** z následujících podmínek:

(A) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0;$

(B) $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = +\infty$ nebo $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -\infty.$

L'Hospitalovo pravidlo

Věta (L'Hospitalovo pravidlo)

Nechť f, g jsou funkce, $c \in \mathbb{R}^*$ a předpokládejme, že platí **jedna** z následujících podmínek:

(A) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$;

(B) $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = +\infty$ nebo $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -\infty$.

Existuje-li

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

pak existuje také

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$$

a platí

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Poznámky k L'Hospitalovu pravidlu

Poznámka

Analogické tvrzení platí i pro jednostranné limity.

Poznámky k L'Hospitalovu pravidlu

Poznámka

Analogické tvrzení platí i pro jednostranné limity.

Poznámka

Ačkoliv v podmínce (B) nejsou žádné požadavky na limitu čitatele $f(x)$, v příkladech se L'Hospitalovo pravidlo s podmínkou (B) obvykle používá v situacích, kdy limita čitatele je $+\infty$ nebo $-\infty$.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (1/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (1/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

Řešení

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &\stackrel{\text{LH(A)}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \stackrel{\text{LH(A)}}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} \stackrel{\text{LH(A)}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (2/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (2/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Řešení

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \stackrel{\text{LH(B)}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (3/4)

Příklad

Vypočtete $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (3/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$.

Řešení

Podle identity $a^b = e^{b \ln a}$ lze psát $x^{\sin x} = e^{\sin x \ln x}$.

Spočítáme **limitu exponentu**:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x \ln x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} \stackrel{\text{LH(B)}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{\cos x}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin^2 x}{x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{\cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x} \stackrel{\text{LH(A)}}{=} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin x \cos x}{1} = -2 \cdot 0 \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

Podle věty o limitě složené funkce je **původní limita** rovna $e^0 = 1$.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (4/4)

Příklad

Vypočtete $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right).$

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (4/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$.

Řešení

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x} \stackrel{\text{LH(A)}}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x + (x-1)\frac{1}{x}} \stackrel{\text{LH(A)}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x\ln x + x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln x + 2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo – varování

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x}$.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo – varování

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x}$.

Řešení

Čítec i jmenovatel mají limitu $+\infty$. Použití LH(B) ale vede k limitě

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x},$$

která **neexistuje**. To však **neznamená**, že nemůže existovat původní limita. L'Hospitalovo pravidlo nám tedy vůbec nepomohlo.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo – varování

Příklad

Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x}$.

Řešení

Čitatel i jmenovatel mají limitu $+\infty$. Použití LH(B) ale vede k limitě

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x},$$

která **neexistuje**. To však **neznamená**, že nemůže existovat původní limita. L'Hospitalovo pravidlo nám tedy vůbec nepomohlo.

Správný postup:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{\sin x}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 - \frac{\sin x}{x}} = \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1.$$

Poznámka: Na limitu $(\sin x)/x$ jsme použili větu o dvou policajtech.

Svislá asymptota grafu funkce

Definice (svislá asymptota)

Přímku danou rovnicí $x = c$ nazýváme **svislou asymptotou** grafu funkce f , pokud je **alespoň jedna** z limit

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

rovna $+\infty$ nebo $-\infty$.

Svislá asymptota grafu funkce

Definice (svislá asymptota)

Přímku danou rovnicí $x = c$ nazýváme **svislou asymptotou** grafu funkce f , pokud je **alespoň jedna** z limit

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

rovna $+\infty$ nebo $-\infty$.

Poznámka

Je-li funkce f spojitá na každém maximálním intervalu obsaženém v $D(f)$, svislé asymptoty $x = c$ má smysl hledat **pouze v krajních bodech** těchto intervalů.


Svislá asymptota grafu funkce – příklad

Uvažujme funkci $f(x) = \frac{1}{\operatorname{arccotg}\left(\frac{1}{x+2}\right)}$.

Platí $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Jednostranné limity f v bodě -2 jsou:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \frac{1}{\pi} \qquad \bullet \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty.$$

Druhá z limit ukazuje, že přímka $x = -2$ je svislou asymptotou grafu f .



Šikmá asymptota grafu funkce

Definice (šikmá asymptota)

Přímku danou rovnicí $y = kx + l$ nazýváme **(šikmou) asymptotou** grafu funkce f v $+\infty$, pokud platí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Analogicky definujeme pojem šikmé asymptoty grafu f v $-\infty$.

Šikmá asymptota grafu funkce

Definice (šikmá asymptota)

Přímku danou rovnicí $y = kx + l$ nazýváme **(šikmou) asymptotou** grafu funkce f v $+\infty$, pokud platí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - l) = 0.$$

Analogicky definujeme pojem šikmé asymptoty grafu f v $-\infty$.

Poznámka

Přímka daná rovnicí $y = kx + l$ je šikmá asymptota grafu funkce f v $+\infty$ právě tehdy, když platí následující dvě podmínky:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k \qquad \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = l.$$

Analogická charakterizace platí pro šikmou asymptotu v $-\infty$.

Šikmá asymptota grafu funkce – příklad

Příklad: Najděte všechny asymptoty grafu funkce $f(x) = 2x + \sqrt{x^2 + 1}$.

Šikmá asymptota grafu funkce – příklad

Příklad: Najděte všechny asymptoty grafu funkce $f(x) = 2x + \sqrt{x^2 + 1}$.

Řešení: Funkce f je spojitá na $\mathbb{R}$, graf tedy nemá svislé asymptoty.

Pro nalezení šikmých asymptot spočítejme příslušné limity v $+\infty$ a $-\infty$:

$$k_{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right) = 3$$

$$l_{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0$$

$$k_{-\infty} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right) = 1$$

$$l_{-\infty} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 1}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = 0.$$

Graf f má v $+\infty$ asymptotu $y = 3x$ a v $-\infty$ má asymptotu $y = x$.

Poznámka: Při výpočtu $k_{-\infty}$ jsme použili vztah $\sqrt{x^2} = -x$, $x \in (-\infty, 0)$.

Šikmá asymptota grafu funkce – obrázek k příkladu

