HƯỚNG TỚI THPTQG 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐỀ SỐ 15
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0015

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(2x+1) > 2$ là

A. $(-\frac{1}{2}; +\infty)$.
B. $(2; +\infty)$.
C. $(4; +\infty)$.
D. $(-\infty; 4)$.

Câu 2: Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(0; 2)$.
B. $(-\infty; 0)$.
C. $(2; +\infty)$.
D. $(-1; 3)$.

Câu 3: Giá trị của $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$ bằng

A. 0.
B. -2.
C. 1.
D. 2.

Câu 4: Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 7 = 0$ là

A. $(2; 3; 1)$.
B. $(2; -3; 1)$.
C. $(2; -3; -7)$.
D. $(1; -3; 2)$.

Câu 5: Khối lượng (kg) của 20 kiện hàng được thống kê trong bảng sau:

Khối lượng	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
Số kiện	5	10	5

Khối lượng trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 5,5.

Câu 6: Hai thiết bị hoạt động độc lập, xác suất hoạt động tốt lần lượt là 0,7 và 0,4. Biết ít nhất một thiết bị hoạt động tốt, xác suất cả hai thiết bị đều hoạt động tốt bằng

A. $\frac{7}{25}$.
B. $\frac{14}{25}$.
C. $\frac{14}{41}$.
D. $\frac{21}{41}$.

Câu 7: Một nhóm có 5 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người từ nhóm. Xác suất chọn được đúng 2 nữ bằng

A. $\frac{2}{7}$. **B.** $\frac{5}{14}$.
C. $\frac{4}{7}$. **D.** $\frac{1}{14}$.

Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 81$, công bội $q = \frac{1}{3}$. Số hạng u_4 bằng

A. 9. **B.** 1.
C. 27. **D.** 3.

Câu 9: Mặt cầu có tâm $I(1;2;-1)$ và đi qua $A(4;6;-1)$ có phương trình là

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=5$. **B.** $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=25$.
C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$. **D.** $(x-4)^2+(y-6)^2+(z+1)^2=25$.

Câu 10: Đồ thị $y=\dfrac{x^2+2}{x-1}$ có hai tiếp tuyến song song với đường thẳng $y=-2x+5$. Khoảng cách giữa hai tiếp tuyến đó bằng

A. $\frac{6}{\sqrt{5}}$. **B.** $\frac{12}{\sqrt{5}}$.
C. 12. **D.** $6\sqrt{5}$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, điểm M thay đổi trên mặt cầu $x^2+y^2+z^2=4$. Khoảng cách lớn nhất từ M đến mặt phẳng $x+2y+2z-9=0$ bằng

A. 1. **B.** 2.
C. 3. **D.** 5.

Câu 12: Một cơ sở sản xuất x sản phẩm, với $x \in \mathbb{N}^*$, $1 \le x \le 100$. Giá bán mỗi sản phẩm là $30-0{,}1x$ triệu đồng; tổng chi phí là $5x+200$ triệu đồng. Biết cơ sở bán hết sản phẩm, số sản phẩm cần sản xuất để lợi nhuận lớn nhất là

A. 100. **B.** 125.
C. 50. **D.** 80.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn đúng hoặc sai. Ở mỗi câu, chọn chính xác 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được 0,1; 0,25; 0,5; 1 điểm.

Câu 1: Một cơ sở làm đồ thủ công sản xuất x sản phẩm mỗi ngày ($x \in \mathbb{N}^*$, $1 \le x \le 80$). Giá bán mỗi sản phẩm là $p(x) = 60 - 0{,}1x$ nghìn đồng. Chi phí sản xuất bình quân mỗi sản phẩm là $g(x) = 0{,}01x^2 - 0{,}2x + 20 + \dfrac{100}{x}$ nghìn đồng. Giả sử sản phẩm luôn được bán hết, không có chi phí khác.


a) Tổng chi phí mỗi ngày là $C(x) = 0{,}01x^3 - 0{,}2x^2 + 20x + 100$ nghìn đồng.

b) Lợi nhuận mỗi ngày là $P(x) = -0{,}01x^3 + 0{,}1x^2 + 40x - 100$ nghìn đồng.

c) Lợi nhuận lớn nhất đạt được khi sản xuất 50 sản phẩm mỗi ngày.

d) Lợi nhuận lớn nhất bằng 1,02 triệu đồng.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: km), radar đặt tại $I(1;-1;2)$ có bán kính phát hiện 3 km. Drone chuyển động thẳng đều, tại thời điểm t phút ($t \ge 0$) ở vị trí $M(-5+2t;-1+t;2)$. Hình bên biểu diễn trong mặt phẳng chứa tâm radar và đường bay.



a) Mặt cầu giới hạn vùng phát hiện có phương trình $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 3$.

b) Tại thời điểm ban đầu, drone ở ngoài vùng phát hiện.

c) Drone gần radar nhất tại $t = \dfrac{12}{5}$ phút.

d) Drone nằm trong vùng phát hiện tổng cộng 2 phút.

Câu 3: Một dây chuyền có 10% linh kiện lỗi. Mỗi lần kiểm tra, máy báo lỗi với xác suất 0,8 nếu linh kiện thực sự lỗi, với xác suất 0,2 nếu linh kiện không lỗi. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện và kiểm tra hai lần. Hai kết quả độc lập khi đã biết trạng thái lỗi hay không lỗi của linh kiện.


a) Xác suất một lần kiểm tra báo lỗi bằng 0,3.

b) Xác suất cả hai lần kiểm tra đều báo lỗi bằng 0,1.

c) Biết ít nhất một lần kiểm tra báo lỗi, xác suất linh kiện thực sự lỗi bằng $\dfrac{2}{5}$.

d) Biết cả hai lần kiểm tra đều báo lỗi, xác suất linh kiện thực sự lỗi bằng 0,64.

Câu 4: Một xe chuyển động thẳng theo một chiều trong 6 giây. Đồ thị vận tốc v (m/s) theo thời gian t (giây) là đường gấp khúc nối ba điểm $(0;0)$, $(2;6)$, $(6;0)$ như hình bên.



a) Vận tốc của xe tại $t = 2$ giây bằng 6 m/s.

b) Trong 4 giây đầu, xe đi được 18 m.

c) Tổng quãng đường trong 6 giây bằng 24 m.

d) Thời điểm xe đã đi được $\dfrac{3}{4}$ tổng quãng đường là $t = 6 - \sqrt{6}$ giây.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Chỉ làm tròn ở kết quả cuối cùng.


Câu 1: Thời gian hoàn thành một tác vụ của 40 người (đơn vị: phút) được thống kê như sau, trong đó a, b là hai tần số chưa biết:

Thời gian	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$
Số người	4	a	b	6


Biết thời gian trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 4,3 phút. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng bao nhiêu phút^2? *(Làm tròn đến hàng phần trăm.)*

Câu 2: Bốn cơ thủ T, D, E, C dự giải đấu với hai trận bán kết: T gặp D, E gặp C. Hai người thắng gặp nhau ở chung kết. Điểm đánh giá của bốn cơ thủ lần lượt là $m_T = 3$, $m_D = 5$, $m_E = 4$, $m_C = 6$. Khi X gặp Y, xác suất X thắng là $\dfrac{m_X}{m_X + m_Y}$; không có trận hòa, điểm đánh giá không thay đổi và xác suất thắng một trận khi đã biết đối thủ không phụ thuộc kết quả các trận trước. Biết T vô địch, xác suất đối thủ của T trong trận chung kết là E bằng bao nhiêu? *(Làm tròn đến hàng phần trăm.)*

Câu 3: Một mái che nằm ngang cao 7 m so với mặt đất, nhô ra 8 m từ một bức tường thẳng đứng. Xe cứu hỏa đỗ bên ngoài mái che, điểm tựa dưới của thang trên xe cao 1 m so với mặt đất. Thang được coi là đoạn thẳng từ điểm tựa đến một điểm trên tường phía trên mái che; điểm tựa có thể thay đổi khoảng cách đến tường. Tường đủ cao, bỏ qua độ dày thang và cho phép thang vừa chạm mép mái. Chiều dài thang nhỏ nhất để vượt qua mái che bằng bao nhiêu mét? *(Làm tròn đến hàng phần mười.)*




Câu 4: Một sợi dây không dãn dài 15 m được kéo theo đường gấp khúc $ABCD$ qua một bức tường cao 4 m, dày $BC = 1$ m. Các điểm B, C cố định ở hai mép trên của tường; E là chân đường thẳng đứng qua C, vật cần kéo ở D trên mặt đất bên trái. Điểm F nằm trên mặt tường bên phải, cách B theo phương thẳng đứng 1 m. Đầu dây A chuyển động trên ray thẳng xuất phát từ F, nghiêng xuống sang phải và hợp với phương ngang góc $30°$. Khi $AF = 4$ m, vật D tiến về E với tốc độ 1 m/s. Khi đó đầu dây A rời xa F với tốc độ bao nhiêu m/s? *(Làm tròn đến hàng phần trăm.)*



Câu 5: Hai tàu đánh cá chuyển động trên hai nhánh khác nhau của đường cong $(C) : y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ trong hệ trục Oxy, đơn vị mỗi trục là km. Một tàu luôn có hoành độ nhỏ hơn -1, tàu còn lại luôn có hoành độ lớn hơn -1. Khoảng cách nhỏ nhất có thể giữa hai tàu bằng bao nhiêu km? *(Làm tròn đến hàng phần trăm.)*

Câu 6: Một khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 6$ m, $BC = 4$ m, $AA' = 2$ m. Điểm M thuộc AB, $AM = 2$ m. Một robot nhỏ đi từ M đến D' theo đường gấp khúc $MNPD'$: N thuộc cạnh BC, P thuộc cạnh CC'. Các đoạn MN, NP, PD' lần lượt nằm trên ba mặt $ABCD$, $BCC'B'$, $CDD'C'$. Cho phép N, P trùng với đầu mút của các cạnh tương ứng; một đoạn có thể có độ dài bằng 0. Tổng quãng đường ngắn nhất bằng bao nhiêu mét? *(Làm tròn đến hàng phần mười.)*



— HẾT —