ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 12)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0012

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 3)$. **B.** $(3; +\infty)$.

C. $(-\infty; -1)$. **D.** $(-2; 4)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 1$. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 1. **B.** 5.

C. 2. **D.** 0.

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. -2. **B.** 0.

C. $\dfrac{1}{4}$. **D.** 1.

Câu 4: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$ có phương trình là

A. $y = x + 1$. **B.** $y = x - 2$.


C. $y = 2x - 1$. **D.** $y = x - 1$.

Câu 5: Tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$ là

A. $I(2; 3)$. **B.** $I(-2; 3)$.

C. $I(-2; -1)$. **D.** $I(3; -2)$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 + x + 2}{x + 1}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$.

Câu 7: Số lượng sản phẩm bán ra của một doanh nghiệp phụ thuộc vào giá bán p (nghìn đồng) theo hàm cầu $D(p) = 800 - 10p$ với $20 \leq p \leq 70$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm là $R(p) = p \cdot D(p) = 800p - 10p^2$. Để doanh thu đạt giá trị lớn nhất thì giá bán p bằng bao nhiêu nghìn đồng?

A. 35. **B.** 50.

C. 40. **D.** 45.

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng CD. Tổng hai vectơ $\vec{AC} + \vec{AD}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{AM}$. **B.** $\vec{CD}$.

C. $2\vec{MC}$. **D.** $2\vec{AM}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -3; 5)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng tọa độ (Oxy) có tọa độ là

A. $(2; -3; 0)$. **B.** $(0; 0; 5)$.

C. $(2; 0; 5)$. **D.** $(0; -3; 5)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (2; 1; -1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b}$ là

A. $(3; -1; 2)$. **B.** $(4; -3; 5)$.

C. $(0; -5; 7)$. **D.** $(4; -1; 5)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; 0; 1)$ và $\vec{v} = (0; 1; -1)$. Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; -2)$ và $B(3; 2; 0)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. 3. **D.** $\sqrt{21}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $4\sqrt{5}$.

Câu 2: Một xưởng sản xuất thiết bị gia dụng sản xuất x trăm sản phẩm mỗi tuần ($0 < x \leq 20$). Tổng chi phí sản xuất (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 15x^2 + 180x + 80$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 300x - 6x^2$. Lợi nhuận hàng tuần của xưởng là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định ban đầu của xưởng (khi chưa sản xuất sản phẩm nào) là 80 triệu đồng.

b) Doanh thu của xưởng khi bán được 5 trăm sản phẩm là 1350 triệu đồng.

c) Hàm lợi nhuận hàng tuần của xưởng theo số lượng x là $P(x) = -x^3 + 9x^2 + 120x - 80$.

d) Xưởng đạt lợi nhuận lớn nhất trong tuần khi sản xuất 12 trăm sản phẩm.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;0)$, $B(2;0;2)$ và $C(-1;3;1)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (1;-2;2)$.

b) Độ dài cạnh AB bằng 3.

c) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(\frac{2}{3};\frac{5}{3};1\right)$.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-2;5;1)$.

Câu 4: Một quả cầu trang trí nghệ thuật có trọng lượng $P = 120$ N được giữ thăng bằng trong không gian bằng ba sợi dây cáp mảnh, nhẹ, không dãn OA, OB, OC. Ba đầu dây được cố định tại ba điểm A, B, C trên trần nhà nằm ngang tạo thành một tam giác đều, còn ba đầu kia cùng buộc vào móc treo quả cầu tại điểm O. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc tại O, tia Oz hướng thẳng đứng lên trần nhà (ngược hướng với trọng lực). Khi đó trọng lực tác dụng lên quả cầu là $\vec{P} = (0;0;-120)$ (đơn vị: N). Lực căng tác dụng lên móc treo O bởi ba sợi dây lần lượt là $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$. Biết rằng ba lực này có cùng độ lớn $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = F$, cùng tạo với phương thẳng đứng (trục Oz) một góc $45°$, và hình chiếu của ba lực lên mặt phẳng nằm ngang Oxy đôi một hợp với nhau góc $120°$.

a) Vì quả cầu ở trạng thái cân bằng nên ta có hệ thức $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

b) Hợp lực của ba lực căng dây $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$ có phương thẳng đứng hướng lên và có độ lớn bằng 120 N.

c) Độ lớn của mỗi lực căng dây là $F = 40\sqrt{2}$ N.

d) Góc tạo bởi mỗi sợi dây cáp và mặt phẳng nằm ngang của trần nhà bằng $60°$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Tìm số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+6)x - 2027$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các đỉnh $A(1;1;1)$, $B(3;2;1)$, $D(1;4;2)$ và $A'(2;1;5)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐


Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 4}{x + 1}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) A và B đang bay thử nghiệm. Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của drone A là $A(t; 2t+1; 3)$ và vị trí của drone B là $B(3t - 3; 3t + 1; 2t - 3)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

Trả lời: ☐☐☐☐


Câu 5: Một người thợ gò hàn cần cắt một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 80 cm $\times$ 50 cm để gấp thành một chiếc hộp chứa đồ hình hộp chữ nhật không nắp. Người thợ cắt ở bốn góc của tấm tôn bốn hình vuông bằng nhau có cạnh bằng x cm rồi gập các mép tôn lên (như hình vẽ minh họa). Hỏi thể tích lớn nhất của chiếc hộp đó bằng bao nhiêu đềximét khối (dm^3)?



Sơ đồ cắt tấm tôn tạo hộp chữ nhật không nắp.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một trạm phát điện gió A nằm trên đường bờ biển thẳng cần truyền tải điện ra một trạm biến áp trung gian S trên một hòn đảo ngoài khơi. Khoảng cách từ trạm biến áp S đến bờ biển là $SH = 8$ km (H là hình chiếu vuông góc của S lên bờ biển thẳng). Khoảng cách từ trạm phát điện A đến điểm H dọc theo bờ biển là $AH = 20$ km. Người ta kéo đường dây điện gồm hai đoạn: đoạn dây trên bờ chạy dọc theo bờ biển từ A đến điểm C (với C nằm giữa A và H), và đoạn cáp ngầm dưới biển nối từ C đến trạm biến áp S (như hình vẽ minh họa). Biết chi phí lắp đặt mỗi kilômét đường dây trên bờ là 30 triệu đồng, chi phí lắp đặt mỗi kilômét cáp ngầm dưới biển là 50 triệu đồng. Tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường truyền tải điện bằng bao nhiêu triệu đồng?



Sơ đồ phương án kéo đường truyền tải điện ra đảo.

Trả lời: ☐☐☐☐

——————- HẾT ——————-