المتابعة الذاتية
لمريض الربــو

الاسم :

تاريخ الولادة :

المهنة :

العنوان :

اسم المركز الصحي :

القطاع :



نصائح عامة

- الطريقة الصحيحة لاستخدام البخــاخ مع القمع
- استعمل علاج الربـــو الذي وصفـــه لك الطبيب وتجنب تركه او نسيانه
- يفضل استخدام جهاز قياس قوة الزفير وتسجيل القراءات للمتابعة

نصائح
لمرضى الربو اثناء العواصف الغبارية

- البقاء في المنزل او عدم الخروج قدر الإمكان
- وفي حال الضرورة يجب لبس كمامــة قبل الخروج
- إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام لمنع دخول ذرات الغبار إلى المنزل
- تابع حالتك و استخدم البخاخ حسب الخطة العلاجية التي وصفها لك طبيبك
- متابعة حالة الطقس والتوقعات الجوية
- التأكد من توفر بخاخ الربو لديك ومن تاريخ صلاحيته، ولا تنسَ أن تحمله معك في حال الضرورة للخروج

المفاهيم الخاطئة عن الربو

مفهوم خاطئ (أدوية الربو تسبب الإدمان)

الحقيقة

أدوية الربو آمنة ولا تسبب الإدمان وهي مفيدة للسيطرة على الربو

مفهوم خاطئ (يجب علاج الربو فقط عند ظهور الأعراض)

الحقيقة

السيطرة على الربو عن طريق الادوية التي يصفها الطبيب

مفهوم خاطئ (الاعشاب والخلطات تساعد على الشفاء من الربو)

الحقيقة

الاعشاب والخلطات غير آمنة وتسبب انتكاس في حالة المريض

مفهوم خاطئ (أدوية الربو ضارة للمراة الحامل او المرضع)

الحقيقة

أدوية الربو آمنة خلال فترة الحامل و الرضاعة

مفهوم خاطئ (ادوية الربو تسبب هشاشة العظام)

الحقيقة

بخاخات الربو آمنة ولا تسبب هشاشة العظام

مهيجات
نوبة الربو

اي من المهيجات الاتية تسبب
لك نوبة الربو
اختر ما ينطبق عليك



إختبار السيطرة على الربـــو للاعمار 12 سنة فأكثر

الاسئلة الخمسة التالية تجعلك تعرف إن كنت مسيطراً على مشكلة الربو أو إنه يعيق نظام حياتك

- اختر درجتك عن كل سؤال و اكتب الرقم في الخانة المحددة على اليسار.
- اجمع درجاتك للحصول على المجموع.
- اذا كان المجموع اقل من 20, تحتاج تعديل الخطة العلاجية مع الطبيب
- اذا كان المجموع اكثر او يساوي 20 ممتاز الخطة العلاجية فعالة

المجموع

☐

السؤال الاول : خلال الاسابيع الاربعة الاخيرة، كم من الوقت منعتك اعراض الربو (الصفير، السعال، صعوبة النفس، ضيق الصدر) من اداء العمل المطلوب، في مكان العمل/المدرسة والبيت؟

☐ ١ جميع الاوقات | ٢ معظم الوقت | ٣ بعض الوقت | ٤ قليلا من الوقت | ٥ لم يحصل ابدا

السؤال الثاني : خلال الاسابيع الاربعة الماضية، كم مرة تكررت لديك اعراض صعوبة التنفس ؟

☐ ١ اكثر من مرة في اليوم | ٢ مرة واحدة في اليوم | ٣ 3- ٦ مرات في الاسبوع | ٤ مرة أو مرتين في الاسبوع | ٥ لم يحصل ابدا

السؤال الثالث: خلال الاسابيع الاربعة الماضية، كم مرة كانت اعراض الربو (الصفير، السعال، صعوبة النفس، ضيق أو ألم بالصدر) سبباً في استيقاظك في الليل او ابكر من المعتاد صباحاً؟

☐ ١ 4 ليالي او اكثر في الاسبوع | ٢ من 2-3 ليالي في الاسبوع | ٣ مرة واحدة في الاسبوع | ٤ مرة او مرتين في الشهر | ٥ لم يحصل ابدا

السؤال الرابع : خلال الاسابيع الاربعة الأخيرة كم مرة استعملت البخاخ الاسعافي او جلسات البخار مثل فينتولين


☐ ١ 3 مرات او اكثر في اليوم | ٢ مرة إلى مرتين باليوم | ٣ من 2-3 مرات بالاسبوع | ٤ مرة في الاسبوع او اقل | ٥ لم استخدمه ابدا

السؤال الخامس : كيف تقيم مدى تحكمك في مرض الربو خلال الاسابيع الاربعة الماضية؟

☐ ١ لا يوجد تحكم مطلقاً | ٢ تحكم ضعيف | ٣ تحكم إلى حد ما | ٤ تحكم جيد | ٥ تحكم تام

نعم
يمكنني السيطرة على الاعراض

يحتاج كل شخص مُصاب بالربو إلى خطته الخاصة للعلاج. تعاون مع الطبيب المُتابع لك لوضع خطة علاج تناسبك. الهدف هو الوقاية من نوبات الربو والسيطرة عليها.



الوضع الصحي جيد اطمئن

- التنفس جيد
- لا اعاني من السعال او الصفير او ضيق الصدر المنتظم في الليل
- لا اعاني صفير او سعال او ضيق الصدر المنتظم عندما استيقظ او خلال النهار
- استطيع القيام بكافة اعمالي اليومية بدون اعراض الربو
- لا احتاج الى الغياب عن الدراسة او اخذ اجازة من العمل بسبب الربو
- احتاج دواء تخفيف الاعراض اقل من 3 مرات في الاسبوع

معنى ذلك استمر بتناول العلاج كل يوم وحسب ارشادات الطبيب

علاج المسار الاول	علاج المسار الثاني
----------	----------
----------	----------

انتبه الوضع يحتاج متابعة

اعاني من واحد او اكثر من هذه الاعراض :-

1- لدي سعال او ضيق نفس او ضيق صدر اوصفير في الصدر خلال اليوم او خلال ممارسة الرياضة او النوم

2- اشعر باصابتي بنزلة برد او انفلونزا

3- استعمل البخاخ الموسع للقصبات اكثر من 3 مرات بالاسبوع بدون سيطرة على الاعراض

علاج المسار الاول

يضاعف الجرعة إذا لم يتحسن خلال 48 ساعة يراجع الطبيب واذا تحسن يستمر على الجرعة المضاعفة لمدة اسبوعين على الأقل قبل العودة الى الجرعة السابقة.

علاج المسار الثاني

1- اذا كان يأخذ جرعة الستيرويد الاستنشاقي عند الحاجة فقط مع الفنتولين؛ الاجراء/ يأخذ الستيرويد الاستنشاقي بشكل منتظم يوميا

2- إذا كان يأخذ الستيرويد الاستنشاقي بشكل منتظم يوميا مع أخذ الفنتولين عند الحاجة؛ الاجراء/ يضاعف جرعة البخاخ الاول وإذا لم يتحسن خلال 48 ساعة يراجع الطبيب وإذا تحسن واستقرت الحالة يستمر عليه مرة يوميا

تصرف بسرعة الوضع الصحي في خطر

عند وجود اي من الاعراض الاتية :-

- البقاء في المنطقة الصفراء لمدة اكثر من 24 ساعة بدون اي تحسن
- الاعراض بدأت تسوء اكثر
- البخاخ الازرق لم يعد يفيدني
- لا استطيع القيام باي نشاط
- اجد صعوبة في الكلام او المشي
- اشعر بالتعب والنحول

كيف اتصرف:

اولا: اتصل بالاسعاف الفوري 122 او توجه لاقرب مستشفى

ثانيا: خلال فترة الانتظار استعمل جرعة اضافية من البخاخ الموسع للقصبات