دائرة الصحة العامة
Public Health Directorate

كراس لاطباء مراكز الرعاية الصحية الاولية
لتقديم الارشاد
للمصابين بمرض الربو القصبي



قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

٢٠٢١

Scanned with CamScanner

طريقة الإستخدام

يوضع الكراس على سطح المكتب بحيث تكون جهة المعلومات الطبية أمام الطبيب وجهة الصور التوضيحية في الجهة المواجهة للمراجع أثناء الشرح والإرشاد

متى يستخدم الكراس؟

حسب الحالة وسبب زيارة المريض يتم إستخدام الفصل المعني بشكوى أو تساؤلات المريض

الفصول الواجب مراجعتها مع المريض في كل زيارة

في كل زيارة يتم مراجعة خطة العمل والأدوية والتأكد من طريقة إستخدام البخاخ من قبل المريض وإختبار السيطرة على الربو

بتعاونكم معنا نصل جميعاً إلى هدفنا بتمتع الجميع بالصحة والعافية

Scanned with CamScanner

المحتويات	الصفحات
الفصل الاول	**١-٩**
التعريف والأعراض	١
ما الذي يسبب أزمة الربو؟ المحفزات	٣
كيفية السيطرة على الربو	٧
التغييرات الخاصة في غرفة النوم التي ينام فيها الشخص المصاب بمرض الربو	٨
خطط للقيام بهذه الأعمال عندما يكون الشخص المصاب بالربو خارج المنزل	٩
الفصل الثاني	**١٠-١٢**
الأنشطة الرياضية للمصاب بالربو	١٠
تعرف على علامات نوبة الربو عند تدهورها وكيفية الإستجابة	١١
علامات الخطر	١٢
الفصل الثالث	**١٣-١٦**
أجهزة قياس قوة التنفس	١٣
كيفية إستخدام جهاز قياس قوة التنفس النوع اليدوي	١٤
كيفية إستخدام جهاز قياس قوة التنفس النوع الألكتروني	١٥
كيفية إستخدام مخطط مقياس قوة التنفس	١٦
الفصل الرابع	**١٧-٢٥**
أنواع البخاخات التي يحتاجها المصاب بمرض الربو القصبي	١٧
حقائق عن بخاخات الربو الوقائية	١٨
أنواع البخاخات وطريقة الأستعمال الصحيحة لكل نوع	١٩
الفصل الخامس	**٢٦-٢٨**
خطة العمل لمريض الربو	٢٦
إختبار السيطرة على الربو	٢٧
لا ينبغي أن يحد الربو من حياتك ، كثير من الناس في العالم يعانون من الربو	٢٨

Scanned with CamScanner

الاعراض


السعال


ضيق الصدر


الصفير



قد يستيقظ المصابون بالربو ليلا بسبب السعال أو ضيق التنفس

Scanned with CamScanner

الفصل الاول

التعريف والاعراض

الربو عبارة عن مرض يؤثر على رئتيك، وهو أحد أكثر الأمراض طويلة المدى شيوعًا لدى الأطفال، كما يصاب به البالغون كذلك. يؤدي الربو إلى الصفير وضيق التنفس وضيق الصدروالسعال ليلاً أو في الصباح الباكر.

إذا كنت مصاباً بالربو، فالمرض متواجد لديك طوال الوقت، لكنك تصاب بأزمات الربو فقط عند تهيج رئتيك بعامل محفز .

إننا لا نعلم كل الأشياء التي يمكن أن تتسبب في مرض الربو، ولكننا نعلم أن العوامل الوراثية والبيئية والمهنية لها صلة بالإصابة به.

- بعض النوبات تكون خفيفة.
- بعض النوبات يمكن أن تكون خطيرة جدا.
- يمكن لنوبة خطيرة أن تسبب الوفاة.

يمكن أن يحدث في أي عمر وليس مرضا معديا، لا يمكن ان ينتقل الربو من شخص لآخر

مجری هوایی طبیعی لوزتین را پس از عمل نشان دهید؟

مجری هوایی متضایق بیمار را نشان دهید

الربو هو مرض يصيب المسالك الهوائية في الرئة

هناك أنواع مختلفة من الربو، في بعض الأنواع قد يصاب العديد من أفراد الأسرة.
تحمل المسالك او الشعب الهوائية الهواء إلى الرئتين وتصبح أصغر وأصغر مثل فروع شجرة. عندما يكون الربو تحت السيطرة، تكون الشعب الهوائية نظيفة ويمر الهواء بسهولة الى الداخل والخارج كما في الصورة الاولى.

أثناء نوبة الربو، يتحرك هواء أقل داخل وخارج الرئة، هناك سعال وصفير في الصدر يشعر المريض بالضيق أثناء نوبة الربو.
وهذا هو ما يبدو داخل الشعب الهوائية من الرئتين في الصورة الثانية حيث يحدث الاتي:-

- جدران الشعب الهوائية تصبح أكثر تورما.
- المسالك التنفسية تكون متضيقة.
- تنتج المسالك التنفسية إفرازا أكثر من المعتاد.

Scanned with CamScanner

ما الذي يسبب أزمة الربو؟ محفزات الربو

يمكن أن تصاب بأزمة الربو حينما تتعرض إلى "محفزات الربو". قد تختلف تلك المحفزات لديك بدرجة كبيرة عنها لدى شخص آخر. تعرف على محفزات الأزمة لديك واعمل على تجنبها، احذر من التعرض لأزمة حينما تعجز عن تجنب تلك المحفزات، تتضمن المحفزات الأكثر شيوعًا ما يلي -:

١-عث الغبار (Dust mite)

عث الغبارعبارةعن حشرة دقيقة تتواجد في جميع المنازل تقريبًا ،حيث يوجد في الفراش و المفروشات و السجاد والستائر والأثاث الخشبي والألعاب المحشوة. يمكنها البقاء على قيد الحياة في مجموعة من المناخات، لكنها تفضل الرطوبة العالية.

إذاكنت مصابًا بالربو، يمكن أن يسبب عث الغبارإصابتك بأزمة ربو، لتجنب الازمات، إستخدم أغطية للفراش* والوسادات لايجاد حاجز بينك وبين عث الغبار ، لا تستخدم الوسادات أواللحاف أوالاغطية المحشوة من الداخل، قم بإزالة الالعاب المحشوة والاشياء المتراكمة من غرفتك.اغسل الشراشف على أعلى درجة حرارة متوافرة.

٢-الروائح القوية والعطور

لتجنب نوبات الربو

- ابتعد عن العطور ومواد التنظيف مثل الصابون والشامبو والمستحضرات والكريمات التي رائحتها قوية.
- ابتعد عن البخور وبعض انواع الشموع العطرية .

* أغطية الفراش وان امكن النوع المقاوم للغبار والاتربة (special dust proof)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

٣- الدخان الناتج عن حرق الاخشاب والفحم أو الحشائش المحترقة

الدخان الناتج عن حرق الاخشاب أوالنباتات الاخرى يتكون من مزيج من الغازات والجزيئات الضارة.استنشاق الكثيرمن هذا الدخان يمكن أن يسبب أزمة ربو. تجنب إحراق الخشب في منزلك. انتبه إلى توقعات حالة الطقس لغرض تخطيط انشطتك حينما ينخفض مستوى تلوث الهواء

٤- تلوث الهواء الخارجي والعواصف الترابية .

يمكن أن يسبب تلوث الهواء الخارجي أزمة ربو.ينتُج هذا التلوث عن المصانع والسيارات ومصادر أخرى مختلفة.
إنتبه إلى توقعات حالة الطقس لتخطيط أنشطتك حينما ينخفض مستوى تلوث الهواء.
يكون مرضى الربو أكثر تأثراًوتضرراً خلال العواصف الترابية وتكون الأعراض أسوء والتنفس أكثر صعوبة

٥- دخان التبغ

إذاكنت مصابًا بالربو وتدخن،عليك الاقلاع عن التدخين.
"التدخين الثانوي" هو الدخان الصادر عن شخص مدخن ويتنفسه شخص آخر. يمكن أن يسبب نوبة ربو
إذاكنت مصابًا بالربو، يجب ان لا يدخن الناس على مقربة منك مطلقًا، سواء في منزلك أوسيارتك أوأينما تقضي أوقاتًا طويلة

Scanned with CamScanner





٦- الحيوانات الاليفة

الاشخاص المصابون بالربو قد يكون لديهم حساسية من فراء حيواناتهم الاليفة، لذلك لن يساعد قص فراء الحيوان على السيطرة على الربو لديك ويجب غسله اسبوعيا.

إذاكنت تعتقد أن الحيوان الاليف ذوالفراء الموجود في منزلك يسبب لك ازمة الربو عليك ابعاده عن غرفتك/ غرفة الشخص المصاب بالربو.


٧- العفن

ينمو العفن الداخلي في المناطق التي تتوفر فيها الرطوبة مثل المطابخ والحمامات والأقبية (السرداب) أوالمناطق التي حدثت فيها أضرار بالمياه، هناك أنواع عديدة من العفن ويمكن العثور عليها في أي مناخ.

يمكن أن يؤدي التنفس مع وجود عفن إلى الاصابة بأزمة ربو، تخلص من العفن الموجود في منزلك حتى يتسنى لك السيطرةعلى أزمات الربو. يساعدك مكيف الهواء أو مزيل الرطوبة في الحفاظ على انخفاض مستوياتها. اصلح تسربات المياه والتي تساعد على نمو العفن خلف الجدران وأسفل الارضيات.

Scanned with CamScanner














Scanned with CamScanner

٨-المحفزات الاخرى

يتأثر مرضى الربو بالمحفزات المختلفة ومنها:-

- حالات العدوى المرتبطة بالانفلونزا او البرد او الفايروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.
- انواع الحساسية واستنشاق بعض المواد الكيمياوية.
- حبوب اللقاح من الأشجار والزهور في حال وجود حساسية منها.
- التمارين البدنية الشاقة مثل الركض والاعمال الشاقة.
- بعض الادوية
- الطقس السيء مثل العواصف الرعدية أوالرطوبة المرتفعة، التنفس في الطقس البارد والهواء الجاف
- بعض أنواع الطعام والاضافات الغذائية.
- غبار الكنس
- اماكن العمل :- يجد بعض المصابين بالربو ان الربو لديهم يزداد سوءا في مكان العمل مثل المعامل والافران وغيرها.
- يمكن أن تسبب الانفعالات سرعة التنفس وهوما يؤدي بدوره إلى الاصابة بنوبات الربو.
- يمكن أن تسبب الصراصيرومخلفاتها أزمة ربو. تخلص من الصراصيرالموجود في منزلك استخدم مصائد الصراصير أو المواد الهلمية المستخدمة لقتلها لتقليل عددها بقدر الامكان داخل منزلك.

Scanned with CamScanner









Scanned with CamScanner

كيفية السيطرة على الربو

١- تأكد من أنك تعرف كيفية استخدام جهاز الاستنشاق الخاص بك بشكل صحيح، وأنك تستخدمه في كثير من الأحيان كما قال لك طبيبك.

٢- مراجعة الطبيب مرتان أو ثلاث مرات في السنة لغرض المتابعة ، المراجعة ضرورية حتى لو كنت تشعر انك بحالة جيدة وحتى لو لم يكن لديك مشاكل في التنفس.


٣- راجع خطة عمل الربو حتى تعرف متى يتدهور الربو وكيفية الاستجابة.

٤- الابتعاد عن المحفزات او المهيجات التي تسبب لك نوبة الربو.

Scanned with CamScanner








Scanned with CamScanner


عندما لا يكون الشخص المصاب بالربو موجوداً في المنزل سيكون افضل وقت للقيام بالاعمال الاتية :-

- الكنس او التنفيض اواستعمال المكنسة المكهربائية .
- طلاء الجدران او اي مكان في المنزل .
- رش المبيدات الحشرية .
- استخدام المنظفات القوية .
- طبخ الاطعمة ذات الروائح القوية .
- تهوية المنزل قبل عودة المصاب بالربو.
- ابقاء النوافذ مفتوحة إذا أمكن أثناء الكنس أو التنفيض او استعمال المكنسية الكهربائية .

- **في حالة عدم وجود من يقوم بالمساعدة في الاعمال المنزلية للمصاب بالربو، يجب ان يرتدي المصاب كمامة او وشاح عند الكنس اوالتنفيض**

Scanned with CamScanner







Scanned with CamScanner

الفصل الثاني

الانشطة الرياضية للمصاب بالربو

- للأشخاص الذين يعانون من الربو ، من الجيد ممارسة النشاط البدني بانتظام
- يمكن أن يتسبب الركض أو الرياضة أو العمل "الشاق" في ظهور أعراض لبعض المصابين بالربو

لكن هذه الأنشطة مفيدة لك

- استخدم دواء التحكم الخاص بك على النحو الموصوف لتقليل فرصة ظهور أعراض الربو.
- عند ممارسة الرياضة استخدم دواء الإنقاذ (موسع القصبات) قبل التمرين (١٠-١٥) دقيقة.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

تعرف على علامات الإصابة بنوبة الربو عند تدهورها وكيفية الاستجابة





تعرف على علامات نوبة الربو عند تدهورها وكيفية الاستجابة

الانتباه الى الاعراض الاتية :-


سعال ، صفير، ضيق نفس و استيقاظ خلال الليل

تصرف بسرعة إذا بدأت النوبة من خلال الاتي :-

- ابتعد فورا عن سبب استثارة النوبة ، إذا كنت تستطيع تحديده.
- استخدم بخاخ المسعف او المنقذ السريع (موسع القصبات).
- ابق هادئا لمدة ساعة وتأكد من أنك تستطيع التنفس بشكل أفضل.

Scanned with CamScanner






Scanned with CamScanner


علامات الخطر

اذهب الى المستشفى فورا إذا رأيت أيا من العلامات التالية:

- إذا شعرت أن البخاخ المنقذ سريع المفعول لا يساعدك بما يكفي أو لا يساعدك على الإطلاق. تنفسك سريع وبصعوبة.
- لا يمكنك التحدث بشكل جيد بسبب الربو الذي تعاني منه.
- تتحول شفتيك أو أظافرك إلى اللون الرمادي أو الأزرق.
- إذا قمت "بفتح أنفك" للتنفس.
- انسحاب ما بين الاضلاع والرقبة الى الداخل عند التنفس.
- النبض أو معدل ضربات القلب سريع جدا.
- صعوبة في المشي

Scanned with CamScanner





الفصل الثالث

اجهزة قياس قوة التنفس

يستخدم مقياس قوة التنفس في المركز الصحي أو في المنزل لغرض قياس مدى جودة التنفس

دواعي الاستخدام


١- يساعد الطبيب في تشخيص الربو القصبي.
٢- تحديد شدة نوبة الربو.
٣-يساعد الطبيب لمعرفة مدى السيطرة على الاعراض.
٤-معرفة افضل قراءة عندما تكون باحسن حال.
٥-تجيب على سؤالك :-هل الربو لدي تحت السيطرة ؟

- ✓ باستخدام مقياس قوة التنفس في المنزل يوميا ، يمكن للشخص معرفة ما إذا كان الربو يزداد سوءاً حتى قبل بدء الصفير أو السعال.
- ✓ هناك أنواع عديدة من اجهزة قياس قوة التنفس.

Scanned with CamScanner

جهاز قياس قوة التنفس النوع اليدوي









كيفية استخدام جهاز قياس قوة التنفس النوع اليدوي

١- تاكد ان المؤشر على نقطة الصفر .

٢- قف مع اجراء الاتي

- خذ نفس عميق والفم مفتوح.
- امسك الجهاز بيد واحدة.
- حافظ على الاصابع بعيدة عن المؤشر.

٣- اطباق الشفتان حول الانبوبة بسرعة ولا تدع لسانك امام الانبوبة انفخ مرة واحدة باقصى قوة وسرعة.

٤- سيتحرك المؤشر للاعلى ويبقى ، لا تحرك المؤشر نهائيا واقرأ الرقم المقابل للمؤشر.

٥- اكتب القراءات في ورقة.

٦- قم بارجاع المؤشر الى نقطة الصفر انفخ مرتين.

٧- في كل مرة اكتب النتيجة وقم بارجاع المؤشر الى نقطة الصفر.

٨- اختر الرقم الاعلى للقراءات الثلاثة والذي يمثل قياس تدفق الهواء لديك.

Scanned with CamScanner

جهاز قياس قوة التنفس النوع الالكتروني







Scanned with CamScanner

كيفية استخدام جهاز قياس قوة التنفس النوع الالكتروني

ثبت القطعة الفموية البلاستيك على الجهاز

١- اضغط زر التشغيل ستظهر وتومض على شاشة الجهاز مايدل على بدء التشغيل (□□□).
٢- خذ نفس عميق ، اطبق الفم باحكام حول القطعة الفموية وانفخ بكل قوة وبالسرعة الممكنة.
٣- بعد ثانيتين سوف تسمع صوت الجهاز وتظهر لك نتيجة الفحص.
٤- اضغط على (◄) او (►) لاعادة تشغيل.
٥- كرر نفس الخطوات السابقة مرتين اضافيتين.
٦- الجهاز سوف يختار القراءة الاعلى فقط.
٧- الجهاز لن يسجل اذا كانت النفخة اطول من ٤ ثواني ،سوف تسمع الصوت ٣ مرات لتذكيرك.
٨- اضغط لمدة ثانيتين الجهاز سيصدر صوت ٣ مرات ويسجل القراءة الاعلى تلقائيا .(SAVE/ENTER)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Date:
Personal Best:

Green ≥ 80% Yellow 79% _ 50% Red ≤49%

	Date														
	Time	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
650															
600															
550															
500															
450															
400															
350															
300															
250															
200															
150															
100															
50															

كيفية استخدام مخطط مقياس قوة التنفس

١- اكتب التاريخ في أعلى الصفحة.كل صفحة يمكن ان تحتوي على ٨ اسابيع من قراءات مقياس التدفق.
٢- لكل يوم (على سبيل المثال ، الأحد الأحد) ، يوجد عمود أبيض لقراءتك الصباحية وعمود رمادي للقراءة المسائية.
٣- لكل صباح ومساء ، استخدم حبراً أسود لتسجيل أفضل قراءات لمقاييس الجريان الثلاثة. انظر الصفحة السابقة لمعرفة كيفية استخدام مقياس التدفق.
٤- يمكنك استخدام الخلايا أدناه لتسجيل عدد المرات التي استخدمت فيها دواء المنقذ السريع.

ملاحظة هامة

- ✓ اصطحب مخططك معك دائما عندما تذهب لرؤية طبيبك .
- ✓ إذا فقدت سجلا من مقياس التدفق ، فلا تقم بتشكيله ، اتركه فارغاً.
- ✓ اكتب على الرسم البياني إذا كنت قد غيرت أدويتك ، أو إذا كنت مصاباً بنزلة برد، أو إذا أصبت بنوبة ربو.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



احمل معك دائما دواء الإنقاذ السريع (موسع القصبات)عند مغادرة المنزل

الفصل الرابع

انواع البخاخات التي يحتاجها المصاب بمرض الربو القصبي


١. البخاخات المسعفة (موسع القصبات فقط)

تستخدم لتخفيف الاعراض عند حدوثها، معظم البخاخات المسعفة تحتوي على دواء "موسع قصبي" واحد فقط ، لكنها لا تعالج التهاب (تورم) الشعب الهوائية الذي بدوره يسبب زيادة الأعراض.

اذا كنت تحتاج إلى البخاخ المسعف أكثر من ٤ مرات في يوم واحد لوقف نوبات الربو، فأنت بحاجة إلى استنشارة الطبيب فورا.

احمل معك دائما دواء الإنقاذ السريع (موسع القصبات)عند مغادرة المنزل

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

٢. البخاخات الوقائية (التحكم بالاعر اض)

تقلل من تورم الشعب الهوائية وكمية المواد المخاطية بداخلها وتحمي الرئة وتمنع نوبات الربومن البداية. تحتوي أجهزة التحكم على جرعة منخفضة من الستيرويدات المستنشقة. هذه الأدوية آمنة تماماً.وتتم زيادة الجرع في حال ساءت او زادت الاعراض.

عند تناول جرعات منتظمة يتم امتصاص كميات صغيرة جداً من الرئتين. في كثير من الحالات يتم دمجهم في نفس جهاز الاستنشاق مع دواء منقذ طويل المفعول.

حقائق عن بخاخات الربو الوقائية

- آمنة للاستخدام اليومي.
- لا يمكنك أن تدمن على الأدوية الوقائية من الربو، حتى لو كنت تستخدمها لسنوات عديدة.
- تساعد على التخلص تورم جدران الشعب الهوائية.
- ليس صحيحاً أنها تصبح أقل فاعلية بمرور الوقت ولا داعي للقلق من أنها لن تعمل على المدى الطويل إذا كنت تستخدمها يومياً.

Scanned with CamScanner







Scanned with CamScanner


انواع البخاخات وطريقة الاستعمال الصحيحة لكل نوع



Scanned with CamScanner

1
2
3
4
5
6
7
8

METERED DOSE INHALER



Step	Action
1	Remove MDI cap
2	Shake MDI vigorously
3	Exhale slowly & completely ……
4	away from mouthpiece
5	Hold MDI upright (MDI mouthpiece downward) & Insert mouthpiece between teeth and close lips around it
6	Start inhaling steadily and deeply through …
7	… mouth & at the same time…
8	.. depress canister for one depression...
9	….& continue breathing fully
10	Remove inhaler, keeping lips closed
11	Hold breath as much as you can
12	Breathe normally
13	For a 2nd dose wait 20-30 seconds
14	…then repeat steps 2-12
15	Wipe MDI mouthpiece with clean dry tissue
16	Replace MDI cap
17	Keep MDI in clean & dry place

Scanned with CamScanner

METERED DOSE INHALER



Step	Action
1	Remove MDI cap
2	Shake MDI vigorously
3	Exhale slowly & completely ……
4	away from mouthpiece
5	Hold MDI upright (MDI mouthpiece downward) & Insert mouthpiece between teeth and close lips around it
6	Start inhaling steadily and deeply through …
7	… mouth & at the same time…
8	.. depress canister for one depression...
9	….& continue breathing fully
10	Remove inhaler, keeping lips closed
11	Hold breath as much as you can
12	Breathe normally
13	For a 2nd dose wait 20-30 seconds
14	…then repeat steps 2-12
15	Wipe MDI mouthpiece with clean dry tissue
16	Replace MDI cap
17	Keep MDI in clean & dry place

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

METERED DOSE INHALER +MOUTHPIECE SPACER



Step	Action
1	Remove MDI cap
2	Shake MDI vigorously
3	Hold MDI in upright position (mouthpiece downward)
4	Insert MDI mouthpiece into spacer, opposite
5	Exhale slowly & completely away from mouthpiece
6	Insert spacer mouthpiece between teeth & close lips
7	Depress canister once
8	Breath in steadily and deeply…
9	through mouth
10	Remove spacer keeping lips closed
11	Hold breath as much as you can
12	Remove spacer and breathe normally
13	For a 2nd dose wait 20-30 seconds
14	…then repeat steps 2-12
15	Remove MDI from spacer and replace MDI cap
16	Wipe spacer mouthpiece with clean tissue
17	Keep spacer and MDI in clean place

Scanned with CamScanner

10 - 15
seconds


METERED DOSE INHALER + FACE MASK SPACER

Step	Action
1	Remove MDI cap
2	Shake MDI vigorously
3	Hold MDI in upright position (mouthpiece downward)
4	Insert MDI mouthpiece into spacer (opposite the face
5	Hold MDI & spacer together keeping MDI in upright position
6	Place mask over mouth & nose…
7	…and press gently to seal mask
8	Depress canister once
9	Inhale….
10	…through open mouth…
11	for 5 breaths
12	For a 2nd dose wait 20-30 seconds
13	then repeat steps 2-11
14	Remove spacer & breath normally
15	Remove MDI from spacer
16	Replace MDI cap
17	Wipe spacer mouthpiece with clean tissue
18	Keep spacer in clean place



Scanned with CamScanner





١
٢
click
٣
٤
٥
window

TURBUHALER® DEVIC



step	Action
1	Unscrew cover
2	Hold turbuhaler® upright
3	Exhale slowly & completely ……
4	…… away from mouthpiece
5	Turn the coloured grip as far as it will go…
6	…then turn back till click sound is heard
7	Insert mouthpiece between teeth &…
8	….close lips around it
9	Inhale forcefully & deeply…
10	…through mouth
11	Remove turbuhaler® keeping lips closed
12	Hold breath as much as you can
13	Breathe normally
14	For a 2nd dose wait 20-30 seconds
15	…then repeat steps 2-13
16	Wipe mouthpiece with clean dry tissue
17	Replace cover
Patient knows how to check doses indicator	

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner


DISKUS® DEVICS



Step	Action
1	Hold the outer case in one hand and…
2	…place your other thumb on the thumbgrip
3	Push thumbgrip away as far as it will go until it clicks
4	Exhale slowly …
5	….away from mouthpiece
6	Hold diskus® with mouthpiece facing you…
7	…slide lever away as far as it will go until it clicks
8	Insert mouthpiece between teeth &…
9	….close lips around it
10	inhale steadily & deeply …
11	…through mouth
12	Remove diskus® keeping lips closed
13	Hold breath as much as you can
14	Breathe normally
15	Wipe mouthpiece with clean dry tissue
16	To close diskus® put your thumb in the thumbgrip…
17	…& slide it backwards till you hear a click
18	For a 2nd dose wait 20-30 seconds
19E	…then repeat steps 1-17 (* load 2nd dose)
20	Wipe mouthpiece with clean dry tissue
21	To close diskus® put your thumb in the thumbgrip & slide it backwards till you hear a click
Patient knows how to check the doses indicator	

1
2
3
4
5
6
7
8

AEROLIZER / HANDIHALER DEVICE



Step	Action
1	Remove the cover
2	Hold the base firmly
3	- Open aerolizer by following the arrow on mouthpiece(move clockwise) - Open the handihaler by moving the mouth piece up
4	Remove one capsule from foil strip
5	Place the capsule in the inhaler slot
6	-Close aerolizer following the arrow on mouthpiece -Close the handihaler by moving the mouth piece down
7	Hold upright & press the buttons at base (listen for the clicking sound capsule piercing)
8	then **release** the buttons
9	Insert mouthpiece between teeth & close lips around it(the inhaler device remove in upright position)
10	Remove a keeping lips closed
11	Hold breath as much as you can (5-10 second)
12	Breathe normally
13	Open the inhaler device & check if capsule is empty
14	If necessary repeat steps 10-16 till capsule is empty
15	Remove empty capsule & Close inhaler device
16	Replace cover

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

خطة العمل الخاصة بمريض الربو


	حاله تصحبه جيدة (انا بخير)
	حاله المريض (لست بخير)
	علامات الخطر(الانذار المبكر)

الحالة الصحية جيدة (انا بخير)	العلاج
التنفس جيد	كل يوم وحسب ارشادات الطبيب اتناول العلاج الواقي (علاج التحكم بالمرض)
لا اعاني من السعال او الصفير او ضيق الصدر المنتظم في الليل	
لا اعاني صفير او سعال او ضيق الصدر المنتظم عندما استيقظ او خلال النهار	قبل ممارسة التمارين الرياضية استعمل بخة من دواء ( )
استطيع القيام بكافة اعمالي اليومية بدون اعراض الربو	
لا احتاج الى الغياب عن الدراسة او اخذ اجازة من العمل بسبب الربو	ملاحظة :- استعمال البخاخ الازرق مباشرة او عن طريق الة النفخ (ان وجدت) قبل عشر دقائق من التمرين
احتاج دواء تخفيف الاعراض اقل من ٣ مرات في الاسبوع	
المنطقة الصفراء (لست بخير) حاله تيقظ وانتباه /في هذه المرحله قد تستقر الحالة او تسوء	
اعاني من واحد او اكثر من هذه الاعراض :-	استمر في العلاج الذي تستعمله في المنطقة الخضراء مع اضافة الاتي :-
١ - لدي سعال او ضيق نفس او ضيق صدر او ازيز خلال اليوم او خلال ممارسة الرياضة او النوم	• اولا :- خذ بخة من (البخاخ الازرق فنتولين) كررها بفاصل ٢٠ دقيقة لغاية ٤ جرعات اذا لم تتحسن راجع الطبيب فورا
٢ - اشعر باصابتي بنزلة برد او انفلونزا	• ثانيا :- اذا تحسنت يجب مضاعفة جرعة البخاخات الاخرى لمدة ٧ ايام حتى تتحسن وترجع للمنطقة الأمنة
٣ - استعمل البخاخ الازرق الفنتولين اكثر من ٣ مرات بالاسبوع	• ثالثا :- العودة الى العلاج السابق بعد التحسن اذا لم تتحسن او ساءت الحالة راجع الطبيب فورا
المنطقة الحمراء/علامات الخطر	**التوجه فورا لاقرب مستشفى**
عند وجود اي من الاعراض الاتية :-	اولا :- اتصل بالاسعاف الفوري او توجه لأقرب مستشفى
البقاء في المنطقة الصفراء لمدة اكثر من ٢٤ ساعة بدون اي تحسن	ثانيا :- خلال فترة الانتظار استعمل البخاخ ٢ بخة (البخاخ الازرق فنتولين)...كل عشرة دقائق
الاعراض بدأت تسوء اكثر	
البخاخ الازرق لم يعد يفيدني	
لا استطيع القيام باي نشاط	
اجد صعوبة في الكلام او المشي	
اشعر بالتعب والنحول	
ازرقاق في اللسان او اطراف الاصابع	



الفصل الخامس

خطة العمل الخاصة بمريض الربو

الحالة الصحية جيدة (انا بخير)	العلاج
النفس جيد	كل يوم وحسب ارشادات الطبيب اتناول العلاج الوقي (علاج التحكم بالمرض)
لا اعاني من السعال او الصفير او ضيق الصدر المنتظم في الليل	
لا اعاني صفير او سعال او ضيق الصدر المنتظم عندما استيقظ او خلال النهار	قبل ممارسة التمارين الرياضية استعمل بخة من دواء ( )
استطيع القيام بكافة اعمالي اليومية بدون اعراض الربو	ملاحظة :- استعمال البخاخ الازرق مباشرة او عن طريق الة التنفس (ان وجدت) قبل عشر دقائق من التمرين
لا احتاج الى الغياب عن الدراسة او اخذ اجازة من العمل بسبب الربو	
احتاج دواء تخفيف الاعراض اقل من ٣ مرات في الاسبوع	
المنطقة الصفراء (لست بخير) حالة تيقظ وانتباه /في هذه المرحلة قد تستقر الحالة او تسوء	
اعاني من واحد او اكثر من هذه الاعراض :-	استمر في العلاج الذي تستعمله في المنطقة الخضراء مع اضافة الاتي :-
١ - لدي سعال او ضيق نفس او ضيق صدر او ازيز خلال اليوم او خلال ممارسة الرياضة او النوم	• اولا :- خذ بخة من (البخاخ الازرق فنتولين) كررها بفاصل ٢٠ دقيقة لغاية ٤ جرعات **اذا لم تتحسن راجع الطبيب فورا**
٢ - اشعر باصابتي بنزلة برد او انفلونزا	• ثانيا :- اذا تحسنت يجب مضاعفة جرعة البخاخات الاخرى لمدة ٧ ايام حتى تتحسن وترجع للمنطقة الآمنة
٣- استعمل البخاخ الازرق الفنتولين اكثر من ٣ مرات بالاسبوع	• ثالثا :- العودة الى العلاج السابق بعد التحسن **اذا لم تتحسن او ساءت الحالة راجع الطبيب فورا**
المنطقة الحمراء/علامات الخطر	**التوجه فورا لاقرب مستشفى**
عند وجود اي من الاعراض الاتية :-	اولا :- اتصل بالاسعاف الفوري او توجه لاقرب مستشفى
البقاء في المنطقة الصفراء لمدة اكثر من ٢٤ ساعة بدون اي تحسن	ثانيا :- خلال فترة الانتظار استعمل البخاخ ٢ بخة (البخاخ الازرق فنتولين)...كل عشرة دقائق
الاعراض بدأت تسوء اكثر	
البخاخ الازرق لم يعد يفيدني	
لا استطيع القيام باي نشاط	
اجد صعوبة في الكلام او المشي	
اشعر بالتعب والنحول	
ازرقاق في اللسان او اطراف الاصابع	

حالة الصحية جيدة (انا بخير)

حالة التحذير (لست بخير)

علامات الخطر(الامر الطبي)

Asthma Control Test (for 12 years or older)

Do you want to know about your asthma control level, then simply take the test

The below five questions will let you know whether you are controlling your asthma or asthma controlling you..

1. Choose the most appropriate one that you think your asthma is.
2. Add your 5 scores to get the total.
3. Your total score will help you and your doctor to discuss your treatment plan.

Score

Q1 During the past 4 weeks, how often did your asthma prevent you from getting as much done at work, school or home?

① All of the time ② Most of the time ③ Some of the time ④ A little of the time ⑤ None of the time

Q2 During the past 4 weeks, how often have you had shortness of breath?

① More than once a day ② Once a day ③ 3 to 6 times a week ④ Once or twice a week ⑤ Not at all

Q3 During the past 4 weeks, how often did your asthma symptoms (wheezing, coughing, shortness of breath, chest tightness or pain) wake you up at night or earlier than usual in the morning?

① 4 or more times a week ② 3 to 6 times a week ③ Once a week ④ Once or twice a week ⑤ Not at all

Q4 During the past 4 weeks, how often have you used your rescue inhaler Bronchodilator?

① 3 or more times a day ② 1 or 2 times a day ③ 2 or 3 times a week ④ Once a week or less ⑤ Not at all

Q5 How would you rate your asthma control ?

① Not controlled ② Poorly controlled ③ Somewhat controlled ④ Well controlled ⑤ Completely controlled

Total

إختبار السيطرة على الربو (من عُمر ١٢ سنة فأكثر)

هل تريد أن تعرف مستوى حالة الربو لديك، إذاً قم بإجراء الإختبار

الأسئلة الخمسة التالية تجعلك تعرف إن كنت مسيطر على مشكلة الربو أو إنه يعيق نظام حياتك.

١. اختر درجتك عن كل سؤال و اكتب الرقم في الخانة المحددة على اليسار.

٢. اجمع درجاتك للحصول على المجموع.

٣. مجموع درجاتك سيساعدك انت وطبيبك في وضع الخطة العلاجية الخاصة بك.

النتيجة

س١ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، في كم من الوقت منعك الربو من انجاز واجباتك في العمل، أو الدراسة، أو المنزل؟

١ كل الوقت ٢ معظم الوقت ٣ بعض الوقت ٤ قليل من الوقت ٥ لم يحصل أبداً

س٢ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، كم مرة حصل لك ضيق نفس؟

١ أكثر من مرة في اليوم ٢ مرة واحدة في اليوم ٣ من ٣ إلى ٦ مرات في الأسبوع ٤ مرة أو مرتين في الأسبوع ٥ لم يحصل أبداً

س٣ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، كم مرة أيقظتك أعراض الربو (الصفير، السعال، ضيق تنفس، ضيق صدر) أو ألم في الصدر أثناء الليل أو في الصباح الباكر؟

١ ٤ مرات او أكثر في الأسبوع ٢ ٢ الى ٣ مرات في الأسبوع ٣ مرة واحدة في الأسبوع ٤ مرة أو مرتين في الأسبوع ٥ لم يحصل أبداً

س٤ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، كم مرة استخدمت بخاخة الزمات (موسعات الشعب الهوائية)؟

١ ٣ مرات أو أكثر في اليوم ٢ مرة واحدة أو مرتين في اليوم ٣ ٢ أو ٣ مرات في الأسبوع ٤ مرة واحدة في الأسبوع أو أقل ٥ لم يحصل أبداً

س٥ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، ما هو تقييمك للسيطرة على الربو عندك؟

١ لا يوجد سيطرة أبداً ٢ سيطرة ضعيفة ٣ مسيطر إلى حد ما ٤ سيطرة جيدة ٥ سيطرة تامة

المجموع

Scanned with CamScanner

Asthma Control Test (for 12 years or older)

إختبار السيطرة على الربو (من عُمر ١٢ سنه فأكثر)

Do you want to know about your asthma control level, then simply take the test

The below five questions will let you know whether you are controlling your asthma or asthma controlling you..

1. Choose the most appropriate one that you think your asthma is.
2. Add your 5 scores to get the total.
3. Your total score will help you and your doctor to discuss your treatment plan.

هل تريد أن تعرف مستوى حالة الربو لديك, إذاً قم بإجراء الإختبار

الأسئلة الخمسة التالية تجعلك تعرف إن كنت مسيطر على مشكلة الربو أو إنه يعيق نظام حياتك.

١. اختر درجتك عن كل سؤال و اكتب الرقم في الخانة المحددة على اليسار.

٢. اجمع درجاتك للحصول على المجموع.

٣. مجموع درجاتك سيساعدك انت وطبيبك في وضع الخطة العلاجية الخاصة بك.

Score		النتيجة
Q1	During the past 4 weeks, how often did your asthma prevent you from getting as much done at work, school or home? 1 All of the time 2 Most of the time 3 Some of the time 4 A little of the time 5 None of the time	س١ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، في كم من الوقت منعك الربو من انجاز واجباتك في العمل، أو الدراسة، أو المنزل؟ ١ كل الوقت ٢ معظم الوقت ٣ بعض الوقت ٤ قليل من الوقت ٥ لم يحصل أبداً
Q2	During the past 4 weeks, how often have you had shortness of breath? 1 More than once a day 2 Once a day 3 3 to 6 times a week 4 Once or twice a week 5 Not at all	س٢ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، كم مرة حصل لك ضيق نفس؟ ١ أكثر من مرة في اليوم ٢ مرة واحدة في اليوم ٣ من ٣ إلى ٦ مرات في الأسبوع ٤ مرة أو مرتين في الأسبوع ٥ لم يحصل أبداً
Q3	During the past 4 weeks, how often did your asthma symptoms (wheezing, coughing, shortness of breath, chest tightness or pain) wake you up at night or earlier than usual in the morning? 1 4 or more times a week 2 3 to 6 times a week 3 Once a week 4 Once or twice a week 5 Not at all	س٣ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، كم مرة أيقظتك أعراض الربو (الصفير، السعال، ضيق تنفس، ضيق صدر أو ألم في الصدر) أثناء الليل أو في الصباح الباكر؟ ١ ٤ مرات او أكثر في الأسبوع ٢ الى ٣ مرات في الأسبوع ٣ مرة واحدة في الأسبوع ٤ مرة أو مرتين في الأسبوع ٥ لم يحصل أبداً
Q4	During the past 4 weeks, how often have you used your rescue inhaler Bronchodilator? 1 3 or more times a day 2 1 or 2 times a day 3 2 or 3 times a week 4 Once a week or less 5 Not at all	س٤ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، كم مرة استخدمت بخاخة الزمات (موسعات الشعب الهوائية)؟ ١ ٣ مرات أو أكثر في اليوم ٢ مرة واحدة أو مرتين في اليوم ٣ ٢ أو ٣ مرات في الأسبوع ٤ مرة واحدة في الأسبوع أو أقل ٥ لم يحصل أبداً
Q5	How would you rate your asthma control ? 1 Not controlled 2 Poorly controlled 3 Somewhat controlled 4 Well controlled 5 Completely controlled	س٥ خلال ال ٤ أسابيع الماضية، ما هو تقييمك للسيطرة على الربو عندك؟ ١ لا يوجد سيطرة أبدا ٢ سيطرة ضعيفة ٣ مسيطر إلى حد ما ٤ سيطرة جيدة ٥ سيطرة تامة
Total		المجموع

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

لا ينبغي أن يحد الربو من حياتك ، كثير من الناس في العالم يعانون من الربو

يمكن أن يعيش المصابون بالربو حياة طبيعية ، ويمكن أن يكونوا نشطين عندما يتعلمون السيطرة على الربو.

عندما يكون الربو تحت السيطرة :-

- يمكنك العمل واللعب والذهاب إلى المدرسة.
- يمكنك ان تنام نوم مريح ليلا.
- يمكنك تجنب معظم نوبات الربو.
- لن تعاني من أعراض مثل الصفير أو السعال.
- لن تضطر إلى الغياب عن المدرسة أو العمل.
- سيمكنك المشاركة في جميع الأنشطة البدنية.
- لن تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى.

يمكنك السيطرة على الربو من خلال معرفة العلامات التحذيرية للأزمة والابتعاد عن الأشياء التي تسببها واتباع نصائح طبيبك.

Scanned with CamScanner

الاشراف العام

الدكتور

رياض عبد الامير الحلفي / مدير عام دائرة الصحة العامة

الدكتورة

منى عطا الله خليفة علي / مديرة قسم الوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية

فكرة واعداد

الدكتورة

علا شاكر فاضل / ر.اطباء اختصاص طب اسرة / شعبة الرعاية المتكاملة للامراض غير الانتقالية

الاشراف على مراجعة الدليل

الدكتورة منى عطا الله خليفة علي / طبيب استشاري / مديرة قسم الوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية / دائرة الصحة العامة
الدكتورة ندى عبد الوهاب موسى / ر. أطباء اختصاص طب مجتمع / مديرة شعبة الرعاية المتكاملة للأمراض غير الانتقالية.
الدكتور بشار محمد هوبي / ر. اطباء اختصاص طب اسرة / شعبة الرعاية المتكاملة للامراض غير الانتقالية.

المساهمون في تنظيم الكراس

مروان فيصل محسن / احصائي / شعبة الرعاية المتكاملة للامراض غير الانتقالية
حسن محمد محمد رضا / ر.م. وقائيين اقدم / شعبة الرعاية المتكاملة للامراض غير الانتقالية
نضال عدنان خسرو / ر.م. وقائيين اقدم / شعبة الرعاية المتكاملة للامراض غير الانتقالية
نور حاتم ناصر / اداري صحي / شعبة الرعاية المتكاملة للامراض غير الانتقالية

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner