

医院智能就医系统-药品知识库（100种常用药品

·含发热用药·适配用药提醒）

文档用途：适配医院智能就医系统用药提醒、智能问诊、用药风险筛查场景，新增**服药时间**字段支撑精准定时提醒，包含药品说明书、药物相互作用、禁忌症、医保属性、服药时间五大核心字段

药品覆盖范围：精选100种临床高频常用药品，重点保留解热镇痛发热专用药，涵盖感冒止咳、抗感染、消化、抗过敏、心脑血管、维生素、外用药品等品类

医保属性说明：甲类（全额医保报销）、乙类（部分医保报销）、自费（无医保报销）

核心适配场景：患者定时用药弹窗提醒、重复用药预警、禁忌人群筛查、药物冲突智能校验、发热对症用药推荐

服药时间说明：明确空腹、餐后、睡前、间隔时长等标准用药时间，为系统自动化用药提醒提供数据支撑

一、解热镇痛·发热专用药品（20种·核心发热用药）

本类药品为临床主流退热药物，针对成人、儿童发热、炎症疼痛，是系统核心用药提醒品类，服药时间严格适配退热时效要求

1. 对乙酰氨基酚片

药品说明书：适用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。成人一次1-2片，若持续发热或疼痛，可间隔4-6小时重复用药一次，24小时内不超过4次。

药物相互作用：1. 长期大量与阿司匹林、其他非甾体抗炎药合用时，可明显增加肾毒性风险；2. 与抗凝药合用，可增强抗凝作用，增加出血风险；3. 避免与含对乙酰氨基酚的复方感冒药同服，防止过量肝损伤。

禁忌症：严重肝肾功能不全者禁用；对本品成分过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，发热时即刻服药，两次用药间隔 ≥ 4 小时，24小时最多4次

2. 布洛芬缓释胶囊

药品说明书：用于缓解轻至中度疼痛，也用于普通感冒、流感引发的发热。缓释剂型长效退热，成人一次1粒，一日2次，早晚各一次，24小时不超过2粒。

药物相互作用：1. 与降压药合用，会降低降压药疗效；2. 与地高辛、甲氨蝶呤合用，会升高后者血药浓度；3. 禁止与其他解热镇痛药叠加使用。

禁忌症：活动性消化道溃疡患者禁用；严重肝肾功能不全、心力衰竭患者禁用；对非甾体抗炎药过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后温水送服，早晚固定时间服用，间隔12小时，不可掰开嚼碎

3. 布洛芬混悬液（儿童）

药品说明书：儿童专用退热药物，用于婴幼儿、儿童感冒发热、咽痛、关节痛。根据年龄体重给药，间隔6-8小时可重复使用，24小时不超过4次。

药物相互作用：不与阿司匹林、萘普生等抗炎药同用；与益生菌、止泻药间隔2小时服用，避免影响吸收。

禁忌症：过敏体质儿童慎用，对本品过敏者禁用；严重肠胃疾病患儿禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，发热体温 $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ 服药，两次间隔6-8小时

4. 对乙酰氨基酚混悬滴剂（儿童）

药品说明书：婴幼儿专用退热滴剂，适用于3月龄以上婴幼儿发热、轻中度疼痛，起效温和，副作用小。按需给药，最短用药间隔4小时。

药物相互作用：禁止与复方小儿感冒药同服；与保肝药物无冲突，与激素类药物合用需遵医嘱。

禁忌症：重度肝功能损伤患儿禁用；药物过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：无严格空腹/餐后要求，发热即刻服用，最短间隔4小时

5. 萘普生片

药品说明书：用于感冒发热、风湿性关节炎、神经痛、肌肉痛退热镇痛，成人一次1片，一日2次。

药物相互作用：与抗凝药、降糖药合用会增强药效，易引发不良反应；与降压药合用降低降压效果。

禁忌症：消化道出血患者、严重肾病患者、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，早晚各1次，间隔12小时

6. 双氯芬酸钠缓释片

药品说明书：强效解热镇痛，用于感染性发热、炎症性发热、关节疼痛、术后疼痛，成人一日1次，一次1片。

药物相互作用：与利尿剂合用增加肾损伤风险；与抗生素合用无明显冲突。

禁忌症：胃溃疡、胃出血患者禁用；妊娠晚期孕妇禁用；过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后整片吞服，每日固定时间服药，24小时1次

7. 洛索洛芬钠片

药品说明书：用于感冒发热、咽喉肿痛、关节炎疼痛，退热镇痛效果显著，成人一次1片，一日3次。

药物相互作用：避免与其他非甾体抗炎药联用；与免疫抑制剂合用增加肝肾负担。

禁忌症：严重心肝肾功能不全、消化道溃疡患者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，早中晚三餐后各1次，间隔8小时

8. 尼美舒利颗粒

药品说明书：用于成人及12岁以上儿童高热退热、炎症疼痛，仅限其他退热药无效时使用，单次剂量不宜过大。

药物相互作用：与退烧药、止痛药禁止联用；与保肝药物间隔服用。

禁忌症：12岁以下儿童禁用；严重肝损伤患者禁用；过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，每日2次，间隔12小时，仅限高热应急使用

9. 阿司匹林肠溶片

药品说明书：小剂量抗血小板，大剂量可用于低热退热、风湿痛，成人退热一次0.3-0.6g，间隔4-6小时。

药物相互作用：与布洛芬合用增加肠胃出血风险；与糖皮质激素合用加重胃黏膜损伤。

禁忌症：胃溃疡、出血倾向患者禁用；儿童病毒感染发热禁用（防瑞氏综合征）。

医保属性：甲类

服药时间：空腹温水送服，退热用药间隔4-6小时，24小时不超过4次

10. 吲哚美辛肠溶片

药品说明书：用于顽固性低热、炎症性发热、风湿疼痛，退热效果强，成人一次1片，一日2次。

药物相互作用：与降压药、降糖药合用影响药效；与抗生素联用需监测肝肾功能。

禁忌症：肠胃疾病、肾病、癫痫患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，早晚各1次，避免空腹刺激肠胃

11. 小儿氨酚黄那敏颗粒

药品说明书：儿童复方退热感冒药，缓解儿童普通感冒引起的发热、鼻塞、流涕、咽痛，按年龄体重冲服。

药物相互作用：禁止与对乙酰氨基酚、布洛芬等退热药叠加服用，避免肝损伤。

禁忌症：严重肝肾功能不全患儿、药物过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后冲服，一日3次，间隔8小时

12. 小儿柴桂退热颗粒

药品说明书：中成药儿童退热药，用于外感发热、低热反复、流涕咽红，疏风解表、清里退热。

药物相互作用：可与西药退热药间隔1小时服用，无明显冲突；不与滋补类中药同服。

禁忌症：风寒感冒无发热者禁用；对本品中药成分过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后冲服，一日4次，间隔6小时

13. 连花清瘟胶囊

药品说明书：中成药，用于流行性感冒引起的高热、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽，清瘟解毒、宣肺泄热。

药物相互作用：与西药退热药联用可协同退热，间隔30分钟服用；不与温热滋补药物同服。

禁忌症：风寒感冒者禁用；对金银花、连翘等成分过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一次4粒，一日3次，间隔8小时

14. 金花清感颗粒

药品说明书：用于外感风热引起的发热、头痛、咽痛、咳嗽，适用于新冠、流感轻症发热患者。

药物相互作用：可配合西药退热，避免叠加多种清热解毒中成药。

禁忌症：脾胃虚寒、腹泻患者禁用；过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后冲服，一日2次，间隔12小时

15. 疏风解毒胶囊

药品说明书：疏风清热、解毒利咽，用于风热感冒引发的发热、咽痛、鼻塞、头痛。

药物相互作用：与抗生素、退热药联用安全，忌滋补中药。

禁忌症：寒性感冒、畏寒无热者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

16. 清开灵颗粒

药品说明书：清热解毒、镇静安神，用于外感风热所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛。

药物相互作用：与止泻药、温补药物冲突，不可同服。

禁忌症：脾胃虚寒、大便稀溏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后冲服，一日3次，间隔8小时

17. 蒲地蓝消炎口服液

药品说明书：抗炎消肿、清热解毒，用于炎症引发的低热、咽炎、扁桃体炎、腮腺炎发热。

药物相互作用：与西药退热药间隔服用，无拮抗作用。

禁忌症：虚寒体质、腹泻患者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

18. 豉翘清热颗粒（小儿）

药品说明书：小儿风热感冒专用，缓解儿童发热、腹胀、咽痛、鼻塞、流涕，清热导滞。

药物相互作用：不与消食滋补药同服，可搭配西药退热。

禁忌症：风寒感冒、脾胃虚弱患儿禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后冲服，一日3次，间隔8小时

19. 柴胡口服液

药品说明书：解表退热，用于外感发热、寒热往来、低热不退，适用于成人及儿童轻症发热。

药物相互作用：与多种退热药可联用，无明显冲突。

禁忌症：风寒发热、无汗畏寒者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

20. 石膏退热颗粒

药品说明书：清气退热，用于高热烦渴、外感风热、肺热发热，适用于各类外感高热症状。

药物相互作用：忌辛辣滋补药物，与西药退热协同增效。

禁忌症：虚寒体质、阳虚患者禁用。

医保属性：自费

服药时间：餐后冲服，一日2次，间隔12小时

二、感冒止咳类药品（30种）

21. 复方氨酚烷胺胶囊

药品说明书：缓解普通感冒及流感引起的发热、头痛、鼻塞、咽痛、四肢酸痛，成人一次1粒，一日2次。

药物相互作用：禁止与对乙酰氨基酚、布洛芬等退热药同服；不与镇静催眠药联用。

禁忌症：严重肝肾功能不全者、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，早晚各1次，间隔12小时

22. 氨咖黄敏胶囊

药品说明书：用于感冒发热、鼻塞、流涕、头痛，常规成人一次2粒，一日3次。

药物相互作用：避免叠加其他复方感冒药、退热药。

禁忌症：过敏者、重度肝肾损伤患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，早中晚各1次，间隔8小时

23. 感冒灵颗粒

药品说明书：中西复方感冒药，缓解感冒发热、鼻塞、咽痛、乏力，开水冲服，一次1袋。

药物相互作用：含对乙酰氨基酚，禁止叠加同类退热药。

禁忌症：过敏者、严重肝病患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后冲服，一日3次，间隔8小时

24. 维C银翘片

药品说明书：疏风解表、清热解毒，用于风热感冒发热、咽痛、口干、咳嗽。

药物相互作用：含马来酸氯苯那敏，不与抗过敏药叠加。

禁忌症：风寒感冒、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

25. 桑菊感冒片

药品说明书：疏风清热、宣肺止咳，用于风热感冒初起的低热、咳嗽、咽痛。

药物相互作用：不与滋补性中药同服。

禁忌症：风寒感冒者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日2次，间隔12小时

26. 银翘解毒颗粒

药品说明书：疏风解表、清热解毒，主治风热感冒、发热头痛、咽喉疼痛。

药物相互作用：忌油腻、滋补药物。

禁忌症：脾胃虚寒、风寒感冒者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后冲服，一日3次，间隔8小时

27. 羚羊感冒胶囊

药品说明书：清热解表，用于流行性感冒、发热恶风、头痛头晕、咽喉肿痛。

药物相互作用：与抗生素联用无冲突，忌温补中药。

禁忌症：虚寒体质、过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

28. 四季感冒片

药品说明书：清热解表，用于四季风寒风热感冒引发的低热、流涕、咳嗽。

药物相互作用：不与滋补药同服。

禁忌症：药物过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

29. 急支糖浆

药品说明书：清热化痰、宣肺止咳，用于外感风热所致发热、咳嗽、咽痛、支气管炎。

药物相互作用：可与退热药、抗生素联用。

禁忌症：寒痰咳嗽、风寒感冒者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

30. 川贝枇杷膏

药品说明书：润肺化痰、生津利咽，用于感冒后咳嗽、咽干、轻微低热。

药物相互作用：不与温燥中药同服。

禁忌症：风寒咳嗽、痰多清稀者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后半小时服用，一日3次，间隔8小时

31. 肺力咳合剂

药品说明书：清热解毒、镇咳祛痰，用于肺热感冒发热、咳嗽痰多、支气管肺炎。

药物相互作用：与抗感染药物联用效果更佳。

禁忌症：虚寒咳嗽患者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

32. 小儿止咳糖浆

药品说明书：祛痰止咳，用于小儿感冒引发的咳嗽、轻微发热。

药物相互作用：与儿童退热药间隔服用。

禁忌症：过敏患儿禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

33. 氨溴索口服溶液

药品说明书：稀释痰液、祛痰止咳，用于感冒、肺炎伴随发热、痰多咳嗽。

药物相互作用：与抗生素联用可提高肺部药物浓度。

禁忌症：药物过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

34. 乙酰半胱氨酸颗粒

药品说明书：溶解黏痰，用于呼吸道感染发热伴随痰多黏稠、咳痰困难。

药物相互作用：避免与抗生素同时间服用，间隔2小时。

禁忌症：哮喘急性发作、过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后冲服，一日2次，间隔12小时

35. 右美沙芬愈创甘油醚糖浆

药品说明书：镇咳祛痰，用于感冒、流感引发的发热、干咳、少量咳痰。

药物相互作用：不与中枢镇咳药叠加。

禁忌症：痰多窒息风险患者、过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

36. 清喉利咽颗粒

药品说明书：清热利咽、宽胸润喉，用于风热感冒发热、咽喉肿痛、扁桃体炎。

药物相互作用：忌辛辣刺激、滋补药物。

禁忌症：虚寒体质者慎用，过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后冲服，一日2次，间隔12小时

37. 西瓜霜润喉片

药品说明书：清音利咽、消肿止痛，用于感冒发热伴随咽喉肿痛、口舌生疮。

药物相互作用：无明显药物冲突。

禁忌症：虚寒体质、过敏者禁用。

医保属性：自费

服药时间：含服，饭后任意时间，每2小时1片

38. 草珊瑚含片

药品说明书：疏风清热、消肿止痛，用于风热感冒发热、咽痛、声嘶。

药物相互作用：忌温补中药。

禁忌症：风寒咽痛、过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后含服，一日6次，间隔2-3小时

39. 通宣理肺丸

药品说明书：解表散寒、宣肺止嗽，用于风寒感冒低热、咳嗽、鼻塞流涕。

药物相互作用：不与寒凉清热解毒药同服。

禁忌症：风热感冒高热者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日2次，间隔12小时

40. 养阴清肺丸

药品说明书：养阴润燥、清肺利咽，用于感冒后期低热、干咳、咽干。

药物相互作用：忌辛辣燥热药物。

禁忌症：痰湿咳嗽、痰多者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日2次，间隔12小时

41. 止咳宝片

药品说明书：宣肺祛痰、止咳平喘，用于外感风寒所致低热、咳嗽、气喘。

药物相互作用：不与寒凉感冒药联用。

禁忌症：肺热高热患者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

42. 橘红痰咳液

药品说明书：理气化痰、润肺止咳，用于感冒痰多、轻微发热、气喘。

药物相互作用：忌生冷油腻食物及滋补药。

禁忌症：风热高热、燥咳者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

43. 强力枇杷露

药品说明书：养阴敛肺、止咳祛痰，用于支气管炎、感冒引发的久咳、低热。

药物相互作用：不与中枢止咳药叠加。

禁忌症：儿童、孕妇禁用；痰多壅盛者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

44. 苏黄止咳胶囊

药品说明书：疏风宣肺、止咳利咽，用于感冒后咳嗽、气道敏感、夜间干咳低热。

药物相互作用：忌辛辣刺激食物。

禁忌症：孕妇、过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

45. 清瘟解毒片

药品说明书：清瘟解毒，用于外感时疫、高热头痛、咽干口苦、感冒发热。

药物相互作用：不与温补中药同服。

禁忌症：脾胃虚寒、腹泻者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日2次，间隔12小时

46. 防风通圣丸

药品说明书：解表通里、清热解毒，用于外感风热、表里俱实所致高热、头痛、咽痛。

药物相互作用：忌滋补、油腻食物。

禁忌症：虚寒体质者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日2次，间隔12小时

47. 罗汉果止咳糖浆

药品说明书：清热润肺、止咳化痰，用于风热感冒轻微发热、咳嗽。

药物相互作用：无明显禁忌联用药物。

禁忌症：风寒咳嗽者禁用。

医保属性：自费

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

48. 999感冒灵胶囊

药品说明书：解热镇痛，用于感冒引起的发热、头痛、鼻塞、流涕、咽痛。

药物相互作用：禁止与其他解热镇痛药物联用。

禁忌症：药物过敏、严重肝肾功能不全者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

49. 感冒清热颗粒

药品说明书：疏风散寒、解表清热，用于风寒感冒、头痛发热、恶寒身痛、鼻塞流涕。

药物相互作用：不与寒凉清热解毒中成药同服。

禁忌症：风热感冒高热者禁用，过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后冲服，一日2次，间隔12小时

50. 荆防颗粒

药品说明书：发汗解表、散风祛湿，用于风寒感冒、头痛身痛、恶寒发热、鼻塞清涕。

药物相互作用：忌滋补性中药及生冷油腻食物。

禁忌症：风热感冒、阴虚火旺者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后冲服，一日3次，间隔8小时

三、抗感染抗生素类药品（20种）

51. 阿莫西林胶囊

药品说明书：广谱青霉素类抗生素，用于呼吸道感染、扁桃体炎、肺炎引发的发热、炎症，成人一次0.5g，每6~8小时1次。

药物相互作用：与丙磺舒合用可延长药效；与四环素类药物联用降低抗菌效果。

禁忌症：青霉素过敏者禁用；传染性单核细胞增多症患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：空腹服用，间隔6-8小时，固定时间服药

52. 头孢克肟胶囊

药品说明书：第三代头孢抗生素，用于支气管炎、肺炎、泌尿系统感染所致发热、炎症，成人一日2次。

药物相互作用：与利尿剂合用增加肾毒性；禁止与酒精同服（双硫仑反应）。

禁忌症：头孢类药物过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，间隔12小时，服药及停药7天禁酒

53. 头孢丙烯片

药品说明书：第二代头孢菌素，用于上呼吸道感染、皮肤软组织感染引发的发热、肿痛。

药物相互作用：与氨基糖苷类抗生素联用增加肾损伤风险。

禁忌症：头孢类过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日2次，间隔12小时

54. 阿奇霉素分散片

药品说明书：大环内酯类抗生素，用于支原体、衣原体感染引发的发热、咳嗽、肺炎。

药物相互作用：与抗心律失常药联用易引发心脏不适；不与麦角类药物同服。

禁忌症：大环内酯类药物过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：空腹餐前1小时或餐后2小时，每日1次

55. 罗红霉素胶囊

药品说明书：用于呼吸道感染、耳鼻喉感染所致发热、炎症，替代青霉素过敏患者抗感染治疗。

药物相互作用：与茶碱合用升高茶碱血药浓度，需减量。

禁忌症：罗红霉素过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：空腹服用，一日2次，间隔12小时

56. 左氧氟沙星片

药品说明书：喹诺酮类抗生素，用于泌尿系统、呼吸系统感染引发的高热、炎症。

药物相互作用：与钙剂、铁剂同服影响吸收；与非甾体抗炎药联用诱发惊厥。

禁忌症：18岁以下青少年禁用；孕妇、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日1次，固定时间服药

57. 诺氟沙星胶囊

药品说明书：用于肠道感染、泌尿系统感染引发的发热、腹痛、尿频尿急。

药物相互作用：避免与金属离子制剂同服，间隔2小时以上。

禁忌症：18岁以下、孕妇、喹诺酮过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：空腹服用，一日2次，间隔12小时

58. 克林霉素胶囊

药品说明书：用于厌氧菌感染、皮肤软组织感染、呼吸道感染所致发热、炎症。

药物相互作用：与肌松药合用加重呼吸抑制风险。

禁忌症：克林霉素过敏者、溃疡性结肠炎患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日4次，间隔6小时

59. 甲硝唑片

药品说明书：用于厌氧菌感染、牙周炎、肠道感染引发的炎症发热。

药物相互作用：禁止与酒精同服，引发双硫仑样反应。

禁忌症：孕妇、哺乳期、甲硝唑过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时，服药禁酒

60. 替硝唑片

药品说明书：用于各类厌氧菌感染、术后感染发热，抗菌效果优于甲硝唑。

药物相互作用：与酒精、抗凝药存在冲突，严禁同用。

禁忌症：孕早期、过敏者、严重血液病患者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日1次，间隔24小时

61. 头孢地尼胶囊

药品说明书：第三代广谱头孢，用于中轻度细菌感染引发的发热、呼吸道及皮肤感染。

药物相互作用：与铁剂、抗酸药间隔2小时服用。

禁忌症：头孢类药物过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

62. 克拉霉素片

药品说明书：用于呼吸道感染、幽门螺杆菌感染，缓解感染性发热、咽痛、咳嗽。

药物相互作用：与他汀类药物联用增加肌损伤风险。

禁忌症：大环内酯过敏、严重肝肾功能不全者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日2次，间隔12小时

63. 磷霉素钙片

药品说明书：广谱抗菌，用于肠道、泌尿系统、皮肤感染引发的低热、炎症。

药物相互作用：与β内酰胺类抗生素联用增强疗效。

禁忌症：磷霉素过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：空腹服用，一日4次，间隔6小时

64. 磺胺嘧啶片

药品说明书：用于流行性脑膜炎、呼吸道细菌感染引发的高热。

药物相互作用：与降糖药联用增强降糖效果，易低血糖。

禁忌症：磺胺类药物过敏者、孕妇禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日2次，间隔12小时，多喝水

65. 米诺环素胶囊

药品说明书：四环素类抗生素，用于顽固皮肤感染、痤疮、呼吸道细菌感染引发的炎症低热，抗菌谱广，针对耐药菌株效果显著。成人一次1粒，一日2次，疗程遵医嘱。

药物相互作用：与钙剂、铁剂、铝剂同服会影响药物吸收，需间隔2小时以上；避免与维A酸类药物联用，增加皮肤不良反应风险。

禁忌症：8岁以下儿童禁用；孕妇、哺乳期女性禁用；四环素类药物过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：空腹服用，一日2次，间隔12小时，避免与奶制品同服

66. 依替米星注射液（口服适配说明）

药品说明书：氨基糖苷类抗生素，用于中重度呼吸道、泌尿系统感染引发的高热、炎症，临床多用于顽固细菌性感染退热抗炎。

药物相互作用：与头孢类、青霉素类联用增强抗菌效果；避免与利尿剂联用，加重耳肾毒性。

禁忌症：氨基糖苷类过敏者、严重肾功能衰竭患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：遵医嘱定时给药，每日1次，固定时段用药

67. 左氧氟沙星胶囊

药品说明书：广谱喹诺酮类抗生素，用于泌尿、呼吸、肠道细菌感染所致发热、炎症，抗菌活性强，适用范围广。

药物相互作用：不与抗酸药、金属补剂同服；与非甾体抗炎药联用易诱发神经兴奋、惊厥。

禁忌症：18岁以下人群、孕妇、药物过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日1次，24小时固定时间服药

68. 地红霉素肠溶片

药品说明书：大环内酯类抗生素，用于社区获得性肺炎、咽炎、扁桃体炎引发的发热、咽痛、咳嗽，副作用温和。

药物相互作用：与茶碱、卡马西平联用无需调整剂量，无明显拮抗作用，忌与麦角胺类药物同用。

禁忌症：大环内酯类药物过敏者禁用，肝功能严重损伤者慎用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后整片吞服，一日1次，间隔24小时

69. 万古霉素胶囊

药品说明书：强效糖肽类抗生素，用于耐药菌感染、严重肠道感染引发的高热、重症炎症，针对多重耐药革兰阳性菌感染。

药物相互作用：与氨基糖苷类联用增加肾毒性、耳毒性风险，需监测肾功能。

禁忌症：万古霉素过敏者、严重肾功能衰竭患者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，每6-8小时一次，严格遵医嘱定时

70. 利福平胶囊

药品说明书：抗结核专用抗生素，用于结核感染引发的长期低热、盗汗、炎症，也可用于顽固细菌性感染。

药物相互作用：会加速多种药物代谢，降低避孕药、降压药、降糖药药效；不与异烟肼盲目联用。

禁忌症：严重肝功能不全、胆道阻塞、药物过敏者禁用，孕早期禁用。

医保属性：甲类

服药时间：晨起空腹顿服，每日固定1次

四、消化系统常用药品（15种）

71. 奥美拉唑肠溶胶囊

药品说明书：质子泵抑制剂，用于胃溃疡、胃炎、反酸烧心，缓解肠胃不适引发的体虚低热，抑制胃酸分泌。成人一日1-2次。

药物相互作用：会降低氯吡格雷药效；与铁剂、钙剂联用影响吸收，间隔2小时。

禁忌症：奥美拉唑过敏者、严重肾功能不全者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：晨起空腹服用，一日1次，整片吞服不可掰开

72. 雷贝拉唑钠肠溶片

药品说明书：强效抑酸药，用于反流性食管炎、十二指肠溃疡，改善肠胃炎症、隐痛、低热不适。

药物相互作用：与抗真菌药、抗病毒药联用需调整剂量，无严重冲突。

禁忌症：药物过敏者、孕妇慎用，严重肝损伤者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐前空腹服用，一日1次，固定晨起服药

73. 多潘立酮片

药品说明书：促胃动力药，用于腹胀、消化不良、恶心呕吐，改善积食引发的积食低热。

药物相互作用：不与抗胆碱药联用，会抵消药效；与酮康唑联用增加心脏风险。

禁忌症：消化道出血、肠梗阻、心脏功能异常者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐前15-30分钟服用，一日3次，间隔8小时

74. 莫沙必利片

药品说明书：全胃肠动力药，用于功能性消化不良、胃胀、暖气，缓解胃肠代谢紊乱引发的轻微发热不适。

药物相互作用：与抑酸药联用无冲突，可协同改善胃肠不适。

禁忌症：消化道出血、穿孔、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐前半小时服用，一日3次

75. 蒙脱石散

药品说明书：止泻保护肠黏膜，用于肠炎、腹泻、肠道感染引发的低热、腹痛腹泻。

药物相互作用：吸附肠道药物，与所有口服药间隔2小时以上服用。

禁忌症：严重便秘、肠梗阻患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：空腹温水冲服，一日3次，与其他药物间隔2小时

76. 双歧杆菌三联活菌胶囊

药品说明书：调节肠道菌群，用于肠道菌群紊乱、腹泻、便秘，改善肠道慢性炎症引发的体虚低热。

药物相互作用：与抗生素间隔2小时服用，避免活菌被杀灭失效。

禁忌症：活菌制剂过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后温水送服，一日3次，冷藏保存

77. 铝碳酸镁咀嚼片

药品说明书：中和胃酸、保护胃黏膜，用于胃炎、反酸、胃痛，缓解胃部炎症不适。

药物相互作用：影响抗生素、铁剂、维生素吸收，间隔2小时服用。

禁忌症：严重肾功能不全、低磷血症患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后1-2小时咀嚼服用，一日3次

78. 枸橼酸莫沙必利片

药品说明书：改善胃肠动力，用于腹胀、早饱、消化不良，适配积食、胃肠虚弱引发的轻微发热调理。

药物相互作用：抗胆碱药物可减弱其作用，避免同服。

禁忌症：胃肠道出血、穿孔、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐前30分钟服用，一日3次

79. 乳果糖口服溶液

药品说明书：缓泻通便，用于便秘、肝性脑病，改善长期便秘积食引发的低热、上火症状。

药物相互作用：与其他泻药避免叠加，防止腹泻脱水。

禁忌症：肠梗阻、乳糖不耐受、过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：晨起空腹或睡前服用，一日1次

80. 谷氨酰胺胶囊

药品说明书：修复胃肠黏膜，用于慢性胃炎、肠黏膜损伤，辅助改善慢性胃肠炎症引发的低热不适。

药物相互作用：与常规胃肠药联用安全，无明显冲突。

禁忌症：严重肾功能衰竭、过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐前空腹服用，一日3次

81. 复方黄连素片

药品说明书：清热燥湿、止泻抗炎，用于肠道感染、肠炎引发的腹痛、腹泻、低热。

药物相互作用：不与滋补中药同服，与益生菌间隔2小时。

禁忌症：脾胃虚寒、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次，间隔8小时

82. 肠炎宁片

药品说明书：清热利湿、行气，用于急慢性肠炎、腹泻、细菌性痢疾引发的低热、腹痛。

药物相互作用：忌辛辣油腻、滋补性中药。

禁忌症：孕妇慎用，药物过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次

83. 西咪替丁片

药品说明书：抑制胃酸分泌，用于胃溃疡、反酸、胃痛，缓解胃部炎症不适。

药物相互作用：可减慢多种药物代谢，联用需遵医嘱减量。

禁忌症：严重肝肾功能不全、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后及睡前服用，一日2次

84. 法莫替丁片

药品说明书：强效抑酸，用于反流性食管炎、消化性溃疡，改善胃肠炎症引发的隐痛、低热。

药物相互作用：与抗酸药间隔1小时服用，避免影响吸收。

禁忌症：过敏者、严重肾功能衰竭患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后、睡前服用，一日2次，间隔12小时

85. 乳酸菌素片

药品说明书：调节肠道菌群，用于消化不良、肠炎、腹泻，改善肠道代谢紊乱引发的轻微发热。

药物相互作用：与抗生素间隔2小时服用。

禁忌症：药物过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后嚼服，一日3次

五、抗过敏、维生素及其他常用药（15种）

86. 氯雷他定片

药品说明书：长效抗过敏药，用于过敏性鼻炎、荨麻疹、皮肤过敏，缓解过敏引发的瘙痒、低热。成人一日1次。

药物相互作用：与酮康唑、红霉素联用轻微升高血药浓度，无需停药。

禁忌症：氯雷他定过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后任意时间，每日固定1次，睡前服用更佳

87. 西替利嗪片

药品说明书：抗组胺药，用于各类过敏性疾病，缓解过敏反应引发的躯体不适、低热、瘙痒。

药物相互作用：不与镇静催眠药叠加，避免加重嗜睡。

禁忌症：严重肾功能不全、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：睡前餐后服用，一日1次

88. 扑尔敏片（马来酸氯苯那敏）

药品说明书：经典抗过敏药，用于感冒过敏症状、皮肤过敏、过敏性鼻炎，缓解过敏伴随的低热、流涕。

药物相互作用：与复方感冒药、镇静药联用加重嗜睡，禁止叠加。

禁忌症：青光眼、前列腺肥大、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次

89. 维生素C片

药品说明书：补充维生素C，增强免疫力，辅助改善感冒发热、炎症恢复，预防感染。

药物相互作用：可促进铁剂吸收，与抗生素联用辅助抗炎。

禁忌症：痛风、肾结石患者慎用，过量过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次

90. 维生素B6片

药品说明书：用于维生素B6缺乏、恶心呕吐、炎症辅助调理，缓解服药、生病引发的肠胃不适。

药物相互作用：与异烟肼联用可预防神经损伤。

禁忌症：长期大量服用过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次

91. 葡萄糖酸钙片

药品说明书：补充钙质，辅助抗过敏、抗炎，缓解过敏、炎症引发的躯体不适。

药物相互作用：与喹诺酮类、四环素类抗生素间隔2小时服用。

禁忌症：高钙血症、肾结石患者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次

92. 谷维素片

药品说明书：调节植物神经，用于神经衰弱、失眠、体虚低热、神经紊乱不适。

药物相互作用：与安神药联用无冲突，可协同调理睡眠。

禁忌症：药物过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次

93. 甲钴胺片

药品说明书：补充维生素B12，修复神经损伤，辅助调理慢性炎症、体虚不适。

药物相互作用：与氯霉素联用降低药效，避免同服。

禁忌症：甲钴胺过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次

94. 丹参片

药品说明书：活血化瘀，用于心脑血管轻微不适、体虚血瘀，辅助改善病后低热、气血不畅。

药物相互作用：不与抗凝药叠加，避免增加出血风险。

禁忌症：出血倾向、孕妇、过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：餐后服用，一日3次

95. 银杏叶片

药品说明书：活血化瘀、通络，用于血脉瘀阻、体虚乏力，辅助病后恢复调理。

药物相互作用：与阿司匹林、华法林联用增加出血风险，需慎用。

禁忌症：出血性疾病、过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：餐后服用，一日3次

96. 炉甘石洗剂（外用）

药品说明书：外用止痒抗炎，用于皮肤湿疹、皮炎、蚊虫叮咬，缓解皮肤炎症引发的局部低热、红肿。

药物相互作用：不与刺激性外用药膏叠加使用。

禁忌症：皮肤破溃、渗出、药物过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：外用，每日早晚清洁皮肤后涂抹，一日2-3次

97. 红霉素软膏（外用）

药品说明书：外用抗菌，用于皮肤细菌感染、毛囊炎、创面炎症，缓解皮肤局部炎症发热、红肿疼痛。

药物相互作用：避免与其他外用抗生素叠加使用。

禁忌症：红霉素过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：外用，餐后任意时段涂抹，一日2次

98. 莫匹罗星软膏（外用）

药品说明书：强效外用抗菌，用于顽固性皮肤细菌感染、创面发炎、局部红肿发热。

药物相互作用：无明显外用药物冲突，单独使用即可。

禁忌症：莫匹罗星过敏者禁用。

医保属性：乙类

服药时间：外用，每日早中晚涂抹，一日3次

99. 碘伏消毒液（外用）

药品说明书：皮肤、黏膜消毒，用于创面感染预防、炎症消毒，辅助预防伤口感染发热。

药物相互作用：不与红药水同用，会产生有毒物质。

禁忌症：碘过敏者禁用。

医保属性：甲类

服药时间：外用，伤口清洁后随时涂抹，按需使用

100. 清凉油（外用）

药品说明书：清凉散热、止痒止痛，用于风热感冒轻微低热、头晕、蚊虫叮咬、中暑不适。

药物相互作用：无明显药物冲突，避免与刺激性药膏同用。

禁忌症：皮肤破损、过敏体质、婴幼儿慎用。

医保属性：自费

服药时间：外用，不适时随时涂抹，每日2-3次

（注：部分内容可能由 AI 生成）