
(a) Every recorded budget extension
NX / ArSSR x4 / 60 ep
NX / ResUNet x4 / 60 ep
NX / SAINT-style x4 / 60 ep
NX / SMamba-UNet x4 / 60 ep
NX / SwinIR x4 / 60 ep
NX / CycleINR-style x2 / 60 ep
NX / HAT x2 / 60 ep
NX / Res-SRDiff x2 / 60 ep
NX / SAINT-style x2 / 60 ep
NX / SMamba-UNet x2 / 60 ep
NX / SwinIR x2 / 60 ep
NX / ArSSR x6 / 60 ep
NX / CycleINR-style x6 / 60 ep
NX / Res-SRDiff x6 / 60 ep
NX / ResUNet x6 / 60 ep
NX / SwinIR x6 / 60 ep
NX / Res-SRDiff x2 / 90 ep
fastMRI / SwinIR x2 / 60 ep
fastMRI / ACVTT x6 / 60 ep
fastMRI / Res-SRDiff x2 / 60 ep
-10^1
-10^0
0
10^0
10^1
10^2
MAE reduction: master minus longer budget
Symmetric-log axis; simultaneous 95% intervals over 20 comparisons
(b) Diffusion failure is budget-sensitive
Full-plane MAE; equal patient-fold mean
400
300
200
100
440.6
140.5
118.2
Res-SRDiff
Linear (master)
HAT x2 (master)
30
60
90
Recorded epoch budget