



Training response against phenotype, all legs, rf_csa (page 1 of 11)






BFR
HLRT
PIP4K2A P48426
vs rf_csa t = −2.93 p 0.0046 q 0.95
BFR n=32 r=−0.30
HLRT n=33 r=−0.26
MRPS25 P82663
vs rf_csa t = +2.91 p 0.0049 q 0.95
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.26
RNF170 Q96K19
vs rf_csa t = −2.90 p 0.005 q 0.95
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.35
MRPL43 Q8N983
vs rf_csa t = +2.90 p 0.005 q 0.95
BFR n=32 r=+0.21
HLRT n=33 r=+0.20
GMPR P36959
vs rf_csa t = −2.84 p 0.006 q 1
BFR n=32 r=−0.29
HLRT n=33 r=−0.21
SSBP1 Q04837
vs rf_csa t = +2.81 p 0.0065 q 1
BFR n=32 r=+0.15
HLRT n=33 r=+0.43
ARL8A Q96BM9
vs rf_csa t = +2.79 p 0.0068 q 1
BFR n=32 r=+0.33
HLRT n=33 r=+0.25
MRPL44 Q9H9J2
vs rf_csa t = +2.79 p 0.007 q 1
BFR n=32 r=+0.37
HLRT n=33 r=+0.33
LARS2 Q15031
vs rf_csa t = +2.76 p 0.0074 q 1
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.24
CPOX P36551
vs rf_csa t = +2.73 p 0.008 q 1
BFR n=32 r=+0.42
HLRT n=33 r=+0.25
MARK3 P27448
vs rf_csa t = −2.73 p 0.0081 q 1
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.29
NIPSNAP3A Q9UFN0
vs rf_csa t = +2.70 p 0.0087 q 1
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.35
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg


Training response against phenotype, all legs, rf_csa (page 3 of 11)






BFR
HLRT
MRPS16 Q9Y3D3
vs rf_csa t = +2.53 p 0.014 q 1
BFR n=32 r=+0.39
HLRT n=33 r=−0.06
MUSTN1 Q8IVN3
vs rf_csa t = −2.52 p 0.014 q 1
BFR n=32 r=−0.28
HLRT n=33 r=−0.26
SELENBP1 Q13228
vs rf_csa t = −2.49 p 0.015 q 1
BFR n=32 r=−0.12
HLRT n=33 r=−0.34
TMLHE Q9NVH6
vs rf_csa t = +2.49 p 0.015 q 1
BFR n=32 r=+0.33
HLRT n=33 r=+0.34
ACO2 Q99798
vs rf_csa t = +2.48 p 0.015 q 1
BFR n=32 r=+0.30
HLRT n=33 r=+0.09
SPAG7 O75391
vs rf_csa t = +2.46 p 0.016 q 1
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.31
PGAM2 P15259
vs rf_csa t = +2.46 p 0.017 q 1
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.18
COPZ1 P61923
vs rf_csa t = −2.44 p 0.017 q 1
BFR n=32 r=−0.34
HLRT n=33 r=−0.42
PFAS O15067
vs rf_csa t = −2.42 p 0.018 q 1
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.41
EML2 O95834
vs rf_csa t = −2.41 p 0.019 q 1
BFR n=32 r=−0.13
HLRT n=33 r=−0.34
TM9SF2 Q99805
vs rf_csa t = +2.40 p 0.019 q 1
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.19
PDHA1 P08559
vs rf_csa t = +2.40 p 0.019 q 1
BFR n=32 r=+0.24
HLRT n=33 r=+0.33
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
VCL P18206
vs rf_csa t = −2.40 p 0.019 q 1
BFR n=32 r=−0.47
HLRT n=33 r=−0.13
RRAD P55042
vs rf_csa t = −2.39 p 0.02 q 1
BFR n=32 r=−0.19
HLRT n=33 r=−0.28
CUL3 Q13618
vs rf_csa t = −2.38 p 0.02 q 1
BFR n=32 r=−0.35
HLRT n=33 r=−0.19
COPS7A Q9UBW8
vs rf_csa t = −2.37 p 0.021 q 1
BFR n=32 r=−0.23
HLRT n=33 r=−0.34
PTP4A3 O75365
vs rf_csa t = +2.35 p 0.022 q 1
BFR n=32 r=+0.48
HLRT n=33 r=+0.07
TOR1AIP2 Q8NFQ8
vs rf_csa t = −2.34 p 0.022 q 1
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=−0.37
PGM3 O95394
vs rf_csa t = +2.34 p 0.022 q 1
BFR n=32 r=+0.30
HLRT n=33 r=+0.00
DOHH Q9BU89
vs rf_csa t = +2.34 p 0.022 q 1
BFR n=32 r=+0.21
HLRT n=33 r=+0.40
MAPK9 P45984
vs rf_csa t = +2.33 p 0.023 q 1
BFR n=32 r=+0.03
HLRT n=33 r=+0.43
SARS1 P49591
vs rf_csa t = −2.33 p 0.023 q 1
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.39
SEC16A O15027
vs rf_csa t = +2.32 p 0.023 q 1
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.39
HTATSF1 O43719
vs rf_csa t = +2.32 p 0.023 q 1
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.36
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
MSI2 Q96DH6
vs rf_csa t = −2.31 p 0.024 q 1
BFR n=32 r=−0.09
HLRT n=33 r=−0.48
MRPL58 Q14197
vs rf_csa t = +2.30 p 0.025 q 1
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.25
ACYP2 P14621
vs rf_csa t = −2.29 p 0.025 q 1
BFR n=32 r=−0.39
HLRT n=33 r=−0.19
CCNDBP1 O95273
vs rf_csa t = −2.28 p 0.026 q 1
BFR n=32 r=−0.18
HLRT n=33 r=−0.36
MRPS2 Q9Y399
vs rf_csa t = +2.28 p 0.026 q 1
BFR n=32 r=+0.21
HLRT n=33 r=+0.06
HEBP2 Q9Y5Z4
vs rf_csa t = −2.27 p 0.027 q 1
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.26
CLIP1 P30622
vs rf_csa t = −2.26 p 0.027 q 1
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.10
MAT2A P31153
vs rf_csa t = −2.26 p 0.027 q 1
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.22
GSK3B P49841
vs rf_csa t = −2.26 p 0.027 q 1
BFR n=32 r=−0.05
HLRT n=33 r=−0.26
NAA50 Q9GZZ1
vs rf_csa t = +2.26 p 0.027 q 1
BFR n=32 r=+0.40
HLRT n=33 r=+0.17
LRPPRC P42704
vs rf_csa t = +2.24 p 0.028 q 1
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.40
KLHDC3 Q9BQ90
vs rf_csa t = +2.23 p 0.029 q 1
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.23
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
P4HA1 P13674
vs rf_csa t = +2.22 p 0.03 q 1
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.15
AIP O00170
vs rf_csa t = −2.21 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=−0.18
HLRT n=33 r=−0.27
NXN Q6DKJ4
vs rf_csa t = −2.21 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=+0.02
HLRT n=33 r=−0.11
PHKB Q93100
vs rf_csa t = +2.21 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.29
BTF3L4 Q96K17
vs rf_csa t = +2.20 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.34
UBXN1 Q04323
vs rf_csa t = −2.20 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=−0.36
HLRT n=33 r=−0.05
CS O75390
vs rf_csa t = +2.20 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=+0.04
HLRT n=33 r=+0.50
MRPS18A Q9NVS2
vs rf_csa t = +2.20 p 0.032 q 1
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.18
RAB3GAP1 Q15042
vs rf_csa t = −2.19 p 0.032 q 1
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.25
DNM2 P50570
vs rf_csa t = +2.18 p 0.033 q 1
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.24
SLIRP Q9GZT3
vs rf_csa t = +2.18 p 0.033 q 1
BFR n=32 r=+0.12
HLRT n=33 r=+0.28
NDUFV1 P49821
vs rf_csa t = +2.17 p 0.033 q 1
BFR n=32 r=+0.36
HLRT n=33 r=+0.12
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
STT3A P46977
vs rf_csa t = +2.17 p 0.033 q 1
BFR n=32 r=+0.01
HLRT n=33 r=+0.36
MRPS5 P82675
vs rf_csa t = +2.16 p 0.034 q 1
BFR n=32 r=+0.35
HLRT n=33 r=+0.14
HIBCH Q6NVY1
vs rf_csa t = +2.14 p 0.036 q 1
BFR n=32 r=+0.16
HLRT n=33 r=+0.15
MRPL11 Q9Y3B7
vs rf_csa t = +2.14 p 0.036 q 1
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.21
CUL2 Q13617
vs rf_csa t = −2.14 p 0.036 q 1
BFR n=32 r=−0.25
HLRT n=33 r=−0.37
COX5B P10606
vs rf_csa t = +2.13 p 0.037 q 1
BFR n=32 r=+0.10
HLRT n=33 r=+0.22
OGT O15294
vs rf_csa t = +2.12 p 0.038 q 1
BFR n=32 r=+0.47
HLRT n=33 r=+0.08
FLNC Q14315
vs rf_csa t = −2.12 p 0.038 q 1
BFR n=32 r=−0.27
HLRT n=33 r=−0.16
ACLY P53396
vs rf_csa t = −2.11 p 0.038 q 1
BFR n=32 r=−0.30
HLRT n=33 r=−0.21
TPM4 P67936
vs rf_csa t = −2.11 p 0.039 q 1
BFR n=32 r=−0.51
HLRT n=33 r=−0.12
C11orf54 Q9H0W9
vs rf_csa t = +2.11 p 0.039 q 1
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.41
CSRP3 P50461
vs rf_csa t = −2.10 p 0.039 q 1
BFR n=32 r=−0.23
HLRT n=33 r=−0.25
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
CTSC P53634
vs rf_csa t = +2.10 p 0.04 q 1
BFR n=32 r=+0.34
HLRT n=33 r=+0.18
LMO7 Q8WWI1
vs rf_csa t = −2.09 p 0.041 q 1
BFR n=32 r=−0.19
HLRT n=33 r=−0.32
CCDC93 Q567U6
vs rf_csa t = −2.08 p 0.041 q 1
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.28
PALLD Q8WX93
vs rf_csa t = −2.08 p 0.041 q 1
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.20
FDXR P22570
vs rf_csa t = −2.07 p 0.042 q 1
BFR n=32 r=−0.08
HLRT n=33 r=−0.20
SLC16A1 P53985
vs rf_csa t = −2.07 p 0.042 q 1
BFR n=32 r=−0.43
HLRT n=33 r=−0.09
CHP1 Q99653
vs rf_csa t = −2.07 p 0.042 q 1
BFR n=32 r=−0.12
HLRT n=33 r=−0.17
SMS P52788
vs rf_csa t = +2.07 p 0.043 q 1
BFR n=32 r=+0.34
HLRT n=33 r=+0.25
NDUFV3 P56181
vs rf_csa t = +2.06 p 0.043 q 1
BFR n=32 r=+0.12
HLRT n=33 r=+0.16
WARS2 Q9UGM6
vs rf_csa t = +2.06 p 0.043 q 1
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.06
PAXX Q9BUH6
vs rf_csa t = +2.06 p 0.044 q 1
BFR n=32 r=+0.24
HLRT n=33 r=+0.29
OGDH Q02218
vs rf_csa t = +2.05 p 0.044 q 1
BFR n=32 r=+0.31
HLRT n=33 r=+0.25
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
MRPS22 P82650
vs rf_csa t = +2.05 p 0.044 q 1
BFR n=32 r=+0.45
HLRT n=33 r=+0.01
MAGT1 Q9H0U3
vs rf_csa t = −2.05 p 0.044 q 1
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.21
SPTB P11277
vs rf_csa t = −2.05 p 0.044 q 1
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.27
FXYD1 O00168
vs rf_csa t = −2.05 p 0.045 q 1
BFR n=32 r=−0.42
HLRT n=33 r=+0.13
LRRC47 Q8N1G4
vs rf_csa t = +2.04 p 0.045 q 1
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.33
HMGN4 O00479
vs rf_csa t = +2.04 p 0.045 q 1
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.19
RAP1A P62834
vs rf_csa t = +2.04 p 0.045 q 1
BFR n=32 r=+0.30
HLRT n=33 r=+0.27
DECR1 Q16698
vs rf_csa t = +2.04 p 0.045 q 1
BFR n=32 r=+0.41
HLRT n=33 r=+0.16
ANOS1 P23352
vs rf_csa t = −2.02 p 0.047 q 1
BFR n=32 r=+0.05
HLRT n=33 r=−0.33
PCCB P05166
vs rf_csa t = +2.02 p 0.047 q 1
BFR n=32 r=+0.10
HLRT n=33 r=+0.39
ALDH9A1 P49189
vs rf_csa t = −2.02 p 0.047 q 1
BFR n=32 r=−0.35
HLRT n=33 r=−0.18
LPCAT3 Q6P1A2
vs rf_csa t = +2.02 p 0.048 q 1
BFR n=32 r=+0.36
HLRT n=33 r=+0.21
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
CAP2 P40123
vs rf_csa t = −2.02 p 0.048 q 1
BFR n=32 r=−0.12
HLRT n=33 r=−0.15
GCLC P48506
vs rf_csa t = −2.02 p 0.048 q 1
BFR n=32 r=−0.11
HLRT n=33 r=−0.38
SSPN Q14714
vs rf_csa t = −2.01 p 0.048 q 1
BFR n=32 r=−0.35
HLRT n=33 r=−0.11
TUFM P49411
vs rf_csa t = +2.00 p 0.049 q 1
BFR n=32 r=+0.08
HLRT n=33 r=+0.41
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR − HLRT
SMTNL1 A8MU46
vs rf_csa t = −4.31 p 0.00013 q 0.4
PPP6C O00743
vs rf_csa t = +3.74 p 0.00067 q 0.93
ARL8A Q96BM9
vs rf_csa t = +3.48 p 0.0014 q 0.93
MRPS7 Q9Y2R9
vs rf_csa t = +3.47 p 0.0014 q 0.93
PBDC1 Q9BVG4
vs rf_csa t = −3.44 p 0.0015 q 0.93
HTATSF1 O43719
vs rf_csa t = +3.10 p 0.0039 q 1
HMGB1 P09429
vs rf_csa t = +3.04 p 0.0045 q 1
HNRNPAB Q99729
vs rf_csa t = −2.99 p 0.0051 q 1
TRAPPC11 Q7Z392
vs rf_csa t = +2.99 p 0.0052 q 1
TM9SF2 Q99805
vs rf_csa t = +2.98 p 0.0052 q 1
MCTS1 Q9ULC4
vs rf_csa t = +2.96 p 0.0055 q 1
TMEM109 Q9BVC6
vs rf_csa t = −2.92 p 0.0061 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
MAT2A P31153
vs rf_csa t = −2.90 p 0.0064 q 1
BORCS6 Q96GS4
vs rf_csa t = +2.89 p 0.0067 q 1
EMCN Q9ULC0
vs rf_csa t = −2.85 p 0.0074 q 1
WDR1 O75083
vs rf_csa t = −2.79 p 0.0086 q 1
TBCB Q99426
vs rf_csa t = −2.76 p 0.0093 q 1
MRPL43 Q8N983
vs rf_csa t = +2.76 p 0.0093 q 1
LARS2 Q15031
vs rf_csa t = +2.74 p 0.0097 q 1
SNX5 Q9Y5X3
vs rf_csa t = +2.74 p 0.0098 q 1
NUDT9 Q9BW91
vs rf_csa t = +2.71 p 0.01 q 1
PSMB6 P28072
vs rf_csa t = −2.71 p 0.011 q 1
SF3B1 O75533
vs rf_csa t = +2.70 p 0.011 q 1
CCNDBP1 O95273
vs rf_csa t = −2.66 p 0.012 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
MT−ND5 P03915
vs rf_csa t = +2.65 p 0.012 q 1
SIAE Q9HAT2
vs rf_csa t = +2.65 p 0.012 q 1
GFPT1 Q06210
vs rf_csa t = +2.64 p 0.012 q 1
PHYH O14832
vs rf_csa t = +2.64 p 0.012 q 1
HMGN4 O00479
vs rf_csa t = +2.62 p 0.013 q 1
APEX1 P27695
vs rf_csa t = −2.62 p 0.013 q 1
NCK1 P16333
vs rf_csa t = −2.61 p 0.013 q 1
CDK5RAP3 Q96JB5
vs rf_csa t = +2.61 p 0.013 q 1
EZR P15311
vs rf_csa t = +2.58 p 0.014 q 1
SNX2 O60749
vs rf_csa t = −2.58 p 0.014 q 1
TARDBP Q13148
vs rf_csa t = −2.53 p 0.016 q 1
RNF181 Q9P0P0
vs rf_csa t = −2.53 p 0.016 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
SELENBP1 Q13228
vs rf_csa t = −2.50 p 0.017 q 1
GPX1 P07203
vs rf_csa t = −2.49 p 0.018 q 1
MRPL11 Q9Y3B7
vs rf_csa t = +2.47 p 0.019 q 1
UCHL1 P09936
vs rf_csa t = +2.46 p 0.019 q 1
APRT P07741
vs rf_csa t = −2.46 p 0.019 q 1
ISOC1 Q96CN7
vs rf_csa t = −2.44 p 0.02 q 1
EIF4EBP2 Q13542
vs rf_csa t = −2.43 p 0.02 q 1
HSP90AB2P Q58FF8
vs rf_csa t = −2.44 p 0.021 q 1
HNRNPF P52597
vs rf_csa t = +2.40 p 0.022 q 1
WNK1 Q9H4A3
vs rf_csa t = −2.38 p 0.023 q 1
FBN2 P35556
vs rf_csa t = −2.38 p 0.023 q 1
EIF3H O15372
vs rf_csa t = +2.37 p 0.023 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
ADA P00813
vs rf_csa t = −2.37 p 0.024 q 1
RETREG1 Q9H6L5
vs rf_csa t = +2.36 p 0.024 q 1
GPT P24298
vs rf_csa t = −2.36 p 0.024 q 1
WBP2 Q969T9
vs rf_csa t = −2.36 p 0.024 q 1
UROD P06132
vs rf_csa t = −2.34 p 0.025 q 1
USP13 Q92995
vs rf_csa t = +2.33 p 0.026 q 1
NFIC P08651
vs rf_csa t = −2.33 p 0.026 q 1
CNRIP1 Q96F85
vs rf_csa t = −2.33 p 0.026 q 1
RMDN1 Q96DB5
vs rf_csa t = +2.32 p 0.027 q 1
MRPL37 Q9BZE1
vs rf_csa t = +2.31 p 0.027 q 1
NDUFAF5 Q5TEU4
vs rf_csa t = +2.31 p 0.027 q 1
NUP54 Q7Z3B4
vs rf_csa t = +2.31 p 0.027 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
GARS1 P41250
vs rf_csa t = +2.31 p 0.027 q 1
PPA2 Q9H2U2
vs rf_csa t = +2.30 p 0.027 q 1
EIF1AY O14602
vs rf_csa t = +2.30 p 0.028 q 1
TMEM126A Q9H061
vs rf_csa t = +2.30 p 0.028 q 1
RTCA O00442
vs rf_csa t = −2.29 p 0.028 q 1
NDUFC1 O43677
vs rf_csa t = +2.29 p 0.028 q 1
SAR1A Q9NR31
vs rf_csa t = −2.28 p 0.029 q 1
PRKAR2A P13861
vs rf_csa t = −2.28 p 0.029 q 1
MGST3 O14880
vs rf_csa t = −2.28 p 0.029 q 1
CSRP3 P50461
vs rf_csa t = −2.27 p 0.029 q 1
FHL1 Q13642
vs rf_csa t = −2.26 p 0.03 q 1
PM20D2 Q8IYS1
vs rf_csa t = −2.26 p 0.031 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
MRPL16 Q9NX20
vs rf_csa t = +2.25 p 0.031 q 1
PHYKPL Q8IUZ5
vs rf_csa t = +2.23 p 0.032 q 1
RFTN1 Q14699
vs rf_csa t = +2.23 p 0.032 q 1
MRPS5 P82675
vs rf_csa t = +2.23 p 0.032 q 1
PNPO Q9NVS9
vs rf_csa t = +2.23 p 0.033 q 1
NCL P19338
vs rf_csa t = +2.21 p 0.034 q 1
RDH14 Q9HBH5
vs rf_csa t = −2.20 p 0.034 q 1
OSBPL9 Q96SU4
vs rf_csa t = +2.20 p 0.035 q 1
ASS1 P00966
vs rf_csa t = −2.20 p 0.035 q 1
COL15A1 P39059
vs rf_csa t = +2.20 p 0.035 q 1
MTM1 Q13496
vs rf_csa t = +2.20 p 0.035 q 1
TMEM11 P17152
vs rf_csa t = +2.19 p 0.035 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
FSD2 A1L4K1
vs rf_csa t = +2.19 p 0.036 q 1
PRKACB P22694
vs rf_csa t = −2.19 p 0.036 q 1
FXYD1 O00168
vs rf_csa t = −2.18 p 0.036 q 1
EIF1AX P47813
vs rf_csa t = +2.18 p 0.036 q 1
DPT Q07507
vs rf_csa t = +2.16 p 0.038 q 1
DCTN1 Q14203
vs rf_csa t = +2.16 p 0.038 q 1
RAB9A P51151
vs rf_csa t = +2.16 p 0.038 q 1
PDLIM2 Q96JY6
vs rf_csa t = −2.15 p 0.039 q 1
SNRPA P09012
vs rf_csa t = −2.15 p 0.039 q 1
RIDA P52758
vs rf_csa t = −2.15 p 0.039 q 1
EML2 O95834
vs rf_csa t = −2.15 p 0.039 q 1
DTD1 Q8TEA8
vs rf_csa t = −2.14 p 0.039 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
AQP1 P29972
vs rf_csa t = −2.14 p 0.04 q 1
RAB3GAP1 Q15042
vs rf_csa t = −2.14 p 0.04 q 1
EMC7 Q9NPA0
vs rf_csa t = −2.13 p 0.04 q 1
NNMT P40261
vs rf_csa t = +2.13 p 0.041 q 1
RALA P11233
vs rf_csa t = +2.11 p 0.043 q 1
LSM6 P62312
vs rf_csa t = −2.10 p 0.043 q 1
NDUFA9 Q16795
vs rf_csa t = +2.10 p 0.043 q 1
AIMP2 Q13155
vs rf_csa t = +2.10 p 0.043 q 1
BAG6 P46379
vs rf_csa t = −2.10 p 0.043 q 1
NUDT2 P50583
vs rf_csa t = +2.10 p 0.044 q 1
SHMT1 P34896
vs rf_csa t = −2.09 p 0.044 q 1
CALR P27797
vs rf_csa t = −2.09 p 0.044 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
LGALSL Q3ZCW2
vs rf_csa t = +2.09 p 0.045 q 1
MYH11 P35749
vs rf_csa t = −2.10 p 0.045 q 1
CD58 P19256
vs rf_csa t = −2.09 p 0.045 q 1
CPSF6 Q16630
vs rf_csa t = −2.08 p 0.045 q 1
MRPL12 P52815
vs rf_csa t = +2.08 p 0.045 q 1
OSBPL6 Q9BZF3
vs rf_csa t = +2.08 p 0.045 q 1
P4HA1 P13674
vs rf_csa t = +2.08 p 0.045 q 1
EIF1AD Q8N9N8
vs rf_csa t = +2.07 p 0.046 q 1
ZBTB8OS Q8IWT0
vs rf_csa t = −2.07 p 0.046 q 1
CNDP2 Q96KP4
vs rf_csa t = +2.07 p 0.047 q 1
SMAD2 Q15796
vs rf_csa t = −2.07 p 0.047 q 1
CFL2 Q9Y281
vs rf_csa t = −2.06 p 0.047 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
MRGPRF Q96AM1
vs rf_csa t = −2.06 p 0.047 q 1
NDUFA3 O95167
vs rf_csa t = +2.06 p 0.047 q 1
CKMT2 P17540
vs rf_csa t = +2.05 p 0.048 q 1
LMCD1 Q9NZU5
vs rf_csa t = +2.04 p 0.049 q 1
CKB P12277
vs rf_csa t = −2.04 p 0.049 q 1
NDUFV3 P56181
vs rf_csa t = +2.04 p 0.049 q 1
CDV3 Q9UKY7
vs rf_csa t = −2.04 p 0.049 q 1
ARPC5L Q9BPX5
vs rf_csa t = −2.04 p 0.05 q 1
ARHGEF10L Q9HCE6
vs rf_csa t = +2.03 p 0.05 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant