

Niacin	18mg
Vitamin B ₆	2,6mg
Folat	800mcg
Vitamin B ₁₂	4mcg
Fe	60mg
Kẽm (Zn)	25mg
Ca	200mg

Chỉ định : Dinh dưỡng cho người mang thai và trẻ em, phụ nữ nuôi con bú, ăn uống không đủ chất.

Liều dùng : Uống 1 viên ngày, sau bữa ăn.

Necyrane (Pháp)

Dạng thuốc : Lọ chứa 10ml dung dịch bơm mũi có :

Ritiometan (muối Mg)	194,5mg
Eucalyptol	50mg
Benzalkonium chlorid	1mg

Tác dụng : Sát khuẩn và trị ngứa mũi.

Chỉ định : Viêm mũi cấp, mạn tính, viêm mũi kèm viêm xoang, sổ mũi, viêm mũi hầu, viêm mũi phế quản

Liều dùng : Người lớn, bơm 4-6 lần/ngày. Trẻ em và trẻ còn bú bơm 3 lần/ngày

Neo boldolaxine (Pháp)

Dạng thuốc : Mỗi viên có :

Bisacodyl	0,005g
Natri docusat	0,1g
Bột Boldo	0,05g
Aloin	0,01g
Cao belladon	0,009g

Tác dụng : Nhuận tràng.

Chỉ định : Trị triệu chứng táo bón.

Liều dùng : Uống 1 viên buổi chiều, trước bữa ăn.

Chống chỉ định : Viêm đại tràng, đau bụng không rõ nguyên nhân, nguy cơ bí đái, glôcôm góc đóng.

Lưu ý : Tránh dùng lâu dài. Khi bị ỉa chảy, đau bụng cần ngừng thuốc. Tránh dùng cho phụ nữ có thai hoặc nuôi con bú.

Neogadine (Pháp)

Dạng thuốc : Lọ 150ml cồn thuốc ngọt (elixir) có :

Kẽm sulfat	6mg
Mg chlorid	20mg
Mangan sulfat	4mg
Vitamin C	15mg

Vitamin metavanadat	0,66mg
Vitamin A	1.250.000UI
Vitamin D ₃	100.000UI
Pepton gắn iod	29mg
Ethanol	0,95ml

Chỉ định : Bổ sung cho cơ thể, một số vitamin và muối khoáng dưới dạng vị lượng.

Neolactyl (Ampharco USA)

Dạng thuốc : Viên nang có Lactobacillus acidophilus

Chỉ định : Như bd Antibio.

Neo - Medrol (Pháp)

Dạng thuốc : Lọ 75ml hỗn dịch dùng ngoài da có :

Methylprednisolon acetat	187,5mg
Neomycin base	131mg
Lưu huỳnh (dạng dễ phân tán)	3,75g
Al hydroxyd	7,5g
Methylparaben	112,5mg

Chỉ định : Cơ kích phát viêm, bệnh trứng cá. Dùng không quá 10 ngày.

Liều dùng : Rửa sạch da, lúc đầu bôi 2 lần/ngày rồi 1 lần/ngày (24giờ), dùng 4-5 ngày.

Chống chỉ định : Các bệnh da nhiễm virus, vi nấm, dị ứng Neomycin.

Lưu ý : Không bôi ở diện rộng vì có tác dụng toàn thân, chỉ bôi ở chỗ bị bệnh. Tránh dè thuốc dầy vào mắt. Tránh dùng lúc có thai. Bôi thuốc mỏng và không băng kín. Lắc kỹ thuốc khi dùng.

Neopeptine (Ấn Độ)

Dạng thuốc : (Lọ 30viên) Viên nang/thuốc giọt 1ml (chai 15ml).

Alpha -amylase	200mg/200mg
Papain	100/10mg
Thiamin nononitrat	5mg/0
Riboflavin	3mg/0
Nicotinamid	25mg/0
Pyridoxin HCl	1mg/0
Cyanocobalamin	5mcg/0
Dimeticon	30mg/0
Tinh dầu thi là	0/2mg
Tinh dầu Anis	0/2mg
Tinh dầu Carum	0/2mg

Tác dụng : Làm tăng tốc độ tiêu hóa thức ăn, chống đầy hơi, tăng khả năng hấp thụ qua màng ruột.