

đơn (cứ 500g dầu thêm 150- 200g Hoàng đơn) vừa thêm Hoàng đơn vào vừa quấy đều, đến khi Hoàng đơn cháy, toàn bộ kết lại thì thôi, bắc nồi ra. Nếu trong công thức có được liệu lượng nhỏ hoặc thơm thì nên nghiên riêng thành bột mịn, để hơi nguội thì thêm vào cao, quấy đảo đều, sau đó rót cao vào nước lạnh, ngâm 1 ngày đêm (24 giờ) để khử hóa độc, lấy ra lại đun nhẹ âm ấm cho cao cháy, phết đều vào vải hay giấy là được.

- Cao xoa : lấy dầu thực vật, sáp ong hoặc vaselin tá được nền chế thành cao bôi ngoài. Có 2 cách điều chế :

+ Điều chế ở nhiệt độ thường : được liệu nghiên nhỏ, cho vào cối cùng với tá được thích hợp (thường dùng vaselin) nghiên đều là được. Thường gọi là thuốc mỡ ( Unguentum).

+ Điều chế nóng : được liệu nghiên nhỏ, qua rây. Lấy riêng một lượng được liệu vừa đủ tá được nền (thường dùng dầu thảo mộc đun nóng, thêm sáp ong, sau khi sáp ong cháy hết để nguội) đun cháy, cho bột được liệu vào lúc tá được còn nóng, đánh đều là được.

Còn một cách điều chế khác : theo công thức, lấy một phần được liệu thô đun với dầu thảo mộc, bỏ bã, thêm sáp ong đun cháy làm nền hợp lại với các được liệu đã tán mịn, trộn đều là được. Nếu trong công thức đó có được liệu thơm, dễ bay hơi thì phải cho những chất đó vào lúc chất nền không nóng quá, để bảo đảm chất lượng của thuốc.

3.2.5- *Rượu thuốc* : là dạng thuốc ngâm được liệu trong rượu trắng.

Cách điều chế : lấy được liệu cắt thái nhỏ hoặc xay thành bột thô, cho vào bình chứa thích hợp, thêm rượu  $40^{\circ}$  -  $60^{\circ}$  đầy, nút kín. Hàng ngày quấy, lắc một lần, sau 7 ngày thì mỗi tuần quấy, lắc một lần, 1 tháng sau thì lọc lấy nước rượu trong là được.

Trên đây là cách ngâm lạnh - còn theo cách ngâm nóng thì dùng rượu trắng hâm nóng cách thủy hoặc cách cát, nhiệt độ thích hợp (không quá  $50^{\circ}\text{C}$ ), sau đó rót rượu nóng vào bình chứa được liệu, đầy nút kín, để yên 1 - 2 tuần lọc lấy nước rượu trong là được.

3.2.6 - *Thuốc phức hợp* : là dạng thuốc chế bằng riêng từng được liệu trong công thức thông qua các phương pháp chưng cất ngầm kiệt, sắc cô đặc thành dung dịch thuốc, rồi hợp lại theo tỉ lệ qui định. Cách điều chế : Căn cứ trên đặc tính khác nhau các được liệu (ví dụ : được liệu có hoạt chất dễ tan trong nước thì thường dùng cách sắc, được liệu có hoạt chất dễ tan trong rượu thì dùng cách ngầm kiệt, được liệu chứa tinh dầu thì dùng cách chưng cất). Trình tự các dịch thuốc đem hỗn hợp : cô nước thuốc sắc đến một độ đậm quy định (thường 1 g được liệu tương ứng với 1 ml dịch thuốc đậm đặc), thêm dịch chiết rượu cồn ngầm kiệt sau cùng thêm tinh dầu, lắc đều là được.