

Vapo - myrtol (Pháp)

Dạng thuốc : Lọ 600ml dung dịch để xông mũi, gồm có :

<i>Borneol</i>	60mg
<i>Menthol</i>	240mg
<i>Tinh dầu myrte</i>	0,30g
<i>Tinh dầu niaouli</i>	1,20g
<i>Tinh dầu thym</i>	120g
<i>Eucalyptol</i>	2,4g

Tác dụng : Sát khuẩn và chống cương tụ ở đường hô hấp trên và phế quản.

Chỉ định : Các chứng bệnh có cương tụ ở đường hô hấp trên (mũi họng) và phế quản.

Liều dùng : Ngày xông mũi- họng từ 3- 5 lần - mỗi lần dùng một thìa cà phê hòa vào một bát nước thật nóng, nhưng không sôi.

Chỉ định : Trẻ em dưới 8 tuổi và có tiền sử dị ứng.

Lưu ý : Nếu có phản ứng dị ứng, ngừng thuốc ngay

Varoma (Hàn Quốc)

Dạng thuốc : Lọ 100ml chứa:

<i>Gel Al hydroxyd</i>	22,9g
<i>Bột nhão 30% Mg hydroxyd</i>	13,34g
<i>Nhũ dịch 30% simethicon</i>	13,3g

Chỉ định : Đau dạ dày, ợ chua, buồn nôn...

Liều dùng : Người lớn : ngày 4 lần x 10-20ml, xa bữa ăn, và khi đi ngủ.

Vascocitrol

Dạng thuốc : Ống uống 10ml có :

<i>Citroflavonoid</i>	0,1g
<i>Mg ascorbat</i>	0,25g
<i>Cholin citrat</i>	1g
<i>Betain</i>	0,2g
<i>Cao pectin Mg của cam quýt</i>	0,3g

Tác dụng : Trơ tĩnh mạch, che chở mạch.

Chỉ định : Triệu chứng liên hệ tới suy tĩnh mạch - bạch huyết : chân nặng, dị cảm, co rút, đau nhức. Giãn mao mạch ở da (bầm máu, đốm xuất huyết). Rối loạn tuần hoàn vồng mạc và màng mạch.

Liều dùng : 2-3 ống/ngày, uống với ít nước.

Có thể tăng liều nếu cần thiết.

Vascuton

Dạng thuốc : Viên nang có :

<i>Các oligome của dehydro-cyanidin cây Cupressus sempervirens</i>	0,1g
--	------

<i>Lactose</i>	0,048g
<i>Tinh bột ngô</i>	0,02g
<i>Levilit</i>	0,02g
<i>Na sulfat khan</i>	0,02g
<i>Mg stearat</i>	0,02g

Tác dụng : Che chở mạch, chống phù, chống viêm, trị chảy máu.

Chỉ định : Viêm vồng mạc dịch rì (viêm vồng mạc tuổi già, tăng huyết áp, đái tháo đường nhiễm khuẩn). Hội chứng thiếu máu cục bộ do động mạch xơ cứng, do tuổi già, do cận thị biến chứng, do glôcôm.

Liều dùng : Người lớn uống 2 viên một lần, ngày uống 2-3 lần. Trẻ em uống 1 viên 1 lần, ngày uống 3 viên.

Vaselin gomenol

Dạng thuốc : Ống 15g thuốc mỡ có :

<i>Gomenol</i>	5g
<i>Vaselin được dụng vđ</i>	100g

Chỉ định : Phòng bệnh mũi hầu, sổ mũi, viêm mũi hầu cấp và mạn tính, chảy nước mũi, viêm mũi, viêm mũi khô có khuynh hướng teo.

Liều dùng : Bôi lên niêm mạc mũi nhiều lần mỗi ngày.

Vaselin stérilisée Hamel

Dạng thuốc : Ống thuốc mỡ vô khuẩn chứa vaselin được dụng.

Tác dụng : Làm thông trơn.

Chỉ định : Băng che chở da và niêm mạc.

Liều dùng : Bôi tại chỗ

Vasocalm (Pháp)

Dạng thuốc : Viên có :

<i>Cao Ribes nigrum</i>	150mg
<i>Papaverin HCl</i>	15mg
<i>Meprobamat</i>	100mg

Chỉ định : Rối loạn tập tĩnh tâm thần tuổi già : chóng mặt, ù tai, rối loạn thị giác, viêm động mạch chân, vôi rối loạn mạch tứ chi (hội chứng đau chi).

Liều dùng : Uống 3 viên/ngày. (vào giữa 3 bữa ăn chính).

Chống chỉ định : Tăng áp lực sọ, rối loạn dẫn truyền trong tim. Có thai

Lưu ý : Cấm uống rượu, kể cả nước có rượu khi dùng thuốc- Thuốc gây buồn ngủ- Không kết hợp với levodopa - Cẩn theo dõi chức năng gan- Không có tác