

bệnh thực quản, dạ dày, tá tràng- Chứng đầy bụng.

**Liều dùng:** Người lớn : nhai 1-2 viên từ 1-3 giờ sau bữa ăn, hoặc lúc đau hay buổi tối trước khi đi ngủ.

**Chống chỉ định:** Suy thận nặng.

### Kaologeais (Pháp)

**Dạng thuốc:** Hộp 250g thuốc cốm chứa:

MgO	2,5g
Meprobamat	5g
Mg sulfat	12,5g
Kaolin	50g
Gôm Sterculia	150g

**Chỉ định:** Điều trị triệu chứng các bệnh đường ruột như đầy bụng, đau bụng...

**Liều dùng:** Uống ngày 3 lần, mỗi lần 10g thuốc cốm, trước bữa ăn.

**Chống chỉ định:** Các bệnh gây co hẹp đường tiêu hóa.

### Kaomuth (Pháp)

**Dạng thuốc:** Thuốc bột uống đóng hộp 90g, cứ 1 thìa cà phê chứa:

Kaolin	1967mg
Mg hydrat	281mg

**Chỉ định:** Điều trị chứng bệnh gây đau ở thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, (do rối loạn chức năng).

**Liều dùng:** Ngày 2-3 thìa cà phê hòa vào ít nước, uống 1 giờ sau bữa ăn, khi đi ngủ buổi tối hoặc lúc đau.

**Chống chỉ định:** Suy thận nặng.

### Kaopectat (Anh, Pháp)

**Dạng thuốc:** Dịch treo uống (986mg kaolin và 22mg pectin/5ml)

**Chỉ định:** Ỉa chảy do ăn uống.

**Liều dùng:** Người lớn : mỗi lần 30-120ml, ngày 2-3 lần. Trẻ em mỗi lần 5-10ml.

### Kaopectate (Upjohn)

Viên "caplet" 750mg attapulgit

### Karvol (Ấn Độ)

**Dạng thuốc:** Viên nang để xông, hít, chứa:

Menthol	7,9%
Clorbutol	6,6%
Cinnamon oil	2,7%
Terpineol	14,8%
Tinh dầu thông	18,8%
Thymol	0,7%

**Tác dụng:** Những thành phần cấu tạo của Karvol loại xông, hít kết hợp lại có tác dụng gây tê tại chỗ nhẹ, kích thích, làm long đờm. Ngoài ra, còn có tác dụng kháng khuẩn nhờ các chất thymol, clorbutol và terpineol giúp ngăn cản sự phát triển của nhiễm khuẩn thứ phát.

**Chỉ định:** Cảm lạnh. Viêm thanh quản. Viêm khí quản. Viêm phế quản và tất cả những trường hợp bệnh lý khác có kèm xung huyết ở đường hô hấp nói trên.

**Liều dùng:** Một viên sau khi cắt đầu dài, cho nước ở trong nang vào cốc đựng nước sôi và xông, khăn tắm phủ lên đầu để làm tăng hiệu quả. Thuốc xông Karvol cũng có thể cho nhỏ vào khăn tay, khăn phủ và xông hít.

### Kefalgin (Hungari)

**Dạng thuốc:** Viên bọc đường có

Ergotamin tartrat	0,2mg
Cao khô Belladon	5mg
Cafein	60mg
Pyramidon	150mg

**Tác dụng:** Phối hợp hiệp đồng giảm đau, các cơn đau nửa bên đầu.

**Chỉ định:** Phòng và trị các cơn đau nửa đầu, đau đầu kích phát.

**Liều dùng:** Khi cơn đau: uống 1-2 viên. Sau nửa giờ, nếu chưa đỡ uống tiếp 1 viên. Liều dùng tối đa: 6 viên/24 giờ và 12 viên/tuần.

**Chống chỉ định:** Bệnh mạch vành hoặc ngoại vi tiến triển, tăng huyết áp, tổn thương nặng ở gan hay thận, phụ nữ có thai.

**Lưu ý:** Có thể bị mất bạch cầu hạt, nguy hiểm, chết người. (Xem Metamizol Natri)

### Kiên vị tiêu hóa

**Dạng thuốc:** Thuốc sắc:

Hoàng bá	12g
Chi tử	12g
Cam thảo	6g

Cho 600ml nước - sắc còn 200ml

**Chỉ định:** Viêm ống mật, hoàng đản, kém tiêu hóa.