

## Spasmocarbine

**Dạng thuốc :** Hộp 100g thuốc gồm chứa :

<i>Than hoạt tính</i>	15g
<i>Methenamin</i>	2g
<i>Benzonaphthol</i>	5g
<i>Cao Lạc tiên</i>	0,40g
<i>Mg bromid</i>	2,5g
<i>Cao Jusquiam</i>	0,10g
<i>Cao Cà dược</i>	0,10g
<i>Bột Cà dược</i>	0,10g
<i>Đường pha vani vừa đủ.</i>	

**Chỉ định :** Đau bụng co thắt, bệnh đại tràng chức năng, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu và ỉa chảy thường.

**Liều dùng :** 1-3 thìa café, sau bữa ăn hay vào lúc đau.

**Chống chỉ định :** Glôcôm, u tuyến tiền liệt, trẻ em dưới 15 tuổi.

**Lưu ý :** Vì tính hấp thu của than, tránh dùng cùng lúc với những thuốc dễ bị Spasmocarbine hấp thu.

## Spasmosedine

**Dạng thuốc :** Viên có :

<i>Quinin bromhydrat</i>	0,05g
<i>Cao Sơn tra ôn định</i>	0,05g
<i>Phenobarbital</i>	12mg

**Chỉ định :** Rối loạn chức năng tim dễ bị kích thích, đánh trống ngực, ngoại tâm thu, đau trước tim, mất cân bằng tim do nội tiết, xúc cảm. Co thắt mạch ở người tăng huyết áp, vữa xơ động mạch (nhức đầu, ù tai, chóng mặt, co thắt đầu chi).

**Liều dùng :** Uống 2-6 viên/ngày.

**Chống chỉ định :** Rối loạn chuyển hóa porphyrin, suy hô hấp nặng, thiếu G6PD.

**Lưu ý :** Thuốc làm buồn ngủ. Cấm uống rượu khi dùng thuốc.

## Speman forte (Ấn Độ)

**Dạng thuốc :** Viên nén chứa các bột dược thảo sau đây :

<i>Orchis mascula</i>	39mg
<i>Hygrophila spinosa</i>	19mg
<i>Lactuca scariola</i>	10mg
<i>Mucuna pruriens</i>	10mg
<i>Các cao thuốc Argyreia speciosa</i>	19mg
<i>Tribulus terrestris</i>	19mg
<i>Leptadenia reticulata</i>	19mg
<i>Parmelia perlata</i>	10mg
<i>Suvarnavang</i>	10mg

*Rauwolfia serpentina* đã tiêu chuẩn hóa chứa 1,5mg toàn bộ alcaloid.

**Chỉ định :** Xuất tinh sớm, mộng tinh, di tinh. Sai lệch tình dục do lão suy. Thủ dâm.

**Liều dùng :** Xuất tinh sớm : ngày 1-2 viên x 4 lần/ngày. Đợt 2-4 tuần. Mộng tinh, di tinh : liều dùng như trên trong 4-6 tuần, sau giảm liều tiếp 4 tuần nữa. Thủ dâm : liều dùng như trên, từ 4-8 tuần, cho tới khi kiểm chế được).

**Lưu ý :** Thuốc không có chống chỉ định vì không chứa hormon nên ít gây tác dụng phụ.

## Spevin

**Dạng thuốc :** Viên nang có :

<i>Cascara sagrada nghiền vụn</i>	0,26g
<i>Quassia amara nghiền vụn</i>	0,01g
<i>Than thảo mộc</i>	0,015g
<i>Lactose</i>	0,2g
<i>Mg stearat</i>	0,015g

**Chỉ định :** Táo bón.

**Liều dùng :** Uống 1-3 viên/ngày, sau các bữa ăn.

**Chống chỉ định :** Viêm đại tràng- đau bụng không rõ nguyên nhân.

**Lưu ý :** Không dùng thuốc lâu dài. Nếu bị ỉa chảy, đau bụng thì ngừng thuốc. Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc nuôi con bú.

## Splenin

**Dạng thuốc :** Ống tiêm 1ml

**Tác dụng :** Là hormon không chứa protein lấy từ lách trâu bò.

**Chỉ định :** Điều chỉnh các rối loạn chuyển hóa chất đạm và làm tăng chức năng giải độc của gan, dùng phòng và điều trị bệnh nhiễm độc thai nghén.

**Liều dùng :** Nhiễm độc độ 1 : tiêm dưới da hoặc bắp thịt hàng ngày 2ml, trong 8-10 ngày. Nhiễm độc độ 2 : tiêm hàng ngày 2ml (lần 1 hoặc 2 lần, mỗi lần 1ml), trong 10-13 ngày. Nhiễm độc độ 3 : Tiêm 2ml, hai lần trong ngày, trong 10-15 ngày và truyền thêm đủ số lượng dịch thể. Nên kết hợp dùng dung dịch tiêm NaCl đẳng trương, glucose ưu trương 40% bromid và các phương tiện điều trị nhiễm độc thai nghén khác.

## Sthenorex

**Dạng thuốc :** Viên nang và gói chứa :

<i>Cao tan trong nước</i>	
<i>phân hoa</i>	0,12g-0,18g