

Tác dụng : Kháng acid dạ dày nhanh- giảm dày hớt.

Chỉ định : Tăng tiết acid dạ dày loét dạ dày- tá tràng, dày hối, tích hối.

Liều dùng : Nhai 1-2 viên, hoặc uống 1-2 thìa cà phê hỗn dịch vào bữa ăn hay trước lúc ăn ngủ.

Lưu ý : Không dùng thuốc lâu dài, làm mất phosphor. Thận trọng với người suy thận. Không nên dùng cùng lúc với một số thuốc khác.

Tác dụng : Trị thiếu máu, chống suy nhược.

Chỉ định : Suy nhược cơ thể - kiệt sức- mệt lử- suy yếu tinh dục. Thiếu máu, dưỡng bệnh. Thiếu chất sắt, do cung cấp hoặc hấp thu kém.

Liều dùng : Uống 2-6 viên/ngày, chia 2-3 lần - uống trong 20-30 ngày.

Chống chỉ định : 3 tháng đầu có thai. Suy thận.

Lưu ý : Nước tiểu sẽ nhuộm vàng và phản ứng màu đen.

Mysca (Pháp)

Dạng thuốc : Ống 40-70g thuốc mỡ, chứa trong 100g:

Menthol	1g
Dầu Juniperus oxycedrus	6g
Tinh dầu húng tây	1g
Long não	2g
Resorcin	5g

Tác dụng : Diệt khuẩn, làm se, làm dịu

Chỉ định : Ngứa, eczema, chốc lở, (impetigo), phồng, bóng nhẹ, loét, giãn mạch, trĩ.

Liều dùng : Bôi 1-2 lần/ngày.

Chống chỉ định : Tre em dưới 3 tháng

Lưu ý : Thận trọng khi dùng ở trẻ 30 tháng đến 7 tuổi.

N

Narbalex (Pháp)

Dạng thuốc : Mỗi viên có:

Sắt II fumarat	0,1g
Vitamin B ₂	0,009g
Vitamin B ₆	0,009g
Vitamin PP	0,05g
Ca pantothenat (B ₅)	0,025g
Mg asparatat	0,03g
Mg molybdat	0,03g

Tác dụng : Trị thiếu máu, chống suy nhược.

Chỉ định : Suy nhược cơ thể - kiệt sức- mệt lử- suy yếu tinh dục. Thiếu máu, dưỡng bệnh. Thiếu chất sắt, do cung cấp hoặc hấp thu kém.

Liều dùng : Uống 2-6 viên/ngày, chia 2-3 lần - uống trong 20-30 ngày.

Chống chỉ định : 3 tháng đầu có thai. Suy thận.

Lưu ý : Nước tiểu sẽ nhuộm vàng và phản ứng màu đen.

Narina (Hàn Quốc)

Dạng thuốc : Viên nang chứa 120mg bột lô hội (Aloës).

Chống chỉ định : Táo bón, khô da, trứng cá. dày bụng, kém ăn, trĩ.

Liều dùng : Người lớn ngày uống 1-2 viên.

Natabec kapseals (Mỹ)

Dạng thuốc : Mỗi viên nang có:

Vitamin A	4000 dvqt (1,2mg)
Vitamin D	400 dvqt
Vitamin C	50mg
Vitamin B ₁	2mg
Nicotinamid	10mg
Vitamin B ₆	3mg
Vitamin B ₁₂	5mcg
Sắt II sulfat khô	30mg

Chỉ định : Thiếu các vitamin thiết yếu. Đang lúc có thai, nuôi con bú- người già- yếu- mới ốm dậy. Sau khi hoặc kết hợp dùng kháng sinh.

Liều dùng : Uống 1 viên/ngày

Biệt dược tương tự:

Natabec Rx Kapseals (Mỹ)

Natafort Filmseal (Mỹ)

Natalin (Mỹ)

Có khác nhau một chút về lượng của từng thành phần vitamin và các muối khoáng tham gia vào công thức, nhưng đều chung một chỉ định.

Natalvit

Dạng thuốc : Viên:

Vitamin A	4000IU
Vitamin D	400IU
Vitamin E	11IU
Vitamin B ₁	1,5mg
Vitamin C	100mg
Vitamin B ₂	1,7mg