

Acid pantothenic 25mg và một số chất khoáng.

Chỉ định : Như Quotivit OE.

Liều dùng : Uống 1 viên/ngày, vào buổi sáng.

Lưu ý : *Liều cao vitamin C có thể gây sỏi thận ở một số người. Không nên uống vào buổi chiều tối (mất ngủ).*

Zegavit (Indonesia)

Dạng thuốc : Viên nén hình thuẫn (caplet) chứa các :

Vitamin E	30IU
Vitamin C	50mg
Vitamin B ₁	15mg
Vitamin B ₆	25mg
Vitamin B ₁₂	12mcg
Acid folic	0,4mg

và một số chất khoáng.

Chỉ định : Bổ xung các vitamin B, C và E kèm một số muối khoáng.

Liều dùng : Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: ngày 1 viên.

Lưu ý : *Không dùng cho trẻ em dưới 12.*

Zentramin

Dạng thuốc : Thuốc tiêm 5ml gồm:

Glycocol	1g
Mg Cl ₂	0,04g
CaCl ₂	0,045g
KCl	0,015g

Chỉ định : Trị rối loạn thần kinh thực vật, trạng thái co cứng cơ, dị ứng.

Liều dùng : Ngày tiêm bắp thịt hay tĩnh mạch 1-2 ống.

Zymoplex (Pháp)

Dạng thuốc : Viên nang đến ruột mới tan có :

-Cao tuyến tụy có hoạt tính thủy phân protein đã chuẩn độ (ít nhất 5.000.000 đvqt Armour/gói) : 17mg.

- Cao tuyến tụy có hoạt tính thủy phân amylase đã chuẩn độ (ít nhất 75.000 đv/1g) : 30mg.

- Polyzym lấy từ A. Aspergillus niger : 50mg.

- Lipase lấy từ Rhizopus arrhizus đã chuẩn độ (ít nhất 10.000 đv/g thủy phân) : 120mg.

- Dimeticon : 225mg.

Tác dụng : Phối hợp nhiều men tiêu hóa giúp cho sự hấp thụ nhanh các protid, glucid, lipid.

Chỉ định : Chậm tiêu. Đầy bụng do thiếu men tiêu hóa- khó tiêu do dinh dưỡng - Đầy hơi sau khi ăn - Rối loạn dinh dưỡng ở người già và bệnh nhân đại tháo đường.

Liều dùng : Người lớn ngày 2-3lần, mỗi lần 1-2 viên, vào trước bữa ăn - Nuốt viên thuốc với nước.

Zypan (Mỹ)

Dạng thuốc : Viên nén có :

Cao tuyến tụy	32,5mg
Pancreatin	65mg
Pepsin	97,5mg
Betain hydrochlorid	179mg
Amonium chlorid	975mg

Chỉ định : Như Zymoplex

Liều dùng : Uống vào bữa ăn 1-2 viên.
