

huyết acid lactic - tăng kali và calci huyết - suy tim.

Lưu ý: Không tiêm bắp thịt

Rocgel (pháp)

Dạng thuốc: Gói 11,60g hay 10ml hỗn dịch có : boehmit (gel alumin 15% Al_2O_3) 8,08g tương ứng với 1,212g Al_2O_3 .

Tác dụng: Tạo lớp che chở đường tiêu hóa chống acid.

Chỉ định: Viêm dạ dày- tá tràng, ợ nóng, hồi lưu thực quản với các biến chứng (viêm thực quản) bệnh đại tràng chức năng. Không dung nạp thuốc.

Liều dùng: Uống nguyên hay pha với nước, 3 gói/ngày, trước bữa ăn, (ruột đại tràng) hay chia ra 10 giờ, 16 giờ, 22 giờ (thực quản, dạ dày- tá tràng).

Lưu ý: Không dùng cùng lúc với tetracyclin, furosemid, indometacin, digoxin, isoniazid, các thuốc kháng tiết cholin - Có thể làm giảm và mất phosphor nếu dùng lâu dài.

Romarène (Pháp)

Dạng thuốc: Hộp 250g thuốc cỏm, trong 1 thìa cà phê :

Cao lỏng Romarin	125mg
Cao mềm Taraxacum	22,5mg
Cao mềm Eucalyptus	7,5mg
Kali và natri tartrat	125mg
Natri citrat	0,5g
Tinh dầu Romarin	0,25mg

Tác dụng: Phối hợp một số dược thảo nhuận mật, tăng tiết mật, và chống acid.

Chỉ định: Các chứng đầy hơi, chậm tiêu, nấc, buồn nôn.

Liều dùng: Người lớn : ngày 1-3 thìa cà phê. Trẻ em 1/2 -2 thìa cà phê. Nhai thuốc cỏm hoặc hòa tan vào cốc nước ấm.

Lưu ý: Suy gan nặng, nghẽn đường dẫn mật.

Rotundin

Biết được: Rotunda (XNDPTW 2)

Tác dụng: An thần - ngủ.

Rượu tắc kè

Dạng thuốc: Rượu thuốc:

Tắc kè 3 con
Rượu 35-40° 1000ml

Tắc kè làm sạch (bỏ mật) xấy khô, bỏ đầu và chân. Phải giữ được nguyên đuôi. - Ngâm vào rượu từ 10 ngày trở lên rồi dùng.

Chỉ định: Đau lưng- suy nhược - mệt nhọc.

Liều dùng: Uống 15ml -30ml rượu/ngày.

Lưu ý: Trong khi ngâm rượu có thể gia giảm 1 ít trần bì.

Có thể pha thêm mật ong để uống nếu cần.

Nên chia 2 lần uống vào buổi sáng và tối.

Rumafar

(Cty DPSài Gòn - Sagopha)

Dạng thuốc: Viên bao có:

Phenylephrin HCl	2mg
Cao sài hồ nam	150mg
Cao mía đỏ	50mg
Cao xuyên khung	50mg
Bột mạn kinh tử	50mg
Bột bạch chỉ	30mg
Bột địa liền	30mg

Bột phèn phi, kèm tinh dầu quế, hương nhu, eucalyptol.

Chỉ định: Cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau cơ, nhức mỏi.

Liều dùng: Người lớn, ngày 3-4 lần x 2 viên.

Trẻ em : từ 5 tuổi đến 9 tuổi : 1-3 viên/ngày. Từ 10- 15 tuổi : 3-6 viên/ngày. chia 3-4 lần.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 5 tuổi.

Rumalon (Robapharm - Pháp)

Dạng thuốc: Ống tiêm 1ml chứa

Cao sụn	310mg
Tủy xương	210mg
Kẽm	3mg

Metacresol để bảo quản trong nước cất tiệt.

Tác dụng: Chống thấp khớp (do ức chế thoái hóa sụn)

Chỉ định: Viêm xương- khớp.

Liều dùng: cách ngày, tiêm bắp 1 ống. Đợt dùng 7-8 tuần.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với thuốc.

Rượu rắn

Dạng thuốc: Rượu hoặc bột ;

Rắn cạp nong

10 con