

Chống chỉ định : (với viên nén) : mất bạch cầu hạt.

Lưu ý : Thuốc dạng dùng cho người lớn, không được dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Thuốc viên nén, coi chừng, mất bạch cầu hạt, nguy hiểm chết người.

Sedative Bombatus (Đức)

Dạng thuốc : Lọ 20ml dung dịch gồm có :

<i>Amoniac</i>	0,1%
<i>Bôm Peru</i>	0,1%
<i>Cao hoa Cam cúc</i>	1%
<i>Cồn thuốc canhkena</i>	2%
<i>Hỗn hợp tinh dầu</i>	1,25%
<i>Propyl paraminobenzoat</i>	0,5%
<i>Cồn</i>	92%

Tác dụng : Giảm đau, chống viêm

Chỉ định : Đau răng, loét miệng, viêm lợi.

Seirogan (Nhật Bản)

Dạng thuốc : Viên hoàn màu nâu đen : cứ 9 viên chứa :

<i>Creosot thảo mộc</i>	400mg
<i>Bột Gambir</i>	200mg
<i>Bột Glycyrrhiza</i>	150mg
<i>Bột Phellodendron</i>	300mg
<i>Bột vỏ Citrus unshiu</i>	300mg

Chỉ định : Ỉa chảy tự phát, ỉa chảy do ăn không tiêu, viêm dạ dày do thức ăn hoặc chướng bụng, nôn mửa.

Đau răng do bị sâu.

Liều dùng : Trị ỉa chảy và những chỉ định trên : Ngày uống 3 lần sau bữa ăn, mỗi lần tùy theo tuổi :

Trên 15 tuổi : 3 viên, 11 - 15 tuổi : 2 viên, 8 - 10 tuổi : 1,5 viên, 5-7 tuổi : 1 viên.

Đau do sâu răng : Ngày từ 1/2 đến 2 viên (đặt viên thuốc ở chỗ sâu răng và ngậm cho tan dần).

Seltic (Hàn Quốc)

Dạng thuốc : Viên nang chứa :

<i>Men bia khô có (tương ứng với 50mcg seleni)</i>	92,6mg
<i>Tocopherol acetat</i>	400UI
<i>Retinol palmitat</i>	5000UI
<i>Vitamin C</i>	500mg
<i>Lecithin</i>	50mg

Tác dụng : Chống oxy hóa, tăng cường tuần hoàn.

Chỉ định : Phòng ngừa các bệnh ở người có

tuổi, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, nhiễm khuẩn, viêm khớp, bệnh về mắt.

Liều dùng : Ngày 1 lần x 1 viên.

Senokot (Pháp)

Dạng thuốc : Bột phan tả điệp (Séné) có 4,8% các senosid tính theo senosid B. Viên 0,153g - Hộp 240g thuốc cốm có 26,06g bột.

Tác dụng : Nhuận tràng.

Chỉ định : Táo bón.

Liều dùng : Người lớn uống 2 viên vào lúc đi ngủ, có thể tăng đến 4 viên, chia 2 lần trong ngày (24 giờ). Thuốc cốm uống 1 thìa cà phê gạt, uống lúc đi ngủ. Có thể tăng tới 2 thìa, chia 2 lần /24 giờ. Trẻ em trên : 3 tuổi : 1/4-1/2 liều người lớn, tùy theo tuổi.

Chỉ định : Viêm đại tràng - Đau bụng không rõ nguyên nhân.

Lưu ý : Không dùng lâu dài. Ỉa chảy, đau bụng thì ngừng thuốc.

Senophile (Pháp)

Dạng thuốc : Ống thuốc mỡ 50mg có :

<i>OZn</i>	2,5g
<i>Cholesterol benzoat</i>	0,5g

Tác dụng : Biểu bì hóa và làm dịu.

Chỉ định : Ban đỏ đùi, nẻ vù và bàn tay, cước nứt, phỏng nhẹ, cháy nắng, hăm kẽ.

Liều dùng : Bôi, chà nhẹ 2- 6 lần/ngày.

Chống chỉ định : Chỗ thương tổn hở, loét.

Senosid

Sennosides A và B.

Dạng thuốc : Viên bọc đường 10ml (hoặc 12mg dạng muối calci)

Tác dụng : Hoạt chất lấy từ Phan tả điệp, có tác dụng nhuận tràng.

Chỉ định : Các chứng táo bón cấp và mạn (do giảm nhu động ruột), đề tẩy trước khi mổ đường ruột.

Liều dùng : Người lớn : đề nhuận tràng, : 1-2 viên, sau bữa ăn tối. Đề tẩy : 3-4 viên như trên. Trẻ em 6-15 tuổi : ngày 1-2 viên.

Chống chỉ định : Nghi tắc ruột, rối loạn chuyển hóa kali, phụ nữ có thai.

Serrapeptase

Tên khác : *Serrapeptase chiết từ Serratia sp*