

tuổi : 2-3 viên /24giờ, hay mỗi lần 50 giọt, 5 lần/ngày hay 3 thìa canh/ngày.  
Trẻ em : 2 giọt/tuổi/lần, 2-3 lần/ngày. Trẻ em 11-15 tuổi : 1-3 thìa cà phê sirô/ngày.

**Chống chỉ định :** Suy hô hấp. Hen suyễn.

**Lưu ý :** Cần thận nên theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

### Tứ vật thang

**Dạng thuốc :** Thuốc bắc:

Đương quy	12g
Thục địa (hoặc sinh địa)	12g
Bạch thược	8g
Xuyên khung	6g

Với 600ml nước, sắc để lấy 200ml.

**Chỉ định :** Thiếu máu, suy nhược, kinh nguyệt không đều, máu hôi sau đẻ.  
(Máu hôi sau đẻ ra nhiều thường phối hợp với đau đen, hắc can khương, trạch lan, ngưu tất, ích mẫu, bồ hoàng.)

**Liều dùng :** Uống 50-60ml/lần x 3 lần/ngày.

### Tử kim dĩnh

**Dạng thuốc :** Viên hoặc định:

Sơn từ cô	80g
Đại kích	60g
Ngũ bội tử	40g
Thiên kim tử dương	40g
Chu sa	16g
Xạ hương	12g
Minh hoàng hùng	8g

Chế thành thuốc định hoặc viên 2g-4g

**Chỉ định :** Ngộ độc thức ăn.

**Liều dùng :** Uống 1-2g/lần x 11-2 lần/ngày

### Uabain

**Tên khác :** Oubain

*Strophantium G*

*Strophantosid G*

**Dạng thuốc :** Ống tiêm 1ml= 0,25mg

**Tác dụng :** Glucosid chiết xuất từ hạt cây *Strophantus gratus*, họ Trúc đào (Apocynaceae), có tác dụng trị suy tim (xuất hiện sớm hơn nhiều so với digitalin, nếu được dùng trong những trường hợp suy tim cấp), tác dụng đạt mức cao nhất sau khi tiêm tĩnh mạch 10 phút.

**Chỉ định :** Cấp cứu suy tim, suy tim kèm nhịp chậm, hoặc có tổn thương bó His, viêm cơ tim, loạn nhịp trên thất (nhất là mạch nhanh trên thất).

**Liều dùng :** Tiêm tĩnh mạch thật chậm (lưu ý không được để thuốc ra ngoài mạch). Mỗi lần tiêm 0,25mg, ngày tiêm 0,50mg, cách 12 giờ tiêm 1 lần, liều tối đa 1 lần : 0,5mg, 24 giờ : 1mg.

**Chống chỉ định :** Nhồi máu cơ tim, viêm màng trong tim, dùng đồng thời với digitalin (phải nghỉ thuốc digitalin ít nhất 3 ngày).

**Lưu ý :** Tránh phối hợp với thuốc khác trong cùng 1 bơm tiêm, giảm liều dùng nếu bị suy thận, suy hô hấp nặng, gây giảm oxy huyết.

## U

### Ukidan

**Dạng thuốc :** Lọ thuốc bột chứa :

Urokinase	100000UI
hoặc	500000UI
Mannitol	20mg
Natri edetat	2mg
Natri phosphat	1,5mg
Natri chlorid	0,4mg

Kèm 1 ống dung dịch NaCl 0,9%

**Tác dụng :** Enzym phân lập từ nước tiểu người có tác dụng hoạt hóa hệ thống tiêu fibrin (chuyển plasminogen thành plasmin).

**Chỉ định :** Huyết khối phổi cấp (nhất là khi có mẫn cảm với Streptokinase nhiễm liên cầu khuẩn), tắc động mạch, tĩnh mạch do huyết khối.

**Liều dùng :** Hòa tan lọ thuốc có dung dịch NaCl rồi pha loãng với dung dịch đẳng trương NaCl hoặc glucose để tiêm truyền tĩnh mạch lúc đầu tiêm 4400 đvqt/kg thể trọng trong 10-15 phút sau cứ 12 giờ dùng liều duy trì 4400 đvqt/kg. Huyết khối ở tĩnh mạch : 2000 đvqt/kg/24giờ.

**Chống chỉ định :** Tuyệt đối : mới bị chảy máu : tiền sử tai biến mạch máu não, u não,