

20 ngày/tháng. - Trục tràng : 4 viên/ngày cho đến hết trĩ.

Venomin (Hàn Quốc)

Dạng thuốc : Viên nang mềm chứa :

Tinh dầu tỏi (tương ứng với 0,1mg allicin)	100mg
Cao hạt dẻ An Độ (tương ứng với 7,5mg aescin)	50mg
Vitamin A	20000IU
Vitamin B ₁	2mg
Vitamin B ₂	2mg
Vitamin B ₆	2mg
Vitamin E	50mg
Procain HCl	50mg

Chỉ định : Các suy nhược về thể chất và tâm thần ở người có tuổi, rối loạn thần kinh ngoại vi, bất lực.

Liều dùng : Người lớn, ngày 1 viên, sau bữa ăn sáng.

Vényl

Dạng thuốc : Ống 10ml thuốc uống có :

Cao lỏng <i>Rusos aculeatus</i>	1,5ml
<i>Hesperidin methyl chalcon</i>	0,15g
<i>Acid ascorbic</i>	0,10g
<i>Magnesi citrat</i>	0,10g
<i>Kali gluconat</i>	0,20g

Tác dụng : Trợ tĩnh mạch.

Chỉ định : Phụ nữ, các rối loạn tuần hoàn chân, khó chịu lúc có kinh, trĩ.

Liều dùng : Uống 1-2 ống/ngày pha với nửa ly nước, uống trước bữa ăn.

Veriane Buriat (Pháp)

Dạng thuốc : Lọ 125ml thuốc uống/viên/thuốc đạn người lớn có :

<i>Barbital</i>	0,125/0,125/0,40g
Cao <i>Valerian</i>	0,40/0,015/0,10g

Tác dụng : Làm êm dịu, ngủ.

Chỉ định : Mất ngủ lúc đầu hay nửa đêm. Tiền gây mê. Loạn trương lực thần kinh thực vật.

Liều dùng : Người lớn 2-5 thìa cà phê hay 2-5 viên, hay 1-2 thuốc đạn. Trẻ em : 25 giọt (tức 1/3 thìa cà phê)/24 giờ. Để gây ngủ (thuốc nước và thuốc đạn) uống 1/2 giờ tới 45 phút trước khi đi ngủ. Mất ngủ lúc đêm uống 1-3 viên trước khi đi ngủ.

Chống chỉ định : Viêm thận nặng kèm vô niệu.

Lưu ý : Không uống rượu hoặc bất kỳ thứ gì có rượu khi dùng thuốc. Thuốc có thể kéo dài phản xạ gân cốt.

Vericardine (Pháp)

Dạng thuốc : Viên có :

<i>Papaverin HCl</i>	0,015g
<i>Quinin HBr</i>	0,02g
<i>Phenobarbital</i>	0,02g
Cao Sơn tra	0,15g

Tác dụng : Làm êm dịu. Điều hòa hệ thần kinh thực vật và tim mạch.

Chỉ định : Rối loạn chức năng tim, dễ kích thích : đánh trống ngực, hồi hộp, đau trước tim, co rút, đau nhức đầu chi.

Liều dùng : Uống 1-3 viên trước một trong các bữa ăn chính.

Mất ngủ có rút về đêm, uống 2-4 viên lúc đi ngủ.

Chống chỉ định : Rối loạn chuyển hóa porphyrin, suy hô hấp nặng, thiếu G6PD

Lưu ý : Thuốc làm buồn ngủ. Cấm uống rượu và bất cứ thứ gì có rượu khi dùng thuốc.

Verorab (Pasteur Merieux-Pháp)

Tên khác : Imovax Rabies Vero

Dạng thuốc : Lọ thuốc tiêm 1 liều, kèm ống tiêm chứa sẵn 0,5ml dung môi.

Chỉ định : Vaccine phòng dại đã mất hoạt tính. Để điều trị những người bị chó dại cắn hoặc phòng dại cho nhân viên thú y.

Liều dùng : Chỉ dùng tiêm bắp hoặc tiêm dưới da. Phòng dại : 2 lần tiêm cách nhau 1 năm, và sau đó cứ 3 năm 1 lần.

Chống chỉ định : Sốt tiền triển (hoàn tiêm) - sau khi lấy nhiễm không có chống chỉ định.

Lưu ý : Người đã tiêm chủng, bị con vật cắn hoặc lây nhiễm, bắt buộc phải đi khám, mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng.

Thận trọng với người dị ứng *Streptomycin*, *Neomycin*, *Polymycin B*.

Tại chỗ tiêm, hiếm gặp ban da nổi cục cứng nhỏ (24-48 giờ), vài trường hợp tăng thân nhiệt, suy nhược tạm thời.

Nếu đang sốt cấp, hoặc phụ nữ có thai, có thể trì hoãn tiêm vaccin này.