

*Chlorophyl* 0,8mg  
*Gel khô nhôm hydroxyd* 160mg  
**Tác dụng** : Phối hợp hiệp đồng trị loét dạ dày- ruột.

**Chỉ định** : Loét dạ dày- tá tràng, tăng acid dịch vị, đầy bụng do nguyên nhân thần kinh, viêm và đau dạ dày- ruột, táo bón.

**Liều dùng** : Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên, sau bữa ăn.

### Wei-U (Trung Quốc)

**Dạng thuốc** : Viên nén có : Phần ngoài  
*Al hydroxyd* 123mg  
*Mg trisilicat* 58mg  
 Nhân có Metylmethionin sulfonium iodid.50mg

**Chỉ định** : Như Weisen -U.

**Liều dùng** : Người lớn, ngày uống 3 lần, mỗi lần 1-2 viên.

### Wellferon (Mỹ)

**Dạng thuốc** : Lọ thuốc tiêm 1ml chứa 3 mega unit (MU) interferon của người dưới dạng limphô nguyên bào tinh chế (còn gọi là interferon alfa-n1(Ins)

**Chỉ định** : Bệnh tăng bạch cầu tế bào lông (hairycelleleukaemia)

**Liều dùng** : Tiêm sâu bắp thịt hay dưới da- Người lớn dùng bắt đầu ngày 1 lọ, sau 12-16 tuần, nếu có tiến triển tốt, tuần lễ tiêm 3 lần, mỗi lần 1 lọ. Đợt dùng từ 6 tháng trở lên.

**Lưu ý** : *Rất thận trọng nếu : hen, rối loạn tâm thần, bệnh gan, thận, tim mạch, thần kinh trung ương. Cần theo dõi huyết đồ trong vài tuần đầu.*

### Wismusan oleosum (Đức)

**Dạng thuốc** : Hỗn dịch dầu bismuth salicylat : Loại thường lọ 90ml dung dịch 5% và loại mạnh lọ 15ml dung dịch 10%.

**Chỉ định** : Trị các thể giang mai.

**Liều dùng** : Lúc đầu tiêm mỗi ngày 1ml, sau cách 3 ngày tiêm 1ml. Cả đợt điều trị tiêm từ 16-20ml dung dịch loại thường.

### Wonbi (Hàn Quốc)

**Dạng thuốc** : Viên nén có :  
*Cao lông Nhân sâm* 100ml  
*Cao lông Angelica gigantis* 30mg  
*Cao lông Hoàng kỳ* 40mg

*Cao lông Dâm dương hoắc* 50mg  
*Vitamin C* 50mg  
*Vitamin E* 50mg  
 Kèm 9 vitamin khác.

**Chỉ định** : Các rối loạn dinh dưỡng ở người có tuổi (như giảm sút về trí nhớ ; dễ mệt mỏi, trầm cảm....) rối loạn về tuần hoàn.

**Liều dùng** : Ngày 2-3 lần, mỗi lần 1 viên.

### Wonbi-D (Hàn Quốc)

**Dạng thuốc** : Lọ 100ml dd uống có :

*Cao lông Nhân sâm* 450mg  
*Cao lông Kỳ tử* 150mg  
*Vitamin B6* 3mg  
*Vitamin B2* 2mg

Và một số hoạt chất khác.

**Chỉ định** : Lao lực thể xác và tâm thần, người mới ốm dậy, suy dinh dưỡng, rối loạn chức năng gan, thiếu máu.

**Liều dùng** : Người lớn : ngày 1-2 lần, mỗi lần 1 lọ.

### Wonbi Won (Hàn Quốc)

**Dạng thuốc** : Nang mềm chứa :

*Natri chondroitin sulfat* 50mg  
*Oryzanol* 10mg  
*Vitamin A* 4000 đvqt  
*Vitamin E* 30mg

Và 8 vitamin khác.

**Chỉ định** : Suy dinh dưỡng, rối loạn chức năng gan, suy giảm chức năng ở hệ thần kinh thực vật, rối loạn thể chất ở người có tuổi.

**Liều dùng** : Người lớn : ngày 1 viên - nếu cần có thể uống tới 2-3 viên/ngày.

### Wyanooids

**Dạng thuốc** : Thuốc đạn có :

*Cao belladon (tương đương 0,15mg các alcaloid toàn phần)* 15mg  
*Ephedrin sulfat* 3mg  
 và các thành phần khác như ZnO, acid boric, dioxyiodid, Bi subcarbonat và bism Peru.

**Chỉ định** : Giảm đau, ngứa trĩ.

**Liều dùng** : Nạp 1 đạn/lần x 2 lần/ngày. Dùng 6 ngày.

**Lưu ý** : *Tránh dùng nếu : glôcôm, người già, trẻ em dưới 6 tuổi.*

- Không dùng thuốc lâu dài.

- Nếu mạch nhanh, buồn ngủ, nhìn mờ,