

Vitamin B ₆	2,2mg
Cyanocobalamin	3mcg
Acid folic	0,4mg
Ascorbic acid	60mg
Cholecalciferol	5mcg
Vitamin E	9mg
Nicotinamid	16mg
Sắt II fumarat	18mg
Kẽm sulfat	15mg
Đồng sulfat	2mg
Kali iodid	0,15mg
Mangan sulfat	32,5mg
Crom chlorid	50mg
Natri seleni	50mg
Natri molybdat	0,15mg

Chỉ định : Bổ xung các vitamin và 8 muối khoáng cần thiết cho cơ thể.

Liều dùng : Ngày uống 1 viên.

Vitaporan (Hàn Quốc)

Dạng thuốc : Nang mềm chứa :

Vitamin A	4000 IU
Ergocalciferol	400 IU
Thiamin HCl	2mg
Riboflavin	2mg
Pyridoxin HCl	2mg
Cyanocobalamin	5mcg
Vitamin C	70mg
Niacinamid	20mg
Acid folic	100mg
Calci pantothenat	10mg
Tocopherol acetat	15mg

Chỉ định : Bổ xung vitamin cho cơ thể.

Liều dùng : Người lớn, ngày dùng 1 viên.

Vitarnin (Thụy Sĩ)

Viên sủi bọt polyvitamin và muối khoáng.

Vitarutin

Dạng thuốc : Lọ 15ml nhỏ mắt có :

• Rutin	300mg
Nicotinamid	75mg

Tác dụng : Cân bằng hệ mao mạch.

Chỉ định : Rối loạn sức đề kháng mao mạch kết mạc.

Liều dùng : Nhỏ 4-6 lần/ngày.

Vitasol (XNDP Dược Hậu Giang)

Dạng thuốc : Thuốc giọt- Lọ 20ml

Vitamin B ₁	20mg
------------------------	------

Vitamin B ₂	4mg
Vitamin B ₆	20mg
Calci gluconat	200mg

Chỉ định : Phòng ngừa thiếu vitamin, calci - Suy nhược cơ thể.

Liều dùng : Người lớn : 1 thìa cà phê /ngày.
Trẻ em 20 - 30 giọt x 2-3 lần/ngày.

Vitaton (Australia)

Dạng thuốc : Viên nang chứa nhân sâm, seleni và các vitamin E, B₁, B₂, B₆, PP và C.

Chỉ định : Điều trị chứng suy nhược chức năng.

Liều dùng : Người lớn ngày 1-2 viên.

Vitazym (Indonesia)

Dạng thuốc : Viên bọc đường chứa :

Pancreatin	50mg
Papain	10mg
Mật bò	50mg
Bột Nghệ	35mg
Bột cao gan khô	50mg
Vitamin B ₁	3mg
Vitamin B ₂	5mg
Vitamin B ₆	25mg
Vitamin B ₁₂	2,5mcg
Vitamin C	10mg
Calci pantothenat	1,5mg
Niacinamid	10mg
Sắt II sulfat	10mg
Mg sulfat	5mg
Calci carbonat	20mg
Đồng sulfat	300mcg
Zn sulfat	500mcg
Kali iodid	430mg
Natri photphat	10mg

Tác dụng : Phối hợp men tiêu hóa, vitamin và muối khoáng, để tăng cường chức năng tiêu hóa đồng thời tạo môi trường tối ưu cho chuyển hóa tế bào.

Chỉ định : Các rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, buồn nôn, chậm tiêu, rối loạn gan mật, kích thích ăn ngon và phát triển ở cơ thể trẻ em.

Liều dùng : Ngày 3 lần, sau bữa ăn, mỗi lần : trẻ em 1 viên, người lớn 1-2 viên.

Vitron (Mepha - Thụy Sĩ)

Dạng thuốc : Viên nang ("Suscap") chứa :

Vitamin A	3333UI
Vitamin D ₂	1000UI
Vitamin B ₁	5mg