SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
CỤM CÁC TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ SỐ 1
NGÔ SĨ LIÊN - TIÊN DU SỐ 1

(Đề thi có 03 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 0312**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chất X ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị và không tan trong nước. Thủy phân hoàn toàn chất X, thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên được gọi là đường nho. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. Cellulose và glucose. **B.** Cellulose và fructose.
C. Tinh bột và glucose. **D.** Saccharose và fructose.

Câu 2. Cho CH_3COOCH_3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

A. CH_3OH và CH_3COOH. **B.** CH_3COOH và CH_3ONa.
C. CH_3COONa và CH_3COOH. **D.** CH_3COONa và CH_3OH.

Câu 3. Kết luận nào dưới đây đúng?

A. Saccharose là chất rắn kết tinh màu trắng, vị ngọt, ít tan trong nước nóng.
B. Cellulose là chất rắn hình sợi, màu trắng, không tan trong nước.
C. Glucose là chất rắn, không màu, không tan trong nước.
D. Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, tan trong nước lạnh.

Câu 4. Carbohydrate chỉ chứa hai đơn vị glucose trong phân tử là

A. saccharose **B.** tinh bột. **C.** maltose. **D.** cellulose.

Câu 5. Ester nào sau đây được tạo thành từ carboxylic acid và alcohol tương ứng?

A. $CH_3COOC(CH_3)=CH_2$. **B.** $HCOOC_2H_5$. **C.** $HCOOCH=CH_2$. **D.** $CH_3COOCH=CH_2$.

Câu 6. Thủy phân hoàn toàn một triglyceride X thì thu được glycerol, sodium oleate và sodium palmitate (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2). Công thức phân tử của X là

A. $C_{53}H_{102}O_6$. **B.** $C_{57}H_{104}O_6$. **C.** $C_{55}H_{106}O_6$. **D.** $C_{53}H_{100}O_6$.

Câu 7. Amine có công thức CH_3NH_2 có tên thay thế và tên gốc – chức lần lượt là

A. methanamine và ethylamine. **B.** methylamine và methanamine.
C. ethanamine và methylamine. **D.** methanamine và methylamine.

Câu 8. Từ tinh bột, điều chế ethyl alcohol theo sơ đồ sau: Tinh bột → glucose → C_2H_5OH. Biết hiệu suất của 2 quá trình lần lượt là 80% và 75%. Để điều chế được 200 lít rượu 34,5^o (khối lượng riêng của C_2H_5OH bằng 0,8 gam/mL) thì cần dùng m kg gạo chứa 90% tinh bột. Giá trị của m là

A. 90,0. **B.** 180,0. **C.** 135,0. **D.** 232,5.

Câu 9. Khi xà phòng hóa tripalmitin ta thu được sản phẩm là

A. $C_{15}H_{31}COONa$ và ethanol. **B.** $C_{17}H_{35}COOH$ và glycerol.
C. $C_{15}H_{31}COONa$ và glycerol. **D.** $C_{17}H_{35}COONa$ và glycerol.

Câu 10. Cho dãy các chất sau: (a) $CH_3OOC\text{-}CH_2\text{-}COOC_6H_5$; (b) $CH_3COO\text{-}CH_2\text{-}COO\text{-}CH_3$; (c) $HO\text{-}CH_2\text{-}COO\text{-}CH_3$; (d) $HOOC\text{-}CH_2\text{-}COO\text{-}CH_3$; (e) $CH_3COOCH_2C_6H_5$; (f) $HCOOC_6H_5$. Với gốc C_6H_5- là gốc phenyl. Số chất trong dãy tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 là

A. 6. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 11. Saccharose hoà tan $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo thành

A. Phức $Cu(C_{12}H_{21}O_{11})_2$ màu xanh tím.
B. Phức $Cu(C_{12}H_{21}O_{11})_2$ màu xanh lam thẫm.
C. Phức $Cu(C_{12}H_{22}O_{11})_2$ màu xanh lam thẫm.
D. Phức $Cu(C_{12}H_{21}O_{11})_2$ màu đỏ gạch.

Câu 12. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 mL ethyl acetate.
- **Bước 2:** Thêm 2 mL dung dịch H_2SO_4 20% vào ống thứ nhất; 4 mL dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.
- **Bước 3:** Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.

Cho các phát biểu sau:
(1) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.
(2) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.
(3) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được các sản phẩm giống nhau.
(4) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).
(5) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm.
Số phát biểu đúng là
A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 13. Cho vào ống nghiệm 3 - 4 giọt dung dịch $CuSO_4$ 2% và 2 - 3 giọt dung dịch NaOH 10%. Tiếp tục nhỏ 2 - 3 giọt dung dịch chất X vào ống nghiệm, đun nhẹ thu được kết tủa đỏ gạch. Chất X **không thể** là
A. saccharose. **B.** acetaldehyde. **C.** fructose. **D.** glucose.

Câu 14. Ester no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là
A. $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 1$). **B.** $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$).
C. $C_nH_{2n-2}O_2$ ($n \geq 2$). **D.** $C_nH_{2n+2}O_2$ ($n \geq 2$).

Câu 15. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Chất	Thuốc thử	Hiện tượng
T	Quỳ tím	Quỳ tím chuyển màu xanh
Y	Dung dịch $[Ag(NH_3)_2]OH$	Kết tủa Ag trắng sáng
X, Y, T	$Cu(OH)_2$	Dung dịch xanh lam
Z	Nước bromine	Kết tủa trắng

X, Y, Z, T lần lượt là
A. Saccharose, aniline, glucose, ethylamine.
B. Aniline, ethylamine, saccharose, glucose.
C. Ethylamine, glucose, saccharose, aniline.
D. Saccharose, glucose, aniline, ethylamine.

Câu 16. Benzyl acetate có mùi thơm của loại hoa nhài. Công thức cấu tạo của benzyl acetate là
A. $C_6H_5COOCH_3$. **B.** $CH_3COOCH_2C_6H_5$.
C. $CH_3COOC_6H_4CH_3$. **D.** $CH_3COOC_6H_5$.

Câu 17. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn?
A. Tristearin. **B.** Methyl formate. **C.** Triolein. **D.** Ethyl acetate.

Câu 18. Trong công nghiệp thực phẩm, để tạo hương dứa cho bánh kẹo người ta dùng ester X có công thức cấu tạo $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$.Tên gọi của X là
A. ethyl propionate. **B.** propyl acetate.
C. methyl propionate. **D.** methyl acetate.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho phản ứng ester hóa sau từ carboxylic acid X và alcohol Y:

$$X + Y \underset{}{\overset{H_2SO_4\ đặc,\ t^o}{\rightleftharpoons}} C_2H_5OCOCH_3 + H_2O$$

a) Chất X có tên thay thế là acetic acid.
b) Từ một phản ứng hóa học, có thể điều chế chất X từ chất Y.
c) Chất Y có tên gốc - chức là ethanol.
d) Ester $C_2H_5OCOCH_3$ có tên là ethyl acetate.

Câu 2. Cho hai chất X và Y có công thức khung phân tử như sau:




X Y

a) Ở điều kiện thường, X tồn tại ở trạng thái khí, Y tồn tại ở trạng thái lỏng và đều tan tốt trong nước.
b) Khử amine X bằng nitrous acid ở nhiệt độ thường tạo thành ethanol và giải phóng khí nitrogen.
c) Cho Y tác dụng với nước bromine 3% (khối lượng riêng là 1,3 $g.mL^{-1}$). Thể tích nước bromine tối thiểu cần để điều chế 33 gam 2,4,6-tribromoanilin là 1,23 lit
d) X và Y đều là amine bậc một, có tên thay thế lần lượt là ethylamine (alkylamine) và aniline (arylamine).

Câu 3. Methyl cinnamate là một ester có công thức cấu tạo dưới đây và có mùi thơm của dâu tây (strawberry) được sử dụng trong ngành công nghiệp hương liệu và nước hoa. Để điều chế 16,2 gam ester

methyl cinnamate người ta cho 29,6 gam cinnamic acid (C_6H_5CH=CH-COOH) phản ứng với lượng dư methyl alcohol (CH_3OH).



methyl cinnamate

a) Methyl cinnmate có đồng phân hình học.

b) Hiệu suất phản ứng ester hóa theo cinnamic acid trong trường hợp này là 60%.

c) Methyl cinnmate có công thức phân tử là $C_{10}H_{10}O_2$.

d) Methyl cinnmate phản ứng với dung dịch NaOH, khi đun nóng theo tỉ lệ mol 1: 1.

Câu 4. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$$\text{Saccharose} \xrightarrow[H^+,\,t^o]{+H_2O} X \xrightarrow{\text{enzyme}} Y \xrightarrow{\text{men giấm}} Z \xrightarrow[H_2SO_4\ \text{đặc}]{+Y} T$$

a) Có thể dùng chất T để tách chiết như tách caffein khỏi cà phê.

b) Chất Y và Z đều có thể hoà tan $Cu(OH)_2$ trong điều kiện thích hợp.

c) Chất X có thể là glucose hoặc fructose.

d) Thủy phân chất T bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được hai chất có cùng số nguyên tử carbon.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Có 4 lọ mất nhãn (1), (2), (3), (4) chứa các dung dịch: ethanal, glucose, ethanol, saccharose. Biết rằng:

- Dung dịch (1), (2) tác dụng $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường tạo dung dịch xanh thẫm
- Dung dịch (2), (4) tác dụng với $Cu(OH)_2$ đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch.

Xác định thứ tự các chất ethanal, glucose, ethanol, saccharose. *(học sinh ghi các số (1), (2), (3), (4) tương ứng với thứ tự các chất trong câu hỏi)*

Câu 2. Methyl salicylate dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau, được điều chế theo phản ứng sau:

$$\underset{\text{salixylic acid}}{HOC_6H_4COOH} + \underset{\text{methanol}}{CH_3OH} \rightleftharpoons[H_2SO_4,\,t^o] \underset{\text{methyl salixylate}}{HOC_6H_4COOCH_3} + H_2O.$$

Để sản xuất 7,6 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salixylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salixylate và hiệu suất phản ứng tính theo salixylic acid là 80%. Giá trị của m là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn tới hàng phần chục).*

Câu 3. Cho các ester: ethyl formate, vinyl acetate, triolein, methyl acrylate, phenyl acetate. Có bao nhiêu chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra alcohol?

Câu 4. Có bao nhiêu amine cùng công thức phân tử $C_4H_{11}N$ tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thường sinh ra alcohol?

Câu 5. Xà phòng hóa hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH dư, thu được glycerol, sodium linoleate, sodium stearate và sodium palmitate. Phân tử khối của X bằng bao nhiêu amu?

Câu 6. Khi con người sử dụng đồ uống có cồn như rượu, bia, … (có chứa ethanol), dưới tác dụng của hai loại enzyme alcohol dehydrogenase (ADH) và aldehyde dehydrogenase (ALDH) trong gan, có chuyển hóa như sau:

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow{ADH} CH_3CHO \xrightarrow{ALDH} CH_3COOH$$

Thông thường, khi một người sử dụng đồ uống có cồn, có 10% ethanol được thải ra ngoài qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu; 90% ethanol được hấp thụ, chuyển hóa hết thành acetaldehyde (CH_3CHO) tại gan nhờ hệ thống enzyme. Nếu một người uống hai lon bia, mỗi lon dung tích 330 mL và nồng độ cồn của bia là 5% thì khối lượng CH_3CHO sinh ra tại gan là bao nhiêu gam? Biết khối lượng riêng của C_2H_5OH là 0,789 g/mL và nồng độ cồn của bia được tính theo số mL ethanol trong 100 mL bia. *(chỉ làm tròn ở phép tính cuối cùng, kết quả làm tròn đến hàng phần chục).*

------ HẾT ------