

§1

QUY TẮC OCTET

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Trình bày được quy tắc octet với các nguyên tố nhóm A.
- ◇ Vận dụng được quy tắc octet trong quá trình hình thành liên kết hoá học ở các nguyên tố nhóm A.




“Hãy quan sát hai hình ảnh bên:

- 1 Một quả bóng đang lăn từ đỉnh đồi xuống chân đồi (hình a)
- 2 Electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử Natri (Na) (hình b)

Theo em, hai hiện tượng này có điểm gì giống nhau về mặt xu hướng năng lượng (muốn trở về trạng thái năng lượng thấp hơn hay cao hơn)?”



Hình a




Hình b



I. Nội dung bài học

① Liên kết hóa học

⊕ Tìm hiểu sự hình thành liên kết hóa học



Hình 1.1: Sự hình thành liên kết trong phân tử Sodium chloride và Flourine



1. Dựa vào hình 1.1 các em có nhận xét gì về cấu hình e lớp ngoài cùng (số e xung quanh mỗi nguyên tử) của các nguyên tử sau khi tham gia tạo thành liên kết?

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

Theo thuyết cấu tạo hoá học, sự liên kết giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể được giải thích bằng sự giảm năng lượng khi các nguyên tử kết hợp lại với nhau. Khi tạo liên kết hoá học thì nguyên tử có xu hướng đạt tới cấu hình electron bền vững của khí hiếm (2 e hoặc 8 e ở lớp ngoài cùng).





Liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.


② Quy tắc Octet

⊕ Tìm hiểu quy tắc octet (bát tử)



Quy tắc octet (bát tử): Trong quá trình hình thành liên kết hoá học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng có 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron với khí hiếm helium).

⊕ Tìm hiểu cách vận dụng quy tắc Octet trong hình thành phân tử Nitrogen (N_2)



Hình 1.2: Sự hình thành liên kết trong phân tử Nitrogen



Từ hình 1.2, cho biết mỗi nguyên tử nitrogen đã đạt được cấu hình electron bền vững của nguyên tử khí hiếm nào.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....



Nguyên tử của các nguyên tố hydrogen và fluorine có xu hướng cho đi, nhận thêm hay góp chung các electron hoá trị khi tham gia liên kết hình thành phân tử hydrogen fluoride (HF)?

Bài làm:

.....

.....




.....


.....

.....

⊕ Tìm hiểu cách vận dụng quy tắc octet trong sự hình thành ion dương, ion âm



Hình 1.3: Sự tạo thành ion Na^+



Hình 1.4: Sự tạo thành ion F^-

Biết phân tử magnesium oxide hình thành bởi các ion Mg^{2+} và O^{2-} . Vận dụng quy tắc octet, trình bày sự hình thành các ion trên từ những nguyên tử tương ứng.

Bài làm:.....

.....

.....

.....

.....

.....

II. Các dạng bài tập

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Công thức cấu tạo nào sau đây không đủ electron theo quy tắc octet?



Câu 2. Liên kết hoá học là

- A** sự kết hợp của các hạt cơ bản hình thành nguyên tử bền vững
- B** sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn
- C** sự kết hợp của các phân tử hình thành các chất bền vững
- D** sự kết hợp của chất tạo thành vật thể bền vững

Câu 3. Theo quy tắc octet, khi hình thành liên kết hoá học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững giống như

- A** kim loại kiềm gần kề
- B** kim loại kiềm thổ gần kề
- C** nguyên tử halogen gần kề
- D** nguyên tử khí hiếm gần kề

Câu 4. Khi hình thành liên kết hoá học, nguyên tử có số hiệu nào sau đây có xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững theo quy tắc octet?

- A** ($Z = 12$)
- B** ($Z = 9$)
- C** ($Z = 11$)
- D** ($Z = 10$)

Câu 5. Trong công thức CS_2 , tổng số cặp electron lớp ngoài cùng của C và S chưa tham gia liên kết là

- A** 2
- B** 3
- C** 4
- D** 5

Câu 6. Phân tử nào sau đây có các nguyên tử đều đã đạt cấu hình electron bão hoà theo quy tắc octet?

- A** BeH_2
- B** AlCl_3
- C** PCl_5
- D** SiF_4

Câu 7. Quy tắc octet không đúng với trường hợp phân tử chất nào sau đây?

- A** H_2O
- B** NO_2
- C** CO_2
- D** Cl_2

Câu 8. Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau thành phân tử?

- A** Để mỗi nguyên tử trong phân tử đạt được cơ cấu electron ổn định, bền vững
- B** Để mỗi nguyên tử trong phân tử đều đạt 8 electron ở lớp ngoài cùng
- C** Để tổng số electron ngoài cùng của các nguyên tử trong phân tử là 8
- D** Để lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử trong phân tử có nhiều electron độc thân nhất

Câu 9. Nguyên tử nào sau đây có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon khi tham gia hình thành liên kết hoá học?

- A** Chlorine
- B** Sulfur
- C** Oxygen
- D** Hydrogen

Câu 10. Sodium hydride (NaH) là một hợp chất được sử dụng như một chất lưu trữ hydrogen trong các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu do khả năng giải phóng hydrogen của nó. Trong sodium hydride, nguyên tử sodium có cấu hình electron bền của khí hiếm

- A** helium
- B** argon
- C** krypton
- D** neon



Câu 11. Khi tham gia hình thành liên kết hoá học, các nguyên tử lithium và chlorine có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của lần lượt các khí hiếm nào dưới đây?

- A** Helium và argon
- B** Helium và neon
- C** Neon và argon
- D** Argon và helium

Câu 12. Trong phân tử HBr, nguyên tử hydrogen và bromine đã lần lượt đạt cấu hình electron bền của các khí hiếm nào dưới đây?

- A** Neon và argon
- B** Helium và krypton
- C** Helium và radon
- D** Helium và argon

Câu 13. Trong các hợp chất, nguyên tử magnesium đã đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nhất bằng cách

- A** cho đi 2 electron
- B** nhận vào 1 electron
- C** cho đi 3 electron
- D** nhận vào 2 electron

Câu 14. Cho các phân tử sau: Cl_2 , H_2O , NaF và CH_4 . Có bao nhiêu nguyên tử trong các phân tử trên đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon?

- A** 3
- B** 2
- C** 5
- D** 4

Câu 15. Nguyên tử trong phân tử nào dưới đây ngoại lệ với quy tắc octet?

- A** H_2O
- B** NH_3
- C** HCl
- D** BF_3

Câu 16. Nguyên tử oxygen ($Z = 8$) có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu electron để đạt lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet? Chọn phương án đúng.

- A** Nhường 6 electron
- B** Nhận 2 electron
- C** Nhường 8 electron
- D** Nhận 6 electron

Câu 17. Nguyên tử lithium ($Z = 3$) có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu electron để lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet? Chọn phương án đúng.

- A** Nhường 1 electron
- B** Nhận 7 electron
- C** Nhường 11 electron
- D** Nhận 1 electron

Câu 18. Nguyên tử nào sau đây có thể nhường hoặc nhận 4 electron để đạt cấu hình electron bền vững?

- A** Silicon
- B** Beryllium
- C** Nitrogen
- D** Selenium

Câu 19. Nguyên tử nào sau đây không có xu hướng nhường hoặc nhận electron để đạt được lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet?

- A** Nitrogen
- B** Oxygen
- C** Sodium
- D** Hydrogen

Câu 20. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây không có xu hướng nhường electron để đạt lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet?




A Calcium

B Magnesium

C Potassium

D Chlorine

Câu 21. Mô hình mô tả quá trình tạo liên kết hoá học sau đây phù hợp với xu hướng tạo liên kết hoá học của nguyên tử nào?




A Aluminium

B Nitrogen

C Phosphorus

D Oxygen

Câu 22. Nguyên tử có mô hình cấu tạo sau đây có xu hướng nhường hoặc nhận electron như thế nào khi hình thành liên kết hoá học?




A Nhận 1 electron

B Nhường 1 electron

C Nhận 7 electron

D Không có xu hướng nhường hoặc nhận electron

Câu 23. Nguyên tử có mô hình cấu tạo sau sẽ có xu hướng tạo thành ion mang điện tích nào khi nó thỏa mãn quy tắc octet?



A 3+

B 5+

C 3-

D 5-

Câu 24. Phân tử nào sau đây KHÔNG tuân theo quy tắc octet?

A H₂O

B CO₂

C BH₃

D CH₄

Câu 25. Nguyên tử F (Z=9) khi nhận thêm 1 electron sẽ có cấu hình electron giống với:

A O²⁻

B Na⁺

C Ne

D He

Câu 26. Để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm, nguyên tử Al (Z=13) có xu hướng:

- A** Nhận 3 electron
- B** Nhường 3 electron
- C** Góp chung 3 electron
- D** Không tham gia liên kết

Câu 27. Trong ion F^- , số electron ở lớp ngoài cùng là:

- A** 7 electron
- B** 8 electron
- C** 9 electron
- D** 10 electron

Câu 28. Những nguyên tử nào sau đây có xu hướng nhường electron?

- A** Na, K, Ca
- B** F, Cl, Br
- C** N, P, As
- D** O, S, Se

Câu 29. Trong phân tử O_2 , số cặp electron dùng chung là:

- A** 1 cặp
- B** 2 cặp
- C** 3 cặp
- D** 4 cặp

Câu 30. Khi tham gia liên kết hóa học, nguyên tử H có xu hướng:

- A** Nhường electron
- B** Nhận electron
- C** Góp chung electron
- D** Không tham gia liên kết

Câu 31. Trong các phân tử sau, phân tử nào tuân theo quy tắc octet?

- A** PCl_5
- B** SF_6
- C** H_2O
- D** NO

Câu 32. Ion Na^+ có cấu hình electron giống với khí hiếm nào?

- A** He
- B** Ne
- C** Ar
- D** Kr

Câu 33. Nguyên tử của nguyên tố nhóm VIIA (17) có xu hướng:

- A** Nhường 7 electron
- B** Nhận 1 electron
- C** Góp chung 7 electron
- D** Không tham gia liên kết

Câu 34. Trong phân tử CH_4 , nguyên tử C:

- A** Nhường 4 electron
- B** Nhận 4 electron
- C** Góp chung 4 electron
- D** Không tham gia liên kết

Câu 35. Quy tắc octet không áp dụng cho:

- A** Các nguyên tố nhóm A
- B** Các nguyên tố khí hiếm
- C** Các nguyên tố phi kim
- D** Các nguyên tố nhóm B

Câu 36. Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau thành phân tử?

- A** Để mỗi nguyên tử trong phân tử đạt được cơ cấu electron ổn định, bền vững
- B** Để mỗi nguyên tử trong phân tử đều đạt 8 electron ở lớp ngoài cùng
- C** Để tổng số electron ngoài cùng của các nguyên tử trong phân tử là 8
- D** Để lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử trong phân tử có nhiều electron độc thân nhất

Câu 37. Nguyên tử nào sau đây có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon khi tham gia hình thành liên kết hoá học?

- A** Chlorine
- B** Sulfur
- C** Oxygen
- D** Hydrogen



Câu 38. Sodium hydride (NaH) là một hợp chất được sử dụng như một chất lưu trữ hydrogen trong các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu do khả năng giải phóng hydrogen của nó. Trong sodium hydride, nguyên tử sodium có cấu hình electron bền của khí hiếm

- A** helium **B** argon **C** krypton **D** neon

Câu 39. Khi tham gia hình thành liên kết hoá học, các nguyên tử lithium và chlorine có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của lần lượt các khí hiếm nào dưới đây?

- A** Helium và argon **B** Helium và neon
C Neon và argon **D** Argon và helium

Câu 40. Trong phân tử HBr, nguyên tử hydrogen và bromine đã lần lượt đạt cấu hình electron bền của các khí hiếm nào dưới đây?

- A** Neon và argon **B** Helium và xenon
C Helium và radon **D** Helium và krypton

Câu 41. Trong các hợp chất, nguyên tử magnesium đã đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nhất bằng cách

- A** cho đi 2 electron **B** nhận vào 1 electron
C cho đi 3 electron **D** nhận vào 2 electron

Câu 42. Cho các phân tử sau: Cl_2 , H_2O , NaF và CH_4 . Có bao nhiêu nguyên tử trong các phân tử trên đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon?

- A** 3 **B** 2 **C** 5 **D** 4

Câu 43. Nguyên tử trong phân tử nào dưới đây ngoại lệ với quy tắc octet?

- A** H_2O **B** NH_3 **C** HCl **D** BF_3

Câu 44. Theo quy tắc octet, xu hướng chung của các nguyên tử nguyên tố nhóm IA là nhường

- A** 2 electron **B** 3 electron **C** 1 electron **D** 4 electron

Câu 45. Để thỏa mãn quy tắc octet, nguyên tử chlorine ($Z = 17$) có xu hướng

- A** nhường 1 electron **B** nhận 1 electron
C nhường 3 electron **D** nhận 3 electron

Câu 46. Khi hình thành liên kết hóa học, nguyên tử có số hiệu nào sau đây có xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững theo quy tắc octet?

- A** $Z = 11$ **B** $Z = 9$ **C** $Z = 12$ **D** $Z = 10$

Câu 47. Theo quy tắc octet nguyên tử nào sau đây nhận 1 electron để đạt cấu trúc ion bền?

- A** X ($Z = 8$) **B** Y ($Z = 9$) **C** T ($Z = 11$) **D** Q ($Z = 12$)

Câu 48. Quy tắc octet **không đúng** với trường hợp phân tử chất nào sau đây?

- A** H_2O **B** NO_2 **C** CO_2 **D** Cl_2

Câu 49. Phân tử nào dưới đây các nguyên tử liên kết **không** tuân theo quy tắc octet?

- A** H_2O **B** NH_3 **C** CH_4 **D** NO

Câu 50. Quy tắc octet không đúng với phân tử nào sau đây?

- A** H_2O **B** NH_3 **C** CO_2 **D** PCl_5

B. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 51. Xét các phát biểu về quy tắc octet:

- a) Nguyên tử các nguyên tố có xu hướng nhận hoặc nhường electron để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất
- b) Quy tắc octet chỉ áp dụng cho các nguyên tố phi kim
- c) Các nguyên tử có thể đạt được cấu hình octet bằng cách chia sẻ các electron hóa trị
- d) Trong phân tử, các nguyên tử thường có xu hướng đạt được 8 electron ở lớp ngoài cùng

Câu 52. Về quy tắc bát tử :

- a) Các nguyên tử trong phân tử thường đạt 8 electron lớp ngoài cùng
- b) Tất cả các nguyên tố chu kỳ 2 đều tuân theo quy tắc bát tử
- c) Cấu hình electron của khí hiếm là cấu hình bền vững
- d) Nguyên tử Li có 8 electron ở lớp vỏ ngoài cùng

Câu 53. Về các trường hợp đặc biệt:

- a) Hidro chỉ cần 1 electron để đạt cấu hình bền của Heli
- b) Các nguyên tử có thể đạt được octet bằng cách nhận, nhường hoặc dùng chung electron
- c) Mọi nguyên tử đều phải đạt đủ 8 electron để tạo thành phân tử bền
- d) Một số nguyên tử có thể bền với ít hơn 8 electron ở lớp ngoài cùng

Câu 54. Về mối liên hệ với bảng tuần hoàn:

- a) Số electron tối đa ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong một chu kỳ luôn bằng số thứ tự của nhóm A
- b) Tất cả các nguyên tố họ p đều tuân theo quy tắc bát tử
- c) Các electron lớp ngoài cùng quyết định khả năng tham gia phản ứng của nguyên tử
- d) Các nguyên tố nhóm A có số electron hóa trị bằng số thứ tự nhóm

Câu 55. Về năng lượng và cấu hình electron

- a) Cấu hình electron của khí hiếm có năng lượng thấp nhất trong cùng chu kỳ
- b) Sự bền vững của cấu hình bát tử liên quan đến năng lượng ion hóa cao
- c) Các nguyên tử luôn đạt được cấu hình bát tử bằng cách nhận thêm electron
- d) Độ bền của cấu hình bát tử liên quan đến sự đối xứng của các orbital

Câu 56. Về quan hệ giữa cấu trúc electron và quy tắc bát tử

- a) Orbital p chỉ chứa tối đa 6 electron nên cần thêm 2 electron từ orbital s để đạt cấu hình bát tử
- b) Mọi nguyên tử đều cần đủ 8 electron để tạo thành phân tử bền



- c) Cấu hình bát tử liên quan đến sự lấp đầy hoàn toàn các orbital s và p
- d) Độ bền của cấu hình bát tử liên quan đến sự đối xứng của các orbital s và p

Câu 57. Cho các phát biểu sau về quy tắc octet:

- a) Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố nhóm A có xu hướng đạt cấu hình 8 electron lớp ngoài cùng khi hình thành liên kết hóa học.
- b) Nguyên tử của nguyên tố nhóm B luôn có xu hướng đạt cấu hình 8 electron lớp ngoài cùng.
- c) Quy tắc octet áp dụng cho tất cả các nguyên tố.
- d) Nguyên tử H có xu hướng đạt 8 electron lớp ngoài cùng khi tham gia liên kết hóa học.

Câu 58. Cho các nhận định sau về việc áp dụng quy tắc octet:

- a) Quy tắc octet không phải lúc nào cũng đúng với mọi hợp chất.
- b) Có thể dựa vào quy tắc octet để dự đoán công thức của một số hợp chất.
- c) Quy tắc octet chỉ áp dụng cho hợp chất ion.
- d) Quy tắc octet có thể áp dụng cho cả hợp chất cộng hóa trị.

Câu 59. Cho các phát biểu sau về phân tử BF_3 :

- a) BF_3 không tuân theo quy tắc octet.
- b) B trong BF_3 đạt cấu hình bền của khí hiếm He.
- c) Mỗi nguyên tử F trong BF_3 đạt cấu hình bền của Ne.
- d) BF_3 là phân tử bền vững.

Câu 60. Cho các phát biểu sau về phân tử N_2 :

- a) Mỗi nguyên tử N có 8 electron lớp ngoài cùng.
- b) N_2 có liên kết đôi.
- c) N_2 không tuân theo quy tắc octet.
- d) Mỗi nguyên tử N góp 3 electron tạo liên kết.

Câu 61. Cho các phát biểu sau về ion Mg^{2+} :

- a) Có cấu hình electron giống khí hiếm Ne.
- b) Có 12 electron.
- c) Mg có xu hướng nhận 2 electron để tạo thành Mg^{2+} .
- d) Mg thuộc nhóm IIA.

Câu 62. Cho các phát biểu sau về CCl_4 :

- a) CCl_4 tuân theo quy tắc octet.
- b) Mỗi nguyên tử Cl đạt cấu hình 8e lớp ngoài cùng.
- c) C trung tâm đạt cấu hình 8e lớp ngoài cùng.
- d) CCl_4 có 3 liên kết cộng hóa trị.

Câu 63. Cho các phát biểu sau về SF_6 :

- a) SF_6 tuân theo quy tắc octet.
- b) S có 8 electron lớp ngoài cùng.
- c) Mỗi F có 8 electron lớp ngoài cùng.



d) SF_6 có 6 liên kết cộng hóa trị.

Câu 64. Cho các nhận định liên quan đến quy tắc octet

- a) Quy tắc Octet nói rằng các nguyên tử có xu hướng nhận, nhường hoặc góp chung electron để đạt được 8 electron ở lớp ngoài cùng. (trừ Helium)
- b) Quy tắc Octet áp dụng cho tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
- c) Các nguyên tố nhóm A luôn tuân theo quy tắc octet khi tạo liên kết hóa học
- d) Quy tắc Octet không thể giải thích được cấu hình của các phân tử thuộc nhóm B

Câu 65. Về ion

- a) Khi sodium (Na) mất 1 electron, nó trở thành ion Na^+
- b) Khi fluorine nhận thêm 1 electron, nó trở thành ion F^-
- c) Nguyên tử helium (He) tuân theo quy tắc Octet
- d) Nguyên tử nitrogen trong phân tử N_2 tuân theo quy tắc Octet

Câu 66. Phân tích đặc điểm các nguyên tử, phân tử **không** theo quy tắc octet

- a) Nguyên tử fluorine có cấu hình electron bền vững sau khi nhận thêm 1 electron
- b) Phân tử SF_6 tuân theo quy tắc Octet
- c) Phân tử nitrogen (N_2) được tạo thành bởi 3 cặp electron chung
- d) Nguyên tử oxygen trong phân tử O_2 có 2 cặp electron chưa liên kết

Câu 67. Khi hình thành liên kết hoá học trong phân tử CCl_4 :

- a) Mỗi nguyên tử chlorine đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng
- b) Mỗi nguyên tử chlorine cần góp chung thêm 1 electron để đạt cấu hình bền vững
- c) Nguyên tử carbon có 4 electron hóa trị, nên nguyên tử carbon sẽ góp chung với mỗi nguyên tử chlorine 1 electron
- d) Nguyên tử carbon và chlorine sau khi góp chung electron đều sẽ đạt cấu hình bền vững của khí hiếm neon

C. Bài tập tự luận

Bài 1. Hãy ghép mỗi nguyên tử ở cột A với nội dung được mô tả ở cột B cho phù hợp.

Cột A

- a) $\text{Ne}(Z = 10)$
- b) $\text{F}(Z = 9)$
- c) $\text{Mg}(Z = 12)$
- d) $\text{He}(Z = 2)$

Cột B

- 1. có xu hướng nhận thêm 1 electron.
- 2. có cấu hình lớp vỏ ngoài cùng 8 electron bền vững.
- 3. có xu hướng nhường đi 2 electron.
- 4. có cấu hình lớp vỏ ngoài cùng 2 electron bền vững.

Bài 2. Em hãy vẽ mô hình mô tả quá trình tạo lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet trong các trường hợp sau đây:

- a) Nguyên tử $\text{O}(Z = 8)$ nhận 2 electron để tạo anion O^{2-} .
- b) Nguyên tử $\text{Ca}(Z = 20)$ nhường 2 electron để tạo cation Ca^{2+} .



c) Hai nguyên tử fluorine "góp chung electron" để đạt được lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet.

Bài 3. Trong tự nhiên, các khí hiếm tồn tại dưới dạng nguyên tử tự do. Các nguyên tử của khí hiếm không liên kết với nhau tạo thành phân tử và rất khó liên kết với các nguyên tử của các nguyên tố khác. Ngược lại nguyên tử các nguyên tố khác lại liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể. Giải thích

Bài 4. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử potassium (kali) là $4s^1$, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử bromine là $4s^2 4p^5$. Làm thế nào các nguyên tử potassium và bromine có được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm theo quy tắc octet

Bài 5. Khi hình thành liên kết $H + Cl \rightarrow HCl$ và khi phá vỡ liên kết $HCl \rightarrow H + Cl$ thì hệ thu năng lượng hay tỏa năng lượng. Năng lượng phân tử HCl lớn hơn hay nhỏ hơn năng lượng hệ hai nguyên tử H và Cl riêng rẽ? Trong hai hệ đó thì hệ nào bền hơn?

Bài 6. Trong phân tử Na_2S , cấu hình electron của các nguyên tử có tuân theo quy tắc octet không?

Bài 7. Vận dụng quy tắc octet để giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử: O_2 , CO_2 , $CaCl_2$, KBr

Bài 8. Đá vôi (thành phần chính là $CaCO_3$) được dùng để sản xuất vôi, trong lĩnh vực xây dựng, ... Barium nitrate $Ba(NO_3)_2$ có trong thành phần của kính quang học, gốm, men, ... Phèn đơn aluminium sulfate (thành phần chính là $Al_2(SO_4)_3$) được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, trong công nghệ sản xuất giấy, công nghệ nhuộm vải và công nghệ lọc nước và nuôi trồng thủy sản, ... Dựa vào quy tắc octet, đề xuất công thức cấu tạo của các chất trên

Bài 9. Hợp chất X tạo bởi hai nguyên tố A, D có khối lượng phân tử là 76. X là dung môi không phân cực, thường được sử dụng làm nguyên liệu trong tổng hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vải viscoza mềm. A có công thức hydride dạng AH_4 và D có công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất dạng DO_3 .

- 1 Hãy thiết lập công thức phân tử của X. Biết rằng A có số oxi hoá cao nhất trong X.
- 2 Đề xuất công thức cấu tạo của X và cho biết các nguyên tử thành phần của X khi liên kết có đủ electron theo quy tắc octet không?

Bài 10. Em hãy nêu tên và công thức hoá học của 1 chất ở thể rắn, 1 chất ở thể lỏng và 1 chất ở thể khí (trong điều kiện thường), trong đó nguyên tử oxygen đạt được cấu hình bền của khí hiếm neon.

Bài 11. Potassium iodide (KI) được sử dụng như một loại thuốc long đờm, giúp làm lỏng và phá vỡ chất nhầy trong đường thở, thường dùng cho các bệnh nhân hen suyễn, viêm phế quản mãn tính. Trong trường hợp bị nhiễm phóng xạ, KI còn giúp ngăn tuyến giáp hấp thụ iodine phóng xạ, bảo vệ và giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp. Trong phân tử KI, các nguyên tử K và I đều đã đạt được cơ cấu bền của khí hiếm gần nhất. Đó lần lượt là những khí hiếm nào?

Bài 12. Em hãy nêu tên và công thức hoá học của 1 chất ở thể rắn, 1 chất ở thể lỏng và 1 chất ở thể khí (trong điều kiện thường), trong đó nguyên tử oxygen đạt được cấu hình bền của khí hiếm neon.

Bài 13. Potassium iodide (KI) được sử dụng như một loại thuốc long đờm, giúp làm lỏng và phá vỡ chất nhầy trong đường thở, thường dùng cho các bệnh nhân hen suyễn, viêm phế quản mãn tính. Trong trường hợp bị nhiễm phóng xạ, KI còn giúp ngăn tuyến giáp hấp thụ iodine phóng xạ, bảo vệ và giảm nguy cơ ung

thư tuyến giáp. Trong phân tử KI, các nguyên tử K và I đều đã đạt được cơ cấu bền của khí hiếm gần nhất. Đó lần lượt là những khí hiếm nào?

Bài 14. Biểu diễn công thức electron, công thức Lewis và CTCT của các phân tử sau: H_2O ; NH_3 ; CH_4 ; CO_2 ; CCl_4 ; H_2S ; CS_2 ; N_2 ; O_2 ; HCl ; BF_3 ; PCl_5 ; SF_6 ; BCl_3 ; AlCl_3 ; PF_5 ; HF ; H_2CO ; HNO_3 ; SO_2 ; CO ; NO_2 ; NO ; CH_4 ; C_2H_4 ; C_2H_2 ,



Học xong bài này, em có thể:


- ◇ Trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ion (nêu một số ví dụ điển hình tuân theo quy tắc octet).
- ◇ Nêu được cấu tạo tinh thể NaCl. Giải thích được vì sao các hợp chất ion thường ở trạng thái rắn trong điều kiện thường (dạng tinh thể ion).
- ◇ Lắp được mô hình tinh thể NaCl (theo mô hình có sẵn).



Hợp chất NaCl nóng chảy ở nhiệt độ cao và có khả năng dẫn điện khi nóng chảy hoặc khi hoà tan trong dung dịch. Yếu tố nào trong phân tử NaCl gây ra các tính chất trên?

I. Nội dung bài học

1 Sự tạo thành ion



Hình 2.1: Minh họa quá trình hình thành ion



- ◇ Khi **cho electron**, nguyên tử trở thành **ion dương** (cation).
- ◇ Khi **nhận electron**, nguyên tử trở thành **ion âm** (anion).
- ◇ Giá trị điện tích trên cation hoặc anion bằng số electron mà nguyên tử đã nhường hoặc nhận.



1. Quan sát Hình 2.1, nhận xét số electron trên lớp vỏ với số proton trong hạt nhân của mỗi ion tạo thành.
2. Trình bày cách tính điện tích của các ion thu được khi nguyên tử nhường hoặc nhận thêm electron






trong Hình 2.1.

3. Ion Na^+ và ion O^{2-} thu được có bền vững về mặt hoá học không? Chúng có cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nào?

Bài làm:

② Sự tạo thành liên kết ion



Hình 2.2: Minh họa quá trình hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl



- ◇ Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
- ◇ Liên kết ion thường được hình thành khi kim loại điển hình tác dụng với phi kim điển hình.



4. Cho các ion: Na^+ , Mg^{2+} , O^{2-} , Cl^- . Những ion nào có thể kết hợp với nhau tạo thành liên kết ion?

5. Mô tả sự tạo thành liên kết ion trong:

- a) Calcium oxide.
- b) Magnesium chloride.

Bài làm:




③ Tinh thể ion

★ Cấu trúc tinh thể ion

Các ion được sắp xếp theo một trật tự nhất định trong không gian theo kiểu mạng lưới, trong đó ở các nút của mạng lưới là những ion dương và ion âm được sắp xếp luân phiên, liên kết chặt chẽ với nhau do sự cân bằng giữa lực hút (các ion trái dấu hút nhau) và lực đẩy (các ion cùng dấu đẩy nhau), tạo thành mạng tinh thể ion.



a) Tinh thể NaCl thực tế



b) Ô mạng tinh thể NaCl

Hình 2.3: Tinh thể NaCl thực tế và mô hình ô mạng tinh thể NaCl

★ Độ bền và tính chất hợp chất ion



- ◇ Trong tinh thể ion, giữa các ion có lực hút tĩnh điện rất mạnh nên các hợp chất ion thường là chất rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi ở điều kiện thường.
- ◇ Do lực hút tĩnh điện rất mạnh giữa các ion nên các tinh thể ion khá rắn chắc, nhưng khá giòn.



6. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- a) Vì sao muối ăn có nhiệt độ nóng chảy cao (801°C) ?
- b) Hợp chất ion dẫn điện trong trường hợp nào? Vì sao?

Bài làm:



II. Bài tập

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng

- A** một hay nhiều cặp electron dùng chung
- B** một hay nhiều cặp electron dùng chung chỉ do một nguyên tử đóng góp
- C** lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu
- D** một hay nhiều cặp electron dùng chung và các cặp electron này lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn

Câu 2. Liên kết ion là loại liên kết hoá học được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa các phân tử nào sau đây?

- A** cation và anion
- B** các anion
- C** cation và electron tự do
- D** electron và hạt nhân nguyên tử

Câu 3. Biểu diễn sự tạo thành ion nào sau đây đúng?

- A** $\text{Na} + 1e \rightarrow \text{Na}^+$
- B** $\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}^- + 2e$
- C** $\text{O}_2 + 2e \rightarrow 2\text{O}^{2-}$
- D** $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3e$

Câu 4. Số electron và số proton trong ion NH_4^+ là

- A** 11 electron và 11 proton
- B** 10 electron và 11 proton
- C** 11 electron và 10 proton
- D** 11 electron và 12 proton

Câu 5. Cặp nguyên tử nào sau đây không tạo hợp chất dạng X_2^+Y_2^- hoặc $\text{X}^{2+}\text{Y}_2^-$?

- A** Na và O
- B** K và S
- C** Ca và O
- D** Ca và Cl

Câu 6. Tính chất nào sau đây là tính chất của hợp chất ion?

- A** Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp
- B** Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao
- C** Hợp chất ion dễ hoá lỏng
- D** Hợp chất ion có nhiệt độ sôi không xác định.

Câu 7. Cho các phân tử sau: HCl , NaCl , CaCl_2 , AlCl_3 . Phân tử có liên kết mang nhiều tính chất ion nhất là



A HCl

B NaCl

C CaCl₂

D AlCl₃

Câu 8. Dãy gồm các phân tử đều có liên kết ion là

A Cl₂, Br₂, I₂, HCl

B HCl, H₂ S, NaCl, N₂O

C Na₂O, KCl, BaCl₂, Al₂O₃

D MgO, H₂SO₄, H₃PO₄, HCl

Câu 9. Liên kết ion là liên kết được tạo thành bằng

A lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do với ion dương kim loại

B cặp electron chung giữa hai nguyên tử

C lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu

D cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp

Câu 10. Ion dương được hình thành khi nguyên tử

A nhường electron

B nhận electron

C nhường proton

D nhận proton

Câu 11. Khi hình thành liên kết hóa học, nguyên tử Na ($Z = 11$) có xu hướng nhường electron tạo thành ion

A Na⁺

B Na²⁺

C Na⁻

D Na²⁻

Câu 12. Phân tử nào sau đây có liên kết ion?

A NH₃

B H₂ S

C HCl

D NaBr

Câu 13. Liên kết trong phân tử nào sau đây là liên kết ion?

A CaO

B NH₃

C Cl₂O₅

D Br₂O₇

Câu 14. Biết potassium có $Z = 19$, trong phân tử K₂O, mỗi ion K⁺ có số electron là

A 18

B 19

C 20

D 10

Câu 15. Ion nào sau đây thuộc loại ion đa nguyên tử?

A NH₄⁺

B Na⁺

C Ca²⁺

D Cl⁻

Câu 16. Phân tử nào sau đây có chứa ion đa nguyên tử?

A K₂ S

B NH₄Cl

C AlBr₃

D ZnO

Câu 17. Oxide của nguyên tố nào sau đây có liên kết ion?

A Nitrogen

B Carbon

C Sulfur

D Calcium

Câu 18. Phân tử nào dưới đây chỉ chứa ion đơn nguyên tử?

A K₂SO₄

B NH₄Cl

C NaCl

D Zn(NO₃)₂

Câu 19. Hợp chất nào sau đây có liên kết ion?

A H₂ S





B H₂O

C MgCl₂

D CO₂

Câu 20. Quá trình tạo thành ion nào sau đây được viết đúng?





Câu 21. Ion nào sau đây là ion đa nguyên tử?



Câu 22. Sodium chloride là một hợp chất có thể tan trong nước lạnh và có nhiệt độ nóng chảy cao. Liên kết trong phân tử sodium chloride là liên kết

A cộng hóa trị không phân cực

B liên kết ion

C hydrogen

D cộng hóa trị phân cực

Câu 23. Tính chất nào sau đây không đúng với hợp chất ion?

A Nhiệt độ nóng chảy cao

B Tan tốt trong nước

C Không dẫn điện

D Rắn chắc nhưng khá giòn

Câu 24. Tính chất nào sau đây là tính chất của hợp chất ion?

A Nhiệt độ nóng chảy thấp

B Tan nhiều trong nước

C Dễ bay hơi

D Nhiệt độ sôi thấp

Câu 25. Trong các hợp chất sau: CaO , $Ba(NO_3)_2$, Na_2O , KF , K_2SO_4 , NH_4Cl , số hợp chất chứa ion đa nguyên tử là

A 2

B 3





C 4

D 5





Câu 26. Liên kết trong phân tử muối clorua của kim loại kiềm nào sau đây mang nhiều đặc tính ion nhất?






Câu 27. Sự kết hợp của các nguyên tử nào sau đây không tạo hợp chất dạng $X_2^+Y^{2-}$ hoặc $X^{2+}Y_2^{2-}$?




Câu 28. Cặp nguyên tử có cấu hình electron nào sau đây có thể tạo liên kết ion?



Câu 29. Nguyên tử X có 12 electron, nguyên tử Y có 17 electron. Công thức hợp chất và loại liên kết hình thành giữa hai nguyên tử này là



Câu 30. Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau: $X(1s^22s^22p^63s^23p^64s^1)$, $Y(1s^22s^22p^4)$. Hợp chất ion được tạo thành từ X và Y có công thức là



B. Trắc nghiệm đúng sai



Câu 31. Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

- a) Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
- b) Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích cùng dấu.
- c) Liên kết ion chỉ được hình thành giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình.
- d) Liên kết ion có tính định hướng.

Câu 32. Về cấu trúc và tính chất của hợp chất ion, cho biết tính đúng/ sai các phát biểu sau?

- a) Các ion trong hợp chất ion sắp xếp tự do, không theo trật tự nào.
- b) Các ion trong hợp chất ion sắp xếp theo một trật tự nhất định, tạo thành mạng tinh thể ion.
- c) Mạng tinh thể ion không bền vững.
- d) Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

Câu 33. Phân tích các phát biểu sau về hợp chất natri clorua (NaCl)

- a) NaCl được tạo thành từ kim loại điển hình Na và phi kim điển hình Cl.
- b) Liên kết trong NaCl là liên kết cộng hóa trị.
- c) Na dễ nhường 1 electron tạo Na^+ , Cl dễ nhận 1 electron tạo Cl^- .
- d) Phân tử NaCl ở trạng thái rắn, lỏng, khí đều dẫn điện.

Câu 34. Về tính chất của liên kết ion và hợp chất ion

- a) Độ bền của liên kết ion tỉ lệ thuận với hiệu độ âm điện giữa các nguyên tố tham gia liên kết.
- b) Liên kết ion thể hiện tính định hướng trong không gian
- c) Tất cả các hợp chất ion đều tan tốt trong nước.
- d) Hợp chất ion không dẫn điện ở trạng thái rắn.

Câu 35. Về hợp chất ion.

- a) KCl tan tốt trong nước do nước là dung môi phân cực mạnh.
- b) Các hợp chất ion đều tan tốt trong nước.
- c) Liên kết ion trong KCl bị phá vỡ khi hòa tan vào nước.
- d) Dung dịch KCl dẫn điện.

Câu 36. Nghiên cứu tính chất vật lí của canxi clorua (CaCl_2)

- a) CaCl_2 là hợp chất phân tử nên dễ bay hơi ở nhiệt độ thường.
- b) Để nóng chảy CaCl_2 cần nhiệt độ rất cao do lực hút tĩnh điện mạnh giữa các ion trong mạng tinh thể.
- c) Tinh thể CaCl_2 có khả năng dẫn điện do chứa các ion Ca^{2+} và Cl^- .
- d) CaCl_2 nóng chảy dẫn điện tốt vì các ion được giải phóng khỏi mạng tinh thể và chuyển động tự do.

Câu 37. Một nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3s^2 3p^5$.

- a) X là phi kim và có xu hướng nhận 1 electron
- b) Hợp chất của X với Na có công thức Na_2X
- c) Ion X^- có cấu hình electron của khí hiếm Kr
- d) X có thể tạo liên kết cộng hóa trị với H theo tỉ lệ 1 : 1

Câu 38. Cho các phát biểu sau về liên kết ion:

- a) Hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.
- b) Chỉ tồn tại giữa kim loại và phi kim.
- c) Hợp chất ion thường là chất rắn ở điều kiện thường.
- d) Hợp chất ion luôn dẫn điện tốt ở trạng thái rắn.

Câu 39. Cho phản ứng: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$. Trong hợp chất NaCl :

- a) Ion Na^+ có cấu hình electron của Ne
- b) Na nhận thêm 1 electron từ Cl
- c) Ion Cl^- có cấu hình electron của Kr
- d) Liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện

Câu 40. Cho nguyên tử M có cấu hình electron $[\text{Ne}]3s^2$. Hợp chất của M với ion SO_4^{2-} :

- a) Có công thức MSO_4
- b) Có công thức M_2SO_4
- c) M là kim loại kiềm thổ
- d) M cho 2 electron tạo ion M^{2+}

Câu 41. Cho phản ứng: $2\text{K} + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{KBr}$. Xét quá trình tạo liên kết:

- a) K có năng lượng ion hóa nhỏ hơn Na
- b) Ion K^+ và Br^- có cùng kích thước
- c) Br có ái lực electron lớn hơn Cl
- d) Liên kết trong KBr yếu hơn trong NaCl

Câu 42. Cho hai hợp chất MgO và CaO . Xét các nhận định:

- a) Cả hai đều là hợp chất ion
- b) MgO bền hơn CaO
- c) Mg^{2+} nhỏ hơn Ca^{2+}
- d) Cả hai đều có nhiệt độ nóng chảy cao

Câu 43. Ion Al^{3+} trong hợp chất với ion PO_4^{3-} :

- a) Tạo thành hợp chất AlPO_4
- b) Có cấu hình electron của Ne
- c) Tạo thành hợp chất AlPO_4 không tan trong nước
- d) Tạo liên kết ion với PO_4^{3-}

Câu 44. Cho hai hợp chất LiF và CsF . So sánh:

- a) LiF có tính ion mạnh hơn
- b) Ion Li^+ lớn hơn ion Cs^+
- c) LiF có nhiệt độ nóng chảy cao hơn
- d) F^- đều có cấu hình của Ne

Câu 45. Cho dung dịch chứa Ba^{2+} tác dụng với dung dịch chứa SO_4^{2-} :

- a) Tạo thành kết tủa BaSO_4
- b) Kết tủa có màu



- c) BaSO_4 không tan trong nước
- d) Liên kết trong BaSO_4 là liên kết ion

Câu 46. Các ion Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} trong nước:

- a) Được hình thành từ kim loại
- b) Có cùng kích thước với nhau
- c) Được tạo được hợp chất với Cl^-
- d) Có cấu hình electron của khí hiếm

Câu 47. Xét các tính chất của hợp chất CaCl_2 :

- a) Hút ẩm mạnh
- b) Không tan trong nước
- c) Tinh thể có màu trắng
- d) Dẫn điện khi nóng chảy

Câu 48. Trong phản ứng tạo MgCl_2 :

- a) Mg mất 2 electron thành Mg^{2+}
- b) Cl_2 nhận 1 electron thành 2Cl^-
- c) Liên kết ion được tạo thành sau khi trao đổi electron
- d) Ion Mg^{2+} có kích thước nhỏ hơn nguyên tử Mg

Câu 49. So sánh NaCl và AgCl :

- a) Đều là hợp chất ion
- b) Có cùng độ tan trong nước
- c) AgCl có màu trắng
- d) Ag^+ và Na^+ có cùng điện tích

Câu 50. Xét sự phân ly của Na_2CO_3 trong nước:

- a) Tạo thành ion Na^+ và CO_3^{2-}
- b) Tỷ lệ số ion Na^+ và CO_3^{2-} là 1:1
- c) Dung dịch dẫn điện
- d) Phản ứng được với dung dịch CaCl_2

Câu 51. Các phát biểu sau là đúng hay sai khi nói về tính chất của hợp chất ion?

- a) Có nhiệt độ nóng chảy cao
- b) Tan nhiều trong nước và tạo ra dung dịch dẫn điện tốt
- c) Không dẫn điện ở trạng thái rắn
- d) Ở trạng thái nóng chảy, dẫn điện rất tốt

Câu 52. Các phát biểu sau là đúng hay sai sau khi nói về hợp chất sodium oxide (Na_2O)?

- a) Trong phân tử Na_2O , các ion Na^+ và ion O^{2-} đều đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm neon
- b) Mỗi nguyên tử Na nhường 1 electron cho nguyên tử O để tạo thành ion dương
- c) Ở điều kiện thường, là chất rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi
- d) Không tan trong nước, chỉ tan trong dung môi không phân cực như benzene, carbon tetrachloride,...



Câu 53. Các phát biểu sau là đúng hay sai khi nói về hợp chất magnesium oxide (MgO)?

- Là hợp chất ion
- Là chất rắn ở điều kiện thường
- Có nhiệt độ nóng chảy rất cao (khoảng 2852°C)
- Phân tử tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa ion Mg^{2+} và O^{2-}

C. Bài tập tự luận

Bài 1. Cho các ion sau: K^{+} ; Be^{2+} ; Cr^{3+} ; F^{-} ; Se^{2-} ; N^{3-} . Viết phương trình biểu diễn sự hình thành mỗi ion trên.

Bài 2. Cho các ion sau: ${}_{20}\text{Ca}^{2+}$; ${}_{13}\text{Al}^{3+}$; ${}_{9}\text{F}^{-}$; ${}_{16}\text{S}^{2-}$; ${}_{7}\text{N}^{3-}$.

- Viết cấu hình electron của mỗi ion.
- Mỗi cấu hình đã viết giống với cấu hình electron của nguyên tử nào?

Bài 3. Vì sao các hợp chất ion thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng?

Bài 4. Cho các chất sau: K_2O , H_2O , H_2S , SO_2 , NaCl , K_2S , CaF_2 , HCl . Trong phân tử chất nào có liên kết ion?

Bài 5. Kể ra những hợp chất ion tạo thành từ các ion sau: F^{-} , K^{+} , O^{2-} , Ca^{2+} .

Bài 6. Dùng sơ đồ để biểu diễn sự hình thành liên kết trong mỗi hợp chất ion sau đây:

- magnesium fluoride (MgF_2);
- potassium fluoride (KF);
- sodium oxide (Na_2O);
- calcium oxide (CaO).

Bài 7. Anion X^{-} có cấu hình electron nguyên tử ở phân lớp ngoài cùng là 3p^6 .

- Viết cấu hình electron của nguyên tử X. Cho biết X là nguyên tố kim loại hay phi kim.
- Giải thích bản chất liên kết giữa X với barium.

Bài 8. Nguyên tố X tích lũy trong các tế bào thực vật nên rau và trái cây tươi là nguồn cung cấp tốt nguyên tố X cho cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra khẩu phần ăn chứa nhiều X có thể giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ. Nguyên tố Z được dùng chế tạo được phẩm, phẩm nhuộm và chất nhạy với ánh sáng. Nguyên tử X chỉ có 7 electron trên phân lớp s; còn nguyên tử Z chỉ có 17 electron trên phân lớp p.

- Viết công thức hoá học của hợp chất tạo bởi X và Z.
- Hợp chất tạo bởi X và Z có tính dẫn điện không? Vì sao?
- Trong thực tế cuộc sống, hợp chất tạo bởi X và Z được dùng để làm gì?

Bài 9. Cho dãy các ion: K^{+} , S^{2-} , Al^{3+} , SO_4^{2-} , NH_4^{+} , CO_3^{2-} , Na^{+} , NO_3^{-} , Cl^{-} , Mg^{2+} . Có bao nhiêu ion thuộc loại cation?





Bài 10. Cho dãy các ion: K^+ , S^{2-} , Al^{3+} , SO_4^{2-} , NH_4^+ , CO_3^{2-} , Na^+ , NO_3^- , Cl^- , Mg^{2+} . Có bao nhiêu ion thuộc loại anion?



Bài 11. Cho các ion sau: Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , F^- , Al^{3+} , O^{2-} , N^{3-} . Có bao nhiêu ion có cấu hình electron của khí hiếm neon?



Bài 12. Cho các hợp chất sau: $NaCl$, MgO , KBr , CaF_2 , CH_4 , HNO_3 . Có bao nhiêu hợp chất chứa liên kết ion trong phân tử?



Bài 13. Cho các hợp chất sau: $MgCl_2$, CaO , HBr , NH_4NO_3 , CCl_4 , PCl_5 . Có bao nhiêu hợp chất chứa liên kết ion trong phân tử?





Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về liên kết cộng hoá trị (liên kết đơn, đôi, ba) khi áp dụng quy tắc octet.
- ◇ Viết được công thức Lewis của một số chất đơn giản.
- ◇ Trình bày được khái niệm về liên kết cho - nhận.
- ◇ Phân biệt được các loại liên kết (liên kết cộng hoá trị không phân cực, phân cực, liên kết ion) dựa theo độ âm điện.
- ◇ Giải thích được sự hình thành liên kết σ và liên kết π qua sự xen phủ AO.
- ◇ Trình bày được khái niệm năng lượng liên kết (cộng hoá trị).
- ◇ Lắp ráp được mô hình một số phân tử có liên kết cộng hoá trị.



Nguyên tử hydrogen và chlorine dễ dàng kết hợp để tạo thành phân tử hydrogen chloride (HCl), liên kết trong trường hợp này có gì khác so với liên kết ion trong phân tử sodium chloride (NaCl) ?

I. Nội dung bài học


① Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị

a) Tìm hiểu sự hình thành liên kết đơn, đôi, ba trong một số phân tử

★ Sự hình thành liên kết đơn, liên kết cho - nhận



Hình 3.1: Sự tạo thành liên kết đơn trong phân tử HCl




Hình 3.2: Sự tạo thành liên kết cho - nhận trong ion NH_4^+






Liên kết cho - nhận là một trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hoá trị, trong đó cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp.

★ Sự hình thành liên kết đôi




Hình 3.3: Sự tạo thành liên kết đôi trong phân tử O₂



Hình 3.4: Sự tạo thành liên kết đôi trong phân tử CO₂

★ Sự hình thành liên kết ba



Hình 3.5: Sự tạo thành liên kết đôi trong phân tử N₂

b) Tìm hiểu cách viết công thức Lewis

Công thức Lewis của một phân tử được xây dựng từ công thức electron của phân tử, trong đó mỗi cặp electron chung giữa hai nguyên tử tham gia liên kết được thay bằng một gạch nối "-".



☼ Phương pháp.

- ◇ **Bước 1.** Xác định tổng số electron hóa trị bằng cách cộng số nhóm của tất cả các nguyên tử trong phân tử.
- ◇ **Bước 2.** Xác định nguyên tử trung tâm. Đây thường là nguyên tử có độ âm điện nhỏ nhất.
- ◇ **Bước 3.** Nối các nguyên tử bằng liên kết đơn.
- ◇ **Bước 4.** Hoàn thành octet cho các nguyên tử liên kết với nguyên tử trung tâm. Lưu ý rằng hydro chỉ cần 2 electron để hoàn thành octet.
- ◇ **Bước 5.** Đặt bất kỳ electron còn lại nào lên nguyên tử trung tâm.
- ◇ **Bước 6.** Nếu nguyên tử trung tâm không có octet, hãy thử tạo liên kết đôi hoặc liên kết ba.
- ◇ **Bước 7.** Tính điện tích hình thức trên mỗi nguyên tử. Điện tích hình thức là hiệu số giữa số electron hóa trị mà một nguyên tử có ở trạng thái tự do và số electron mà nó "sở hữu" trong cấu trúc Lewis. Mục tiêu là có điện tích hình thức bằng 0 trên mỗi nguyên tử, hoặc càng gần 0 càng tốt.



❖ Ví dụ 1 Công thức lewis

Viết công thức Lewis của phân tử CO_2 .

❖ **Bước 1:** Tổng số electron hoá trị của phân tử CO_2 là:

$$4 + 6 \times 2 = 16$$

❖ **Bước 2:** Sơ đồ khung biểu diễn liên kết của phân tử CO_2 :



❖ **Bước 3:** Số electron hoá trị chưa tham gia liên kết trong sơ đồ là:

$$16 - 2 \times 2 = 12$$

❖ **Bước 4,5,6:** Hoàn thiện octet cho các nguyên tử có độ âm điện lớn hơn trong sơ đồ: Số electron hoá trị còn lại: $12 - 6 \times 2 = 0$. Nguyên tử trung tâm C có 4 electron hoá trị, chưa đạt octet.

❖ **Bước 7:** Vì C chưa đạt octet, cần chuyển một cặp electron của mỗi nguyên tử oxygen thành cặp electron chung giữa C và O để C đạt octet. Công thức Lewis của phân tử CO_2 thu được là:



② Độ âm điện và liên kết hóa học

★ Phân biệt liên kết cộng hoá trị phân cực và không phân cực



Liên kết cộng hoá trị không phân cực là liên kết cộng hoá trị trong đó **cặp electron chung không lệch** về phía nguyên tử nào.

Liên kết cộng hoá trị phân cực là liên kết cộng hoá trị trong đó **cặp electron chung lệch** về phía nguyên tử có **độ âm điện lớn hơn**.

★ Phân biệt loại liên kết trong phân tử dựa trên giá trị hiệu độ âm điện

Hiệu độ âm điện ($\Delta\chi$)	Loại liên kết
$0 \leq \Delta\chi < 0,4$	Cộng hoá trị không phân cực
$0,4 \leq \Delta\chi < 1,7$	Cộng hoá trị phân cực
$\Delta\chi \geq 1,7$	Ion


Bảng 3.1: Hiệu độ âm điện ($\Delta\chi$) và loại liên kết tương ứng




③ Mô tả liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ orbital nguyên tử

a) Sự xen phủ trực các orbital nguyên tử tạo liên kết σ (sigma)


★ Xen phủ s - s




★ Xen phủ s - p



★ Xen phủ p - p




b) Sự xen phủ bên các orbital nguyên tử tạo liên kết π (pi)




- ◇ **Liên kết σ** là loại liên kết cộng hoá trị được hình thành do sự **xen phủ trực** của hai orbital. Vùng xen phủ nằm trên đường nối tâm hai nguyên tử.
- ◇ **Liên kết π** là loại liên kết cộng hoá trị được hình thành do sự **xen phủ bên** của hai orbital. Vùng xen phủ nằm hai bên đường nối tâm hai nguyên tử.
- ◇ Do mức độ xen phủ trực lớn hơn mức độ xen phủ bên nên **liên kết σ bền hơn liên kết π**

Ví dụ: Giải thích sự hình thành phân tử O_2 bằng sự xen phủ





Ví dụ: Tổng năng lượng liên kết trong phân tử CH_4 là 1660 kJ/mol .



. Do đó, năng lượng liên kết trung bình của một liên kết $\text{C}-\text{H}$ là $\frac{1660}{4} = 415 \text{ kJ/mol}$.



④ Năng lượng liên kết cộng hóa trị



Năng lượng của một liên kết hoá học là năng lượng cần thiết để **phá vỡ 1 mol liên kết đó ở thể khí**, tạo thành các **nguyên tử ở thể khí**.

Giá trị năng lượng của một liên kết hoá học là thước đo **độ bền liên kết**.

Ví dụ: Cho các phương trình phản ứng sau:



Ta nói năng lượng liên kết E_b trong phân tử H_2 và N_2 lần lượt là 432 kJ/mol và 945 kJ/mol . Điều này có nghĩa cần cung cấp 432 kJ và 945 kJ để lần lượt phá vỡ 1 mol khí H_2 và 1 mol khí N_2 thành các nguyên tử ở thể khí.



- ◇ **Liên kết đơn** luôn luôn là **liên kết σ**, được tạo thành từ sự xen phủ trục và **thường bền vững**
- ◇ **Liên kết đôi** gồm **1 liên kết σ** và **1 liên kết π**.
- ◇ **Liên kết ba** gồm **1 liên kết σ** và **2 liên kết π**



Liên kết giữa hai nguyên tử được thực hiện bởi **một liên kết σ** và **một hay nhiều liên kết π** được gọi là **liên kết bội**



II. Bài tập

A. Bài tập tự luận

Bài 1. Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: Cl (3,16), O (3,44), N (3,04), H (2,20), Al (1,61), Na (0,93). Xác định kiểu liên kết (liên kết ion? cộng hóa trị không phân cực? cộng hóa trị phân cực?) trong các phân tử sau: HCl, H₂, NH₃, Na₂O, O₂, NaCl, AlCl₃.

Bài 2. Dự đoán kiểu liên kết hóa học trong các phân tử sau đây: Cl₂, NH₃, KCl, O₂, NaF, CaCl₂, HCl, MgO.

Bài 3. Ammonia (NH₃) khan (nguyên chất) được bơm vào đất ở dạng khí, là nguồn phân đạm phổ biến ở Bắc Mỹ do giá thành và tuổi thọ tương đối lâu trong đất so với các dạng phân đạm khác. Do tính ổn định của ammonia khan trên đất lạnh, nông dân trồng ngô thường bón ammonia khan vào mùa thu để bắt đầu hoạt động gieo trồng vào mùa xuân. Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của ammonia.

Bài 4. Ozone (O₃) là một loại khí có tính oxi hoá mạnh, phân tử gồm ba nguyên tử oxygen. Ozone xuất hiện ở tầng đối lưu và tầng bình lưu của khí quyển. Tùy thuộc vào vị trí của ozone trong các tầng trên mà nó ảnh hưởng đến sự sống trên Trái Đất theo các cách tốt, xấu khác nhau. Phân tử ozone có sự hiện diện liên kết cho – nhận. Viết công thức Lewis và công thức cấu tạo của ozone.

Bài 5. Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

- 1 Cl₂, O₂, N₂.
- 2 HCl, H₂S, CH₄, C₂H₄, C₂H₂.
- 3 SO₂, SO₃, HNO₃, H₂SO₄, H₂CO₃, H₃PO₄.
- 4 HClO, HClO₂, HClO₃, HClO₄.

Bài 6. Hydrogen sulfide (H₂S) là một chất khí không màu, mùi trứng thối, độc. Theo tài liệu của Cơ quan Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ, nồng độ H₂S khoảng 100 ppm gây kích thích màng phổi. Nồng độ khoảng 400 – 700 ppm, H₂S gây nguy hiểm đến tính mạng chỉ trong 30 phút. Nồng độ trên 800 ppm gây mất ý thức và làm tử vong ngay lập tức.

- 1 Viết công thức Lewis và công thức cấu tạo của H₂S.
- 2 Em hiểu thế nào về nồng độ ppm của H₂S trong không khí?
- 3 Một gian phòng trống (25°C; 1 bar) có kích thước 3 m x 4 m x 6 m bị nhiễm 10 gam khí H₂S. Tính nồng độ ppm của H₂S trong gian phòng trên. Đánh giá mức độ độc hại của H₂S trong trường hợp này. Cho biết 1 mol khí ở 25°C và 1 bar có thể tích 24,79 L.

Bài 7. Cho biết năng lượng liên kết H – H là 436 kJ mol⁻¹. Hãy tính năng lượng cần thiết (theo eV) để phá vỡ liên kết trong phân tử H₂, cho biết 1 eV = 1,602 × 10⁻¹⁹ J.

B. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng cách

- A** chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.
- B** dùng chung electron.
- C** hút tĩnh điện.
- D** cho nhận proton.

Câu 2. Nguyên tử Cl có 7 electron lớp ngoài cùng, khi hình thành liên kết với một nguyên tử Cl khác, mỗi nguyên tử Cl có xu hướng

- A** nhận thêm 2 electron.
- B** nhường đi 1 electron.
- C** góp chung 1 electron.
- D** nhường đi 7 electron.

Câu 3. Liên kết trong phân tử nào sau đây là liên kết cộng hóa trị không cực?

- A** HCl
- B** HBr
- C** Cl₂
- D** HF

Câu 4. Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực?

- A** N₂
- B** H₂
- C** NH₃
- D** O₂

Câu 5. Trong phân tử HCl, cặp electron liên kết bị lệch về phía nguyên tử nào?

- A** H
- B** Cl
- C** Lệch về cả hai phía
- D** Không bị lệch

Câu 6. Dãy nào sau đây gồm các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị?

- A** NaCl, MgO, CaF₂
- B** CO₂, H₂O, NH₃
- C** NaOH, KOH, Ba(OH)₂
- D** KCl, AlCl₃, FeCl₃

Câu 7. Số cặp electron dùng chung trong phân tử CO₂ là

- A** 1
- B** 2
- C** 4
- D** 3

Câu 8. Cho độ âm điện của H là 2,2 và của O là 3,44. Vậy liên kết O-H trong phân tử H₂O là

- A** liên kết ion.
- B** liên kết cộng hóa trị không phân cực.
- C** liên kết cộng hóa trị có cực.
- D** liên kết kim loại.

Câu 9. Liên kết cộng hóa trị được tạo thành do

- A** lực hút tĩnh điện giữa các ion.
- B** sự dùng chung cặp electron giữa hai nguyên tử.
- C** sự cho nhận electron giữa hai nguyên tử.
- D** lực hút giữa hạt nhân và các electron.

Câu 10. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

- A** H₂O
- B** Br₂
- C** NH₃
- D** HCl

Câu 11. Cặp chất nào sau đây đều chỉ chứa liên kết cộng hóa trị?

- A** NaCl và MgO
- B** NaOH và KOH



C CH_4 và NH_3

D KCl và CaO

Câu 12. Trong phân tử N_2 , hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau bằng cách

A mỗi nguyên tử nitơ góp 1 electron.

B mỗi nguyên tử nitơ góp 2 electron.

C mỗi nguyên tử nitơ góp 3 electron.

D một nguyên tử nitơ góp 2 electron, nguyên tử còn lại góp 4 electron.

Câu 13. Phân tử nào sau đây có liên kết cho - nhận?

A H_2O

B CO

C NH_3

D Cl_2

Câu 14. Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho

A khả năng nhường electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

B khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

C khả năng tham gia phản ứng hóa học của nguyên tử đó.

D khả năng tạo thành liên kết ion của nguyên tử đó.

Câu 15. Liên kết trong phân tử nào sau đây là liên kết cộng hóa trị có cực?

A O_2

B N_2

C HF

D Cl_2

Câu 16. Cho các phân tử: H_2O , NH_3 , CO_2 , CH_4 . Phân tử có độ phân cực lớn nhất là

A CO_2

B CH_4

C H_2O

D NH_3

Câu 17. Liên kết cộng hóa trị trong phân tử nào sau đây có cực nhất?

A H-Cl

B H-Br

C H-F

D H-I

Câu 18. Nguyên tử X có 4 electron lớp ngoài cùng. X có thể hình thành với H

A 1 liên kết cộng hóa trị

B 2 liên kết cộng hóa trị

C 3 liên kết cộng hóa trị

D 4 liên kết cộng hóa trị

Câu 19. Trong phân tử nước (H_2O), góc liên kết $\widehat{\text{HOH}}$ xấp xỉ là:

A 180°

B 120°

C 90°

D $104,5^\circ$

Câu 20. Số cặp electron chưa liên kết trên nguyên tử trung tâm của phân tử NH_3 là

A 0

B 1

C 2

D 3

Câu 21. Cho biết độ âm điện của các nguyên tố: H(2,20); O(3,44); Cl(3,16); S(2,58). Liên kết trong phân tử nào sau đây có độ phân cực lớn nhất?

A H_2O

B HCl

C H_2S

D SO_2

Câu 22. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn là

A N_2 , O_2 , F_2

B CO_2 , SO_2 , H_2O

C CH_4 , NH_3 , H_2O

D C_2H_4 , C_2H_2 , CO_2



Câu 23. Nguyên tử A có 3 electron ở lớp ngoài cùng, nguyên tử B có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Công thức phân tử của hợp chất tạo thành giữa A và B là

- A** AB_2 **B** A_2B **C** AB_3 **D** A_2B_3

Câu 24. Trong phân tử nào sau đây, nguyên tử trung tâm không tuân theo quy tắc bát tử?

- A** CO_2 **B** NH_3 **C** H_2O **D** BF_3

Câu 25. Liên kết đôi gồm

- A** hai liên kết σ **B** hai liên kết π
C một liên kết σ và một liên kết π **D** hai liên kết ion

Câu 26. Cho các phân tử sau: H_2 , HCl , HF , HBr , HI . Phân tử có năng lượng liên kết lớn nhất là

- A** H_2 **B** HCl **C** HF **D** HI

Câu 27. Ý nào sau đây **không đúng** khi nói về liên kết cộng hóa trị?

- A** Liên kết cộng hóa trị được hình thành do sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử.
B Liên kết cộng hóa trị có thể là liên kết đơn, liên kết đôi hoặc liên kết ba.
C Liên kết cộng hóa trị được hình thành giữa hai nguyên tử phi kim.
D Liên kết cộng hóa trị luôn là liên kết có cực.

Câu 28. Phân tử nào sau đây có chứa cả liên kết cộng hóa trị và liên kết cho - nhận?

- A** HCl **B** CO_2 **C** HNO_3 **D** H_2O

Câu 29. Để đạt được cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nhất, nguyên tử clo có xu hướng

- A** nhường đi 1 electron **B** nhận thêm 1 electron
C góp chung 1 electron **D** nhận thêm 7 electron

Câu 30. Cho các chất sau: Cl_2 , HCl , $NaCl$, NaF . Số chất chứa liên kết cộng hóa trị là

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4

Câu 31. Cho các chất sau: Cl_2 , O_2 , H_2S , $NaCl$, NaF , NH_3 , CCl_4 , SO_2 . Số chất chứa liên kết cộng hóa trị phân cực là





- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4

Câu 32. Cho các chất sau: Cl_2 , O_2 , H_2S , $NaCl$, NaF , NH_3 , CCl_4 , SO_2 . Số chất chứa liên kết cộng hóa trị phân cực là

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4

Câu 33. Trong số các chất sau, chất nào chỉ chứa liên kết σ





Câu 34. Trong phân tử ammonia N_2 , số cặp electron chung giữa hai nguyên tử nitrogen là

A 1

B 3

C 2

D 4

Câu 35. Chất vừa có liên kết cộng hoá trị phân cực, vừa có liên kết cộng hoá trị không phân cực là

A NH_3

B C_2F_6

C CO_2

D H_2O

Sử dụng giá trị độ âm điện các nguyên tố được cho trong bảng sau để trả lời các câu 36, 37, 38.

Nguyên tố	Độ âm điện	Nguyên tố	Độ âm điện
Na	0,93	O	3,44
H	2,20	Br	2,96
C	2,55	Cl	3,16
N	3,04	F	3,98

Dưới đây là phần bổ sung lời giải chi tiết cho các câu hỏi của bạn:

Câu 36. Liên kết nào dưới đây là liên kết cộng hoá trị không phân cực?

A $\text{Na} - \text{O}$

B $\text{O} - \text{H}$

C $\text{Na} - \text{C}$

D $\text{C} - \text{H}$

Câu 37. Lực kéo electron về phía nguyên tử nitrogen mạnh nhất ở liên kết nào dưới đây?

A $\text{N} - \text{H}$

B $\text{N} - \text{F}$

C $\text{N} - \text{Cl}$

D $\text{N} - \text{Br}$

Câu 38. Liên kết nào trong các liên kết sau là phân cực nhất?

A $\text{C} - \text{H}$

B $\text{C} - \text{F}$

C $\text{C} - \text{Cl}$

D $\text{C} - \text{Br}$

Câu 39. Hợp chất nào sau đây chứa cả liên kết cộng hoá trị và liên kết ion?

A CH_2O

B CH_4

C Na_2O

D KOH

Câu 40. Các liên kết trong phân tử nitrogen được tạo thành do sự xen phủ của

A các orbital s với nhau.

B 2 orbital s và 1 orbital p với nhau.

C 1 orbital s và 2 orbital p với nhau.

D 3 orbital p giống nhau về hình dạng và kích thước, chỉ khác nhau về sự định hướng trong không gian.

Câu 41. Điều nào sau đây **sai** khi nói về tính chất của hợp chất cộng hoá trị?

A Các hợp chất cộng hoá trị có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp hơn các hợp chất ion.



- B** Các hợp chất cộng hoá trị có thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí trong điều kiện thường.
- C** Các hợp chất cộng hoá trị đều dẫn điện tốt.
- D** Các hợp chất cộng hoá trị không phân cực tan được trong dung môi không phân cực.

Câu 42. Đặt độ dài các liên kết $N-N$, $N=N$ và $N\equiv N$ lần lượt là I_1 ; I_2 và I_3 . Thứ tự tăng dần độ dài các liên kết là

- A** $I_3; I_2; I_1$
- B** $I_1; I_3; I_2$
- C** $I_2; I_1; I_3$
- D** $I_1; I_2; I_3$

Câu 43. Phát biểu nào sau đây đúng với độ bền của một liên kết?

- A** Khi nhiều liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử, độ bền của liên kết sẽ giảm
- B** Độ bền của liên kết tăng khi độ dài của liên kết tăng
- C** Độ bền của liên kết tăng khi độ dài của liên kết giảm
- D** Độ bền của liên kết không phụ thuộc vào độ dài liên kết

Câu 44. Liên kết cộng hoá trị là liên kết hoá học được hình thành giữa hai nguyên tử bằng

- A** một electron chung
- B** sự cho - nhận electron
- C** một cặp electron góp chung
- D** một hay nhiều cặp electron dùng chung

Câu 45. Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hoá trị không phân cực?

- A** $LiCl$
- B** CF_2Cl_2
- C** $CHCl_3$
- D** N_2

Câu 46. Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hoá trị phân cực?

- A** H_2
- B** $CHCl_3$
- C** CH_4
- D** N_2

Câu 47. Liên kết σ là liên kết hình thành do

- A** sự xen phủ bên của hai orbital
- B** cặp electron dùng chung
- C** lực hút tĩnh điện giữa hai ion
- D** sự xen phủ trực của hai orbital

Câu 48. Liên kết π là liên kết hình thành do

- A** sự xen phủ bên của hai orbital
- B** cặp electron dùng chung
- C** lực hút tĩnh điện giữa hai ion
- D** sự xen phủ trực của hai orbital

Câu 49. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital $p-p$?

- A** H_2
- B** Cl_2
- C** NH_3
- D** HCl

Câu 50. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital $s-s$?

- A** H_2
- B** Cl_2
- C** NH_3
- D** HCl

Câu 51. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital $s-p$?

- A** H_2
- B** Cl_2
- C** HCl
- D** O_2

Câu 52. Các liên kết trong phân tử oxygen gồm

- A** 2 liên kết π
- B** 2 liên kết σ



C 1 liên kết σ , 1 liên kết π

D 1 liên kết σ

Câu 53. Số liên kết σ và π có trong phân tử C_2H_2 lần lượt là

A 2 và 3

B 3 và 2

C 2 và 2

D 3 và 1

Câu 54. Dãy nào sau đây gồm các chất chỉ có liên kết cộng hoá trị?

A $BaCl_2, NaCl, NO_2$

B SO_2, CO_2, Na_2O_2

C SO_3, H_2S, H_2O

D $CaCl_2, F_2O, HCl$

Câu 55. Cho hai nguyên tố $X(Z = 20)$ và $Y(Z = 17)$. Công thức hợp chất tạo thành từ nguyên tố X, Y và liên kết trong phân tử là

A XY : liên kết cộng hoá trị

B X_2Y_3 : liên kết cộng hoá trị

C X_2Y : liên kết ion

D XY_2 : liên kết ion

Câu 56. Trong nguyên tử C , những electron có khả năng tham gia hình thành liên kết cộng hoá trị thuộc phân lớp nào sau đây?

A $1s$

B $2s$

C $2s, 2p$

D $1s, 2s, 2p$

Câu 57. Những phát biểu nào sau đây là không đúng?

A Các nguyên tử liên kết với nhau theo xu hướng tạo hệ bền vững hơn

B Các nguyên tử liên kết với nhau theo xu hướng tạo hệ có năng lượng thấp hơn

C Các nguyên tử liên kết với nhau theo xu hướng tạo lớp vỏ electron được octet

D Các nguyên tử liên kết với nhau theo xu hướng tạo hệ có năng lượng cao hơn

Câu 58. Liên kết cộng hoá trị thường được hình thành giữa

A các nguyên tử nguyên tố kim loại với nhau

B các nguyên tử nguyên tố phi kim với nhau

C các nguyên tử nguyên tố kim loại với các nguyên tử nguyên tố phi kim

D các nguyên tử khí hiếm với nhau

Câu 59. Số lượng cặp electron dùng chung trong các phân tử H_2, O_2, N_2, F_2 lần lượt là:

A 1, 2, 3, 4

B 1, 2, 3, 1

C 2, 2, 2, 2

D 1, 2, 2, 1

Câu 60. Trong phân tử HF , số cặp electron dùng chung và cặp electron hoá trị riêng của nguyên tử F lần lượt là:


A 1 và 3

B 2 và 2

C 3 và 1

D 1 và 4

Câu 61. Cho công thức Lewis của các phân tử sau:



Số phân tử mà nguyên tử trung tâm không thoả mãn quy tắc octet là

A 1


B 2

C 3

D 4



Câu 62. Công thức nào sau đây ứng với công thức Lewis của phân tử PCl_3 ?



- ☐ A Công thức (4)
 ☐ B Công thức (1)
 ☐ C Công thức (2)
 ☐ D Công thức (3)

Câu 63. Dựa vào hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tố, cho biết liên kết trong phân tử nào sau đây là phân cực nhất.

- ☐ A HF
 ☐ B HCl
 ☐ C HBr
 ☐ D HI

Câu 64. Khi tham gia hình thành liên kết trong các phân tử HF, F_2 ; orbital tham gia xen phủ tạo liên kết của nguyên tử F thuộc về phân lớp nào, có hình dạng gì?

- ☐ A Phân lớp 2 s, hình cầu
 ☐ B Phân lớp 2 s, hình số tám nổi
 ☐ C Phân lớp 2 p, hình số tám nổi
 ☐ D Phân lớp 2 p, hình cánh hoa

Câu 65. Số orbital của cả hai nguyên tử N tham gia xen phủ tạo liên kết trong phân tử N_2 là

- ☐ A 3
 ☐ B 4
 ☐ C 5
 ☐ D 6

Câu 66. Liên kết trong phân tử nào dưới đây không được hình thành do sự xen phủ giữa các orbital cùng loại (ví dụ cùng là orbital s, hoặc cùng là orbital p)?

- ☐ A Cl_2
☐ B H_2
☐ C NH_3
☐ D Br_2

Câu 67. Phát biểu nào sau đây không đúng?

- ☐ A Chỉ có các AO có hình dạng giống nhau mới xen phủ với nhau để tạo liên kết
 ☐ B Khi hình thành liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử, luôn có một liên kết σ
☐ C Liên kết σ bền vững hơn liên kết π
☐ D Có hai kiểu xen phủ hình thành liên kết là xen phủ trực và xen phủ bên

Câu 68. Số lượng electron tham gia hình thành liên kết đơn, đôi và ba lần lượt là:

- ☐ A 1, 2 và 3
 ☐ B 2, 4 và 6
 ☐ C 1, 3 và 5
 ☐ D 2, 3 và 4

Câu 69. Phân tử nào sau đây không phân cực:

- ☐ A SO_2
☐ B CO_2
☐ C NH_3
☐ D H_2O

Câu 70. Cho độ âm điện của các nguyên tố: H (2,20); C (2,55); N (3,04); O (3,44); F (3,98). Hãy cho biết trong các hợp chất sau: NH_3 , CO_2 , HF, H_2O , CH_4 , chất nào có chứa liên kết cộng hóa trị phân cực?

- ☐ A CH_4 , CO_2
☐ B NH_3 , HF, H_2O
☐ C HF, H_2O
☐ D NH_3 , CO_2 , HF, H_2O

Câu 71. Cho biết năng lượng liên kết H – I và H – Br lần lượt là 297 kJmol^{-1} và 364 kJmol^{-1} . Phát biểu



sau đây là không đúng?

- A** Liên kết H – I là bền vững hơn so với liên kết H – Br
- B** Khi đun nóng, HI bị phân huỷ (thành H_2 và I_2) ở nhiệt độ cao hơn so với HBr (thành H_2 và Br_2)
- C** Cần cung cấp 297 kJ và 364 kJ để lần lượt phá vỡ 1 mol khí HI và 1 mol khí HBr thành các nguyên tử ở thể khí.
- D** Khi đun nóng, HI bị phân huỷ (thành H_2 và I_2) ở nhiệt độ thấp hơn so với HBr (thành H_2 và Br_2)

C. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 72. Cho các phân tử: H_2O , NH_3 , CH_4 , CO_2 .

- a) Tất cả các phân tử trên đều có liên kết cộng hóa trị không cực.
- b) CO_2 là phân tử có liên kết cộng hóa trị có cực nhưng phân tử không phân cực.
- c) Các phân tử H_2O và NH_3 có hình dạng giống nhau.
- d) Góc liên kết H-O-H trong H_2O nhỏ hơn góc liên kết H-C-H trong CH_4 .

Câu 73. Xét về sự hình thành phân tử N_2

- a) Phân tử N_2 có 3 cặp electron chung.
- b) Liên kết trong phân tử N_2 là liên kết cộng hóa trị phân cực.
- c) Trong phân tử N_2 liên kết ba gồm 1 liên σ và 2 liên kết π .
- d) Phân tử N_2 phân cực.

Câu 74. Cho các phân tử: H_2O , NH_3 , CH_4 , CO_2 .

- a) Tất cả các phân tử trên đều có liên kết cộng hóa trị không cực.
- b) CO_2 là phân tử có liên kết cộng hóa trị có cực nhưng phân tử không phân cực.
- c) Các phân tử H_2O và NH_3 có hình dạng giống nhau.
- d) Góc liên kết H-O-H trong H_2O nhỏ hơn góc liên kết H-C-H trong CH_4 .

Câu 75. Xét phân tử NH_3

- a) Liên kết N-H trong NH_3 là liên kết cộng hóa trị phân cực.
- b) Khi tham gia liên kết hóa học N dùng 5 electron hóa trị tạo liên kết với 3 nguyên tử H
- c) Trong phân tử NH_3 liên kết σ N – H hình thành do sự xen phủ trực của 1 AO 2p trong N với 1 AO s của H
- d) Phân tử NH_3 có cấu trúc dạng chóp tam giác

Câu 76. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.

- a) Trong phân tử HCl, giữa nguyên tử H và nguyên tử Cl có 1 cặp electron dùng chung
- b) Trong phân tử O_2 , giữa hai nguyên tử O có 2 cặp electron dùng chung
- c) Trong phân tử N_2 , giữa hai nguyên tử N có 3 cặp electron dùng chung
- d) Trong phân tử CO_2 , giữa một nguyên tử C và hai nguyên tử O có 4 cặp electron dùng chung

Câu 77. Cho các công thức: (1) $H:\ddot{O}:H$, (2) $O=C=O$, (3) $\ddot{N}\equiv\ddot{N}$, (4) $H-\ddot{O}-H$, (5) $\ddot{O}::\ddot{O}$.

- a) Công thức (1) và (3) là công thức electron



- b) Công thức (2) là công thức cấu tạo
- c) Công thức (3), (4) là công thức Lewis
- d) Công thức (1), (3), (4), (5) là công thức Lewis

Câu 78. Cho các phát biểu:

- a) Nếu cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử thì đó là liên kết cộng hóa trị không cực
- b) Nếu cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử thì đó là liên kết cộng hóa trị có cực
- c) Cặp electron chung luôn được tạo nên từ 2 electron của cùng một nguyên tử
- d) Cặp electron chung được tạo nên từ 2 electron hóa trị. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

Câu 79. Cho độ dài liên kết và năng lượng liên kết của một số liên kết trong bảng sau:

	C – C	C = C	C≡C
Độ dài liên kết (Å)	1,54	1,34	1,20
Năng lượng liên kết (kJ/mol)	347	614	839

Bảng 3.2: Thông tin về liên kết C – C, C = C và C≡C

- a) Liên kết C–C có độ dài lớn nhất
- b) Liên kết C=C có năng lượng nhỏ nhất
- c) Liên kết C≡C có độ dài nhỏ nhất và năng lượng lớn nhất
- d) Liên kết có độ dài càng lớn thì năng lượng liên kết càng nhỏ và ngược lại

Câu 80. Xét các phát biểu về độ bền của một liên kết.

- a) Khi nhiều liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử, độ bền của liên kết sẽ giảm
- b) Độ bền của liên kết tăng khi độ dài của liên kết tăng
- c) Độ bền của liên kết tăng khi độ dài của liên kết giảm
- d) Độ bền của liên kết không phụ thuộc vào độ dài liên kết

Câu 81. Dựa vào độ âm điện người ta có thể phân loại liên kết thành liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không phân cực, liên kết cộng hóa trị phân cực.

- a) Liên kết cộng hóa trị không phân cực là liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron dùng chung không lệch về phía nguyên tử nào
- b) Liên kết cộng hóa trị phân cực là liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron dùng chung lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn
- c) Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử từ 0 đến 0,4 thì liên kết thuộc loại cộng hóa trị phân cực
- d) Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn hơn hoặc bằng 1,7 thì liên kết thuộc loại ion

Câu 82. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^1$, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron $1s^2, 2s^2, 2p^5$.

- a) X thuộc chu kì 4, nhóm IA, là một kim loại
- b) Y thuộc chu kì 2, nhóm VA, là một phi kim
- c) Liên kết giữa X và Y thuộc loại liên kết ion

d) Ở điều kiện thường, hợp chất tạo thành bởi X và Y ở trạng thái lỏng

Câu 83. Xét tính chất của hợp chất cộng hóa trị.

- a) Các hợp chất cộng hoá trị có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp hơn các hợp chất ion
- b) Các hợp chất cộng hoá trị có thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí trong điều kiện thường
- c) Các hợp chất cộng hoá trị đều dẫn điện tốt
- d) Các hợp chất cộng hoá trị không phân cực tan được trong dung môi không phân cực

Câu 84. Cho các chất: Nước, muối ăn, băng phiến ($C_{10}H_8$), butane (C_4H_{10}) và các giá trị nhiệt độ sôi của các chất trên không theo thứ tự -138°C , 80°C , 0°C , 801°C .

- a) Nhiệt độ nóng chảy của nước là 0°C
- b) Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là -138°C
- c) Nhiệt độ nóng chảy của butane là 80°C
- d) Muối ăn có nhiệt độ nóng chảy cao nhất vì muối ăn (NaCl) là hợp chất ion

Câu 85. Xét các phát biểu về liên kết sigma (σ) và liên kết pi (π).

- a) Chỉ có các AO có hình dạng giống nhau mới xen phủ với nhau để tạo liên kết
- b) Khi hình thành liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử, luôn có một liên kết σ
- c) Liên kết σ bền vững hơn liên kết π
- d) Có hai kiểu xen phủ hình thành liên kết là xen phủ trực và xen phủ bên

Câu 86. Xét các phát biểu về độ bền của một liên kết.

- a) Khi nhiều liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử, độ bền của liên kết sẽ giảm
- b) Độ bền của liên kết tăng khi độ dài của liên kết tăng
- c) Độ bền của liên kết tăng khi độ dài của liên kết giảm
- d) Độ bền của liên kết không phụ thuộc vào độ dài liên kết

Câu 87. Cho biết năng lượng liên kết $\text{H}-\text{I}$ và $\text{H}-\text{Br}$ lần lượt là 297 kJ/mol và 364 kJ/mol .

- a) Khi đun nóng, HI bị phân hủy (thành H_2 và I_2) ở nhiệt độ thấp hơn so với HBr (thành H_2 và Br_2)
- b) Liên kết $\text{H}-\text{Br}$ là bền vững hơn so với liên kết $\text{H}-\text{I}$
- c) Khi đun nóng, HI bị phân hủy (thành H_2 và I_2) ở nhiệt độ cao hơn so với HBr (thành H_2 và Br_2)
- d) Liên kết $\text{H}-\text{I}$ dài hơn liên kết $\text{H}-\text{Br}$

D. Bài tập trả lời ngắn

Bài 8. Trong phân tử ammonia (NH_3), số cặp electron chung giữa nguyên tử nitrogen và các nguyên tử hydrogen là bao nhiêu? 

Bài 9. Trong phân tử methane (CH_4), số cặp electron chung giữa nguyên tử carbon và các nguyên tử hydrogen là bao nhiêu? 

Bài 10. Cho các hợp chất sau: Na_2O , H_2 , H_2O , HCl , Cl_2 , O_3 . Có bao nhiêu chất mà trong phân tử chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực? 

Bài 11. Cho dãy các chất: N_2 , H_2 , NH_3 , NaCl , HCl , H_2O . Có bao nhiêu chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị phân cực? 



Bài 12. Cho các phân tử: H_2 ; CO_2 ; Cl_2 ; N_2 ; I_2 ; C_2H_4 ; C_2H_2 . Có bao nhiêu phân tử có liên kết ba trong phân tử?

🔑

Bài 13. Tổng số liên kết σ và π có trong phân tử C_2H_4 là bao nhiêu?

🔑

Bài 14. Trong các phân tử: CO_2 , NH_3 , C_2H_2 , SO_2 , H_2O có bao nhiêu phân tử phân cực?

🔑

Bài 15. Số orbital của cả hai nguyên tử N tham gia xen phủ tạo liên kết trong phân tử N_2 là bao nhiêu?

🔑

Bài 16. Cho các phát biểu:

- Nếu cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử thì đó là liên kết cộng hóa trị không cực.
- Nếu cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử thì đó là liên kết cộng hóa trị có cực.
- Cặp electron chung luôn được tạo nên từ 2 electron của cùng một nguyên tử.
- Cặp electron chung được tạo nên từ 2 electron hóa trị. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

🔑

Bài 17. Cho các phát biểu sau về phân tử CO_2 :

- Liên kết giữa hai nguyên tử C và O là liên kết cộng hoá trị không phân cực
- Liên kết giữa hai nguyên tử C và O là liên kết cộng hoá trị phân cực
- Phân tử CO_2 có 4 electron hoá trị riêng.
- Phân tử CO_2 có 4 cặp electron hoá trị riêng.
- Trong phân tử CO_2 có 3 liên kết σ và 1 liên kết π
- Trong phân tử CO_2 có 2 liên kết σ và 2 liên kết π
- Trong phân tử CO_2 có 1 liên kết σ và 3 liên kết π

Có bao nhiêu phát biểu không đúng trong các phát biểu trên?

🔑



LIÊN KẾT HYDROGEN VÀ TƯƠNG TÁC VAN DER WAALS

Học xong bài này, em có thể:


- ◇ Trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. Vận dụng để giải thích được sự xuất hiện liên kết hydrogen.
- ◇ Nêu được vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước.
- ◇ Nêu được khái niệm về tương tác van der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất.



Hãy tưởng tượng một con tắc kè đang leo trèo thoăn thoắt trên bức tường nhẵn bóng. Bàn chân của chúng có hàng triệu sợi lông siêu nhỏ, tạo ra một lực hút với bề mặt tường đủ mạnh để chống lại trọng lực. Đó chính là sức mạnh của tương tác Van der Waals.

“Tương tác Van der Waals là một trong những lực liên kết yếu tồn tại giữa các phân tử. Ngoài ra, còn một loại lực liên kết yếu khác nữa là liên kết Hydrogen.”


“Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bản chất và vai trò của hai loại lực này trong việc quyết định tính chất của các chất và các hiện tượng trong tự nhiên.”



I. Nội dung bài học


1 Liên kết hydrogen

★ Tìm hiểu về liên kết hydrogen



Hình 4.1: Liên kết hydrogen giữa các phân tử nước





Hình 4.2: Liên kết hydrogen giữa các phân tử ammonia


Liên kết hydrogen là một loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn) còn cặp electron riêng. Các nguyên tử có độ âm điện lớn thường gặp trong liên kết hydrogen là N, O, F.

Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:


- ◇ Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như F, O, N, ...
- ◇ Nguyên tử F, O, N, ... liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron hoá trị chưa liên kết.

★ Tìm hiểu vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của nước

- ◇ Nhờ có liên kết hydrogen mà ở điều kiện thường nước ở thể lỏng, có nhiệt độ sôi cao (100°C).
- ◇ Nước còn là một dung môi tốt, không chỉ hòa tan được nhiều hợp chất ion, mà còn hòa tan được nhiều hợp chất có liên kết cộng hóa trị phân cực. Đặc biệt, các hợp chất có thể tạo liên kết hydrogen với nước thường tan tốt trong nước.



Hình 4.3: Liên kết hydrogen giữa nước và rượu




Hình 4.4: Liên kết hydrogen giữa nước và Ammonia





Em có biết?

Nước ở trạng thái rắn có thể tích lớn hơn khi ở trạng thái lỏng. Đó là do nước đá có cấu trúc tinh thể phân tử với bốn phân tử H_2O phân bố ở bốn đỉnh của một tứ diện đều, bên trong là cấu trúc rỗng (Hình 4.5). Điều này lý giải tại sao nước đá nổi được trên mặt nước lỏng.




Hình 4.5: Cấu trúc tinh thể phân tử nước đá

② Tương tác van der waals

★ Giới thiệu về tương tác van der Waals (van đơ Van)



Hình 4.6: Lưỡng cực tạm thời được hình thành do sự phân bố không đồng đều của các electron trong phân tử



Hình 4.7: Mạng lưới tương tác lưỡng cực cảm ứng được tạo thành bởi lưỡng cực tạm thời



Tương tác van der Waals là lực tương tác yếu giữa các phân tử, được hình thành do sự xuất hiện của các lưỡng cực tạm thời và lưỡng cực cảm ứng.

★ Tìm hiểu ảnh hưởng của tương tác van der Waals đến nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi các chất



Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất. Khi khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng thì tương tác van der Waals tăng.



II. Bài tập


Dạng 1. Lý thuyết về liên kết hydrogen và tương tác Vanderwalls



Phương pháp giải



Liên kết hydrogen hình thành khi nguyên tử H liên kết cộng hóa trị với một nguyên tử có độ âm điện lớn nên nguyên tử hydro mang δ^+ (X-H với X là F, O, N) tương tác tĩnh điện yếu với nguyên tử Y có độ âm điện lớn và còn cặp electron tự do (Y là F, O, N).



- ◇ Liên kết hydrogen là một liên kết yếu, biểu diễn bằng dấu 3 chấm “...”.
- ◇ Độ mạnh của liên kết hydrogen phụ thuộc vào độ phân cực của liên kết H-X và mật độ electron (hoặc độ âm điện) của nguyên tử Y.
 - ☆ Liên kết X-H càng phân cực thì liên kết hydrogen càng bền vững.
 - ☆ Nguyên tử Y có mật độ electron (hoặc độ âm điện) càng lớn thì liên kết hydrogen càng bền vững.
- ◇ Liên kết hydrogen làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tăng sức căng bề mặt, độ tan.
- ◇ Tương tác van der Waals là tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực được hình thành giữa các phân tử hay nguyên tử.
- ◇ Tương tác van der Waals phụ thuộc vào hai yếu tố chính:
 - ☆ Số lượng electron (số proton) trong nguyên tử.
 - ☆ Điểm tiếp xúc giữa các phân tử.
- ◇ Tương tác van der Waals làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất và giải thích trạng thái tồn tại của các chất.
- ◇ Độ mạnh (độ bền) theo thứ tự: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị > liên kết hydrogen > tương tác van der Waals.

A. Bài tập tự luận

Bài 1. Vẽ sơ đồ biểu diễn liên kết hydrogen giữa

- 1 Hai phân tử hydrogen fluoride (HF).
- 2 Hai phân tử ammonia (NH₃).

Bài 2. Vẽ sơ đồ biểu diễn liên kết hydrogen giữa

- 1 Hai phân tử H₂O.



2 Phân tử hydrogen fluoride (HF) và phân tử nước.

Bài 3. Giải thích vì sao H_2O có phân tử khối (18) nhỏ hơn H_2S (34) nhưng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của H_2O lại cao hơn phân tử H_2S ? Bảng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của H_2O và H_2S tại áp suất 1 bar

Chất	Khối lượng phân tử	Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)
H_2O	18	0	100
H_2S	34	-82,3	-60,3

Bài 4. Hãy giải thích sự tăng dần nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các khí hiếm? Cho bảng sau về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các khí hiếm

Halogen	He	Ne	Ar	Xe	Kr	Rn
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)	-269	-246	-186	-152	-108	-62
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	-272	-247	-189	-157	-119	-71

Bài 5. Hãy giải thích vì sao butane có nhiệt độ sôi ($-0,5^{\circ}\text{C}$) cao hơn so với isobutan ($-11,7^{\circ}\text{C}$)?

Bài 6. Hãy giải thích vì sao ở điều kiện thường Br_2 ở trạng thái lỏng, còn Cl_2 ở trạng thái khí?

Bài 7. Hoàn thành các sơ đồ tạo thành ion sau

- $\text{K} \longrightarrow \text{K}^+ + ?$
- $\text{Ca} \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + ?$
- $\text{Br} + ? \longrightarrow \text{Br}^-$
- $\text{S} + ? \longrightarrow \text{S}^{2-}$

Bài 8. Viết cấu hình electron của các ion: Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , F^- , O^{2-} . Các ion trên có cấu hình electron giống khí hiếm nào?

Bài 9. Phân đạm cung cấp nitrogen cho cây dưới dạng nitrate ion (NO_3^-) và ammonium ion (NH_4^+). Có bao nhiêu phân tử hợp chất ion được tạo ra từ các ion: NH_4^+ , NO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} ?

Bài 10. Cho các ion sau: K^+ , Ca^{2+} , Al^{3+} , Cl^- , O^{2-} . Hãy viết công thức phân tử các hợp chất được tạo nên từ các ion trên.

Bài 11. Cho các phát biểu sau về tính chất của hợp chất ion:

- Trong hợp chất ion liên kết được tạo thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
- Hợp chất ion được hình thành giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình,
- Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.
- Thường tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường.
- Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

(f) Thường tồn tại ở trạng thái rắn ở điều kiện thường.

Có bao nhiêu tính chất là đúng trong hợp chất ion?

Bài 12. Giải thích sự hình thành liên kết ion trong các phân tử: KCl, Na₂O, MgCl₂.

Bài 13. Nêu cấu trúc tinh thể sodium chloride (NaCl), vì sao muối ăn có nhiệt độ nóng chảy cao?

Bài 14. Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau.

Công thức hợp chất ion	Cation	Anion
CaCl ₂	?	?
?	Na ⁺	O ²⁻
KF	?	?

Bài 15. Quặng boxide là một loại quặng có nguồn gốc từ đá núi lửa có màu hồng, nâu được hình thành từ quá trình phong hóa các đá giàu nhôm hoặc tích tụ từ các quặng có trước bởi quá trình xói mòn. Quặng boxide phân bố chủ yếu trong vành đai xung quanh xích đạo đặc biệt trong môi trường nhiệt đới. Công thức của quặng boxide là Al₂O₃ · 2H₂O. Hãy trình bày sự hình thành liên kết ion trong phân tử aluminium oxide (Al₂O₃).

Bài 16. Zinc oxide (ZnO). Hãy trình bày sự hình thành liên kết ion trong phân tử zinc oxide.

Bài 17. Hãy biểu diễn sự hình thành các cặp electron chung cho phân tử O₂. Từ đó, viết công thức Lewis của phân tử này.

Bài 18. Hãy biểu diễn sự hình thành các cặp electron chung cho phân tử Cl₂, CH₄. Từ đó, viết công thức Lewis của các phân tử này.

Bài 19. Hãy biểu diễn sự hình thành các cặp electron chung cho phân tử C₂H₄, C₂H₂. Từ đó, viết công thức Lewis của các phân tử này.

Bài 20. Hãy biểu diễn sự hình thành các cặp electron chung cho phân tử H₂S. Từ đó, viết công thức Lewis của phân tử này.

Bài 21. Dựa theo độ âm điện, hãy cho biết loại liên kết trong các phân tử: Na₂O, H₂O, CH₄, NaCl. Cho bảng giá trị độ âm điện

Nguyên tố	Na	S	H	C	Cl	O
Độ âm điện	0,93	2,58	2,20	2,55	3,16	3,44

Bài 22. Sắp xếp các chất sau theo chiều tăng dần độ phân cực của liên kết: HCl, HF, HBr, HI. Biết độ âm điện các nguyên tố được cho ở bảng sau:

Nguyên tố	H	F	Cl	Br	I
Độ âm điện	2,20	3,98	3,16	2,96	2,66



Bài 23. Vẽ sơ đồ biểu diễn liên kết hydrogen giữa hai phân tử H_2O .

Bài 24. Giải thích vì sao nước đá nhẹ và nổi trên mặt nước?

Bài 25. Cho bảng sau về nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của NH_3 và PH_3

Chất	NH_3	PH_3
Nhiệt độ sôi	$-33,34^\circ\text{C}$	$-87,7^\circ\text{C}$
Độ tan	89,9 g/ 100 ml ở 0°C	31,2 mg/ 100 ml (17°C)

Giải thích vì sao nhiệt độ sôi và độ tan của NH_3 lớn hơn PH_3

Bài 26. Cho bảng nhiệt độ sôi của ethanol và dimethyl ether.

Chất	Khối lượng phân tử	Nhiệt độ sôi
ethanol	46	$78,3^\circ\text{C}$
dimethyl ether	46	-23°C

Hãy giải thích vì sao hai chất có khối lượng phân tử bằng nhau nhưng nhiệt độ sôi lại khác xa nhau.

Bài 27. Giải thích vì sao nhện nước có thể di chuyển trên mặt nước?

Bài 28. Cho bảng sau về nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các halogen

Halogen	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
Trạng thái ở 25°C	Khí	Khí	Lỏng	Rắn
Nhiệt độ sôi ($^\circ\text{C}$)	$-188,1$	$-34,1$	59,2	185,5
Nhiệt độ nóng chảy ($^\circ\text{C}$)	$-219,6$	$-101,0$	$-7,3$	113,6

Hãy giải thích sự tăng dần nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các halogen.

Bài 29. Giải thích vì sao có thể thu được ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) bằng phương pháp chưng cất?

Bài 30. Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của halides. Hãy giải thích xu hướng nhiệt độ sôi của các halides.

Bài 31. Giải thích vì sao propanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) tan trong nước nhưng propan $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ thì không?

Bài 32. Giải thích vì sao nhiệt độ sôi của butan (36°C) cao hơn so với neopentane ($9,5^\circ\text{C}$)?

Bài 33. Giải thích vì sao H_2O có nhiệt độ sôi (100°C) cao hơn phân tử NH_3 . $33,34^\circ\text{C}$?

Bài 34. Giải thích vì sao thần lùn có thể bỏ trên trần nhà?

Bài 35. Hãy giải thích lí do khác nhau về nhiệt độ sôi của các cặp chất có cùng số electron sau đây: CH_3CH_3 ($184,5\text{ K}$) và $\text{CH}_3 - \text{F}$ ($194,7\text{ K}$).

Bài 36. Ở điều kiện thường, các khí hiếm tồn tại ở dạng khí đơn nguyên tử. Hãy giải thích sự biến đổi nhiệt

độ sôi của các khí hiếm từ He tới Rn theo số liệu cho trong bảng sau:

Khí hiếm	He	Ne	Ar	Kr	Xn	Rn
Số hiệu nguyên tử	2	10	18	36	54	86
Nhiệt độ sôi (° C)	-269	-246	-186	-152	-108	-62

Bài 37. Trong dung dịch, acetic acid có thể tồn tại dạng dimer (hai phân tử kết hợp) do sự hình thành liên kết hydrogen giữa hai phân tử. Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn liên kết hydrogen giữa hai phân tử acetic acid hình thành dimer.

Bài 38. Hãy giải thích sự biến đổi về nhiệt độ nóng chảy của dãy hydrogen halide sau.

Halogen halide	HF	HCl	HBr	HI
Nhiệt độ nóng chảy (° C)	-83,1	-114,8	-88,5	-50,8

Bài 39. Nhiệt độ sôi của ba hợp chất được cho trong bảng sau:

Hợp chất	Khối lượng phân tử (g mol^{-1})	Nhiệt độ sôi (°C)
2-hexanone	100,16	128,0
heptane	100,20	98,0
1-hexanol	102,17	156,0

Không cần tra cứu cấu trúc, em hãy trả lời các câu hỏi sau về ba hợp chất này:

- Hợp chất nào có thể hình thành liên kết hydrogen?
- Hợp chất nào phân cực nhưng không hình thành liên kết hydrogen?
- Hợp chất nào ít phân cực, không tạo liên kết hydrogen?

Bài 40. Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử sau:

- methanol (CH_3OH) và nước.
- ethylene glycol ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) và nước.

Từ đó nhận xét tính tan của methanol và ethylene glycol trong nước.

Bài 41. Ethylene glycol ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) là một chất chống đông trong công nghiệp ô tô, hàng không do có khả năng can thiệp vào liên kết hydrogen của nước, làm các phân tử nước khó liên kết hơn, khiến nước khó đóng băng hơn. Biểu diễn liên kết hydrogen liên phân tử và nội phân tử trong ethylene glycol.

Bài 42. Hãy so sánh tương tác van der Waals với liên kết ion.

Bài 43. Thiết bị chụp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) sử dụng nitrogen lỏng để làm mát nam châm siêu dẫn. Nitrogen lỏng sôi ở $\sim 195,8^\circ\text{C}$. Dự đoán nhiệt độ sôi của oxygen lỏng sẽ cao hay thấp hơn so với nitrogen lỏng? Giải thích.

Bài 44. Giải thích vì sao các tương tác van der Waals giữa các phân tử có kích thước lớn lại mạnh hơn so với



các phân tử có kích thước nhỏ.

Bài 45. Giải thích tại sao ở điều kiện thường, các nguyên tố trong nhóm halogen như fluorine và chlorine ở trạng thái khí, còn bromine ở trạng thái lỏng và iodine ở trạng thái rắn.

Bài 46. Nhiệt độ sôi của các hợp chất với hydrogen của các nguyên tố nhóm VA, VIA và VIIA được biểu diễn qua đồ thị sau:

- 1 Giải thích nhiệt độ sôi cao bất thường của các hợp chất với hydrogen của các nguyên tố đầu tiên trong mỗi nhóm.
- 2 Nhận xét nhiệt độ sôi của các hợp chất với hydrogen của các nguyên tố còn lại ở mỗi nhóm và giải thích nguyên nhân sự biến đổi nhiệt độ sôi của chúng.

Bài 47. So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của pentane ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$) và neopentane ($(\text{CH}_3)_4\text{C}$). Giải thích nguyên nhân sự khác biệt trên.

Bài 48. Giải thích vì sao tetrachloromethane (CCl_4) tuy là phân tử không cực nhưng có nhiệt độ sôi cao hơn trichloromethane (CHCl_3) là phân tử có cực.

Bài 49. Cho các chất sau: C_2H_6 ; CH_3OH ; CH_3COOH . Chất nào có thể tạo được liên kết hydrogen? Vì sao?

Bài 50. Khối lượng mol (g/mol) của nước, ammonia và methane lần lượt bằng 18, 17 và 16. Nước sôi ở 100°C , còn ammonia sôi ở $-33,35^\circ\text{C}$ và methane sôi ở $-161,58^\circ\text{C}$. Giải thích vì sao các chất trên có khối lượng mol xấp xỉ nhau nhưng nhiệt độ sôi của chúng lại chênh lệch nhau.

Bài 51. Trong dung dịch ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) có những kiểu liên kết hydrogen nào? Kiểu nào bền nhất và kém bền nhất? Mô tả bằng hình vẽ.

Bài 52. Trong phân tử nước và ammonia, phân tử nào có thể tạo nhiều liên kết hydrogen hơn? Vì sao?

Bài 53. Dầu mỏ chứa hỗn hợp nhiều hydrocarbon như: octane (C_8H_{18}) có trong xăng; butane (C_4H_{10}) có trong gas. Khi chưng cất dầu mỏ, octane hay butane sẽ bay hơi trước? Giải thích.

Bài 54. Cho các chất và các trị số nhiệt độ sôi ($^\circ\text{C}$) sau: H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te và -42 ; -2 ; 100 ; -61 . Ghép các trị số nhiệt độ sôi vào mỗi chất sao cho phù hợp và giải thích.

B. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A Bất kì phân tử nào có chứa nguyên tử hydrogen cũng có thể tạo liên kết hydrogen với phân tử cùng loại
- B Liên kết hydrogen là liên kết hình thành do sự góp chung cặp electron hoá trị giữa nguyên tử hydrogen và nguyên tử có độ âm điện lớn
- C Liên kết hydrogen là loại liên kết yếu nhất giữa các phân tử
- D Ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của chất là mạnh hơn ảnh hưởng của tương tác van der Waals

Câu 2. Cho các phân tử: H_2O , NH_3 , HF , H_2S , CO_2 , HCl . Số phân tử có thể tạo liên kết hydrogen với phân tử cùng loại là

A 3

B 4

C 5

D 6

Câu 3. Thứ tự nào sau đây thể hiện độ mạnh giảm dần của các loại liên kết?

- A** Liên kết ion > liên kết cộng hoá trị > liên kết hydrogen > tương tác van der Waals
- B** Liên kết ion > liên kết cộng hoá trị > tương tác van der Waals > liên kết hydrogen
- C** Liên kết cộng hoá trị > liên kết ion > liên kết hydrogen > tương tác van der Waals
- D** Tương tác van der Waals > liên kết hydrogen > liên kết cộng hoá trị > liên kết ion

Câu 4. Giữa các nguyên tử He có thể có loại liên kết nào?

- A** Liên kết cộng hoá trị
- B** Liên kết hydrogen
- C** Tương tác van der Waals
- D** Không có bất kì liên kết nào

Câu 5. Quy tắc octet không được sử dụng khi xem xét sự hình thành của hai loại liên kết hoặc tương tác nào sau đây?

- (1) Liên kết cộng hoá trị.
- (2) Liên kết ion.
- (3) Liên kết hydrogen.
- (4) Tương tác van der Waals.

- A** (1) và (2)
- B** (2) và (3)
- C** (1) và (3)
- D** (3) và (4)

Câu 6. Nếu giữa phân tử chất tan và dung môi có thể tạo thành liên kết hydrogen hoặc có tương tác van der Waals càng mạnh với nhau thì càng tan tốt vào nhau. Lí do nào sau đây là phù hợp để giải thích dầu hỏa (thành phần chính là hydrocarbon) không tan trong nước?

- A** Cả nước và dầu đều là các phân tử có cực
- B** Nước là phân tử phân cực và dầu là không/ít phân cực
- C** Nước là phân tử không phân cực và dầu là phân cực
- D** Cả nước và dầu đều không phân cực

Câu 7. Ethanol tan vô hạn trong nước do

- A** cả nước và ethanol đều là phân tử phân cực
- B** nước và ethanol có thể tạo liên kết hydrogen với nhau
- C** ethanol có thể tạo liên kết hydrogen với các phân tử ethanol khác
- D** ethanol và nước có tương tác van der Waals mạnh

Câu 8. Chất nào trong số các chất sau tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện thường?

- A** CH_3OH
- B** CF_4
- C** SiH_4
- D** CO_2

Câu 9. Dựa vào liên kết giữa các phân tử, hãy cho biết halogen nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất.

- A** F_2
- B** Cl_2
- C** Br_2
- D** I_2

Câu 10. Hợp chất nào sau đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử?

- A** H_2S
- B** PH_3
- C** HI
- D** CH_3OH

Câu 11. Mặc dù chlorine có độ âm điện là 3,16 xấp xỉ với nitrogen là 3,04 nhưng giữa các phân tử HCl không tạo được liên kết hydrogen với nhau, trong khi giữa các phân tử NH_3 tạo được liên kết hydrogen với



nhau, nguyên nhân là do

- A** độ âm điện của chlorine nhỏ hơn của nitrogen
- B** phân tử NH_3 chứa nhiều nguyên tử hydrogen hơn phân tử HCl
- C** tổng số nguyên tử trong phân tử NH_3 nhiều hơn so với phân tử HCl
- D** kích thước nguyên tử chlorine lớn hơn nguyên tử nitrogen nên mật độ điện tích âm trên chlorine không đủ lớn để hình thành liên kết hydrogen

Câu 12. Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng liên kết hydrogen giữa 2 phân tử hydrogen fluoride (HF)?

- A** $\text{H}^{\delta+} - \text{F}^{\delta-} \dots \text{H}^{\delta+} - \text{F}^{\delta-}$
- B** $\text{H}^{\delta+} - \text{F}^{\delta+} \dots \text{H}^{\delta-} - \text{F}^{\delta-}$
- C** $\text{H}^{\delta-} - \text{F}^{\delta+} \dots \text{H}^{\delta-} - \text{F}^{\delta+}$
- D** $\text{H}^{\delta+} - \text{F}^{\delta-} \dots \text{H}^{\delta+} - \text{F}^{\delta+}$

Câu 13. Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hydrogen liên phân tử?

- A** Là lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H (thường trong các liên kết H-F, H-N, H-O ở phân tử này) với một trong các nguyên tử có độ âm điện mạnh (thường là N, O, F) ở một phân tử khác
- B** Là lực hút giữa các phân tử khác nhau
- C** Là lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu
- D** Là lực hút giữa các nguyên tử trong một hợp chất cộng hoá trị

Câu 14. Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hydrogen nội phân tử?

- A** Là lực hút giữa các proton của nguyên tử này với các electron ở nguyên tử khác
- B** Là lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử H (thường trong các liên kết H-F, H-N, H-O) ở một phân tử với một trong các nguyên tử có độ âm điện mạnh (thường là N, O, F) ở ngay chính phân tử đó
- C** Là lực hút giữa các ion trái dấu
- D** Là lực hút giữa các phân tử có chứa nguyên tử hydrogen

Câu 15. Tương tác van der Waals xuất hiện là do sự hình thành các lưỡng cực tạm thời cũng như các lưỡng cực cảm ứng. Các lưỡng cực tạm thời xuất hiện là do sự chuyển động của

- A** các nguyên tử trong phân tử
- B** các electron trong phân tử
- C** các proton trong hạt nhân
- D** các neutron và proton trong hạt nhân

Câu 16. Trong các khí hiếm sau, khí hiếm có nhiệt độ sôi cao nhất là

- A** Ne
- B** Xe
- C** Ar
- D** Kr

Câu 17. Liên kết hydrogen là loại liên kết hoá học được hình thành giữa các nguyên tử nào sau đây?

- A** Phi kim và hydrogen trong hai phân tử khác nhau
- B** Phi kim và hydrogen trong cùng một phân tử
- C** Phi kim có độ âm điện lớn và nguyên tử hydrogen
- D** F, O, N, ... có độ âm điện lớn, đồng thời có cặp electron hoá trị chưa liên kết và nguyên tử hydrogen linh động

Câu 18. Tương tác van der Waals được hình thành do

- A** tương tác tĩnh điện lưỡng cực – lưỡng cực giữa các nguyên tử
- B** tương tác tĩnh điện lưỡng cực – lưỡng cực giữa các phân tử
- C** tương tác tĩnh điện lưỡng cực – lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử
- D** lực hút tĩnh điện giữa các phân tử phân cực

Câu 19. Chất nào sau đây có thể tạo liên kết hydrogen?

- A** PF_3
- B** CH_4
- C** CH_3OH
- D** H_2S

Câu 20. Chất nào sau đây *không* thể tạo được liên kết hydrogen?

- A** H_2O
- B** CH_4
- C** CH_3OH
- D** NH_3

Câu 21. Tương tác van der Waals tồn tại giữa những

- A** ion
- B** hạt proton
- C** hạt neutron
- D** phân tử

Câu 22. Cho các chất sau: F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 . Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

- A** F_2
- B** Cl_2
- C** Br_2
- D** I_2

Câu 23. Cho các chất sau: F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 . Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

- A** F_2
- B** Cl_2
- C** Br_2
- D** I_2

Câu 24. Dãy chất nào sau đây xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần?

- A** H_2O , H_2S , CH_4
- B** H_2S , CH_4 , H_2O
- C** CH_4 , H_2O , H_2S
- D** CH_4 , H_2S , H_2O

Câu 25. Cho các khí hiếm sau: He, Ne, Ar, Kr, Xe. Khí hiếm có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất lần lượt là

- A** Xe và He
- B** Ar và Ne
- C** He và Xe
- D** He và Kr

Câu 26. Cho các chất sau: C_2H_6 ; H_2O ; NH_3 ; PF_3 ; $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Số chất tạo được liên kết hydrogen là

- A** 2
- B** 3
- C** 4
- D** 5

Câu 27. Giữa H_2O và HF có thể tạo ra ít nhất bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen?

- A** 2
- B** 3
- C** 4
- D** 5

Câu 28. Nhiệt độ sôi của từng chất methane, ethane, propane và butane là một trong bốn nhiệt độ sau: 0°C ; -164°C ; -42°C và -88°C . Nhiệt độ sôi -88°C là của chất nào sau đây?

- A** methane
- B** propane
- C** ethane
- D** butane

C. Trắc nghiệm đúng / sai

Câu 29. Trong các chất sau, chất có khả năng tạo liên kết hydrogen giữa các phân tử là:

Phát biểu	Đ	S
a) H_2O , NH_3 , HF		



b) CH_4 , CCl_4 , SiH_4		
c) HF , H_2O , H_2S		
d) HCl , HBr , HI		

Câu 30. Liên kết hydrogen đóng vai trò quan trọng trong tính chất của các hợp chất.

Phát biểu	Đ	S
a) Nhiệt độ sôi của nước cao do liên kết hydrogen		
b) ADN duy trì cấu trúc nhờ liên kết hydrogen giữa các base		
c) H_2S có nhiệt độ sôi cao hơn H_2O nhờ liên kết hydrogen		
d) Rượu ethanol có khả năng tạo liên kết hydrogen với nước		

Câu 31. Tương tác van der Waals có vai trò quan trọng trong tính chất của chất rắn và lỏng.

Phát biểu	Đ	S
a) Là loại lực yếu, ảnh hưởng chủ yếu đến các phân tử không cực		
b) Là nguyên nhân chính làm chất khí thực khác chất khí lý tưởng		
c) Các phân tử không cực không chịu tác dụng của lực này		
d) Tăng cường độ với sự tăng khối lượng phân tử		

Câu 32. Trong liên kết hydrogen, các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền liên kết bao gồm:

Phát biểu	Đ	S
a) Độ âm điện của nguyên tử tham gia liên kết		
b) Độ lớn của liên kết đôi trong phân tử		
c) Số lượng proton trong hạt nhân của nguyên tử		
d) Góc tạo bởi các nguyên tử trong liên kết hydrogen		

Câu 33. Chất có khả năng tạo nhiều liên kết hydrogen trong nước:

Phát biểu	Đ	S
a) Glucose nhờ nhiều nhóm OH		
b) DNA nhờ các base nitơ có liên kết hydrogen		



c) Metan vì tính đối xứng cao		
d) Amino acid nhờ nhóm NH_2 và COOH		

Câu 34. Trong các hợp chất, tương tác van der Waals và liên kết hydrogen có vai trò khác nhau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tương tác van der Waals phổ biến trong phân tử không cực		
b) Liên kết hydrogen tồn tại trong mọi phân tử chứa hydrogen		
c) Liên kết hydrogen mạnh hơn van der Waals		
d) Van der Waals đóng vai trò chính trong sự hóa lỏng của khí hiếm		

Câu 35. Nhiệt độ sôi của các chất phụ thuộc vào lực tương tác giữa các phân tử:

Phát biểu	Đ	S
a) Nước có nhiệt độ sôi cao nhờ liên kết hydrogen		
b) Khí hiếm như Neon có nhiệt độ sôi cao nhờ liên kết hydrogen		
c) HF có nhiệt độ sôi cao do liên kết hydrogen mạnh		
d) Tương tác van der Waals yếu dẫn đến nhiệt độ sôi thấp của CH_4		

Câu 36. Sự khác biệt giữa liên kết hydrogen và tương tác van der Waals:

Phát biểu	Đ	S
a) Liên kết hydrogen yêu cầu có nguyên tử có độ âm điện cao		
b) Tương tác van der Waals xuất hiện ở mọi phân tử		
c) Liên kết hydrogen yếu hơn tương tác van der Waals		
d) Van der Waals không yêu cầu nguyên tử có độ âm điện cao		

Câu 37. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của nước:

Phát biểu	Đ	S
a) Liên kết hydrogen làm nước có nhiệt dung riêng cao		
b) Liên kết hydrogen giúp nước tồn tại ở thể lỏng ở nhiệt độ phòng		
c) Van der Waals là lực chủ yếu làm nước có độ nhớt cao		



d) Liên kết hydrogen làm nước có sức căng bề mặt lớn

Câu 38. Ứng dụng thực tế của liên kết hydrogen và van der Waals:

Phát biểu	Đ	S
a) DNA duy trì cấu trúc nhờ liên kết hydrogen		
b) Sự ngưng tụ của hơi nước là nhờ liên kết hydrogen		
c) Chất không cực tan trong nước nhờ liên kết hydrogen		
d) Các khí hiếm hóa lỏng nhờ lực van der Waals		

Câu 39. Các yếu tố quyết định khả năng tạo liên kết hydrogen của một hợp chất:

Phát biểu	Đ	S
a) Sự có mặt của nguyên tử H liên kết với nguyên tố có độ âm điện lớn như O, N, F		
b) Sự có mặt của cặp electron chưa liên kết trên nguyên tử âm điện cao		
c) Số lượng nguyên tử hydrogen trong phân tử càng nhiều thì liên kết hydrogen càng bền		
d) Cấu trúc hình học của phân tử cho phép tương tác không gian thuận lợi		

Câu 40. Sự ảnh hưởng của tương tác van der Waals đến tính chất của chất rắn:

Phát biểu	Đ	S
a) Làm tăng độ bền cơ học của các phân tử không cực trong chất rắn		
b) Quyết định nhiệt độ nóng chảy của các phân tử không cực		
c) Chỉ xuất hiện trong các phân tử cực		
d) Làm tăng độ bám dính giữa các bề mặt phân tử		

Câu 41. Tương tác van der Waals và liên kết hydrogen trong các chất sinh học:

Phát biểu	Đ	S
a) Giữ cho protein có cấu trúc bậc ba ổn định		
b) Gắn kết các base nitơ trong ADN nhờ liên kết hydrogen		
c) Tạo liên kết bền vững trong cấu trúc tinh thể của kim cương		
d) Tham gia vào sự gắn kết của lipid trong màng tế bào		



Câu 42. Liên kết hydrogen và van der Waals ảnh hưởng đến trạng thái vật chất:

Phát biểu	Đ	S
a) Liên kết hydrogen giúp nước có tính chất đặc biệt ở thể lỏng		
b) Tương tác van der Waals giúp các chất khí hiếm tồn tại ở trạng thái lỏng		
c) Liên kết hydrogen yếu hơn tương tác van der Waals nên ít ảnh hưởng đến trạng thái của chất lỏng		
d) Van der Waals đóng vai trò chính trong sự đông đặc của khí hiếm		

Câu 43. Đặc điểm khác biệt giữa liên kết hydrogen và tương tác van der Waals:

Phát biểu	Đ	S
a) Liên kết hydrogen xảy ra khi có nguyên tử H liên kết với nguyên tố có độ âm điện lớn		
b) Van der Waals phổ biến ở các phân tử không cực hoặc ít cực		
c) Liên kết hydrogen không phụ thuộc vào sự có mặt của cặp electron tự do		
d) Van der Waals yếu hơn nhiều so với liên kết hydrogen		

