

# Esercizi prob 3

December 28, 2024

## 1 Esercizio 3.1

Per BC1,  $\forall \varepsilon$

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon, i.o.) = 0$$

Ovvero:

$$\forall \varepsilon, \text{ per q.o. } \omega, \exists N : |X_n(\omega) - X(\omega)| \leq \varepsilon$$

Che è quasi la tesi (basta prendere solo una quantità numerabile di  $\varepsilon$  che però tendano a 0).  $\Omega_0$  sarà l'intersezione (numerabile) di tutti gli insiemi per cui vale la formula scritta sopra.

## 2 Esercizio 3.2

### 2.1 (1)

$$\mathbb{P}(\{X_n \neq 0\}) = \frac{1}{k(n)} \rightarrow 0$$

### 2.2 (2)

Dato  $\omega$ , per ogni valore distinto di  $k$  esiste un valore di  $n$  tale che  $X_n(\omega) = 1$ , quindi  $X_n(\omega) = 1$  infinite volte.

Quindi

$$\nexists \omega : X_n(\omega) \rightarrow \omega$$

(tranne forse  $\omega = 0$  o  $\omega = 1$  ma non ho voglia di controllare).

### 3 Esercizio 3.3

3.1  $Y_n \rightarrow 0$

3.2  $(Y_n)$  non converge q.c.

### 4 Esercizio 3.4

$$\mathbb{P}(|X_1| > x) = \left( \mathbb{P} \left( \bigcap_n \{|X_n| > x\} \right) \right)^{\frac{1}{n}} = \exp \left[ \frac{1}{n} \ln \mathbb{P} \left( \bigcap_n \{|X_n| > x\} \right) \right]$$

### 5 Esercizio 3.5

5.1 (1):  $\#(C_F^0)^c \leq \aleph_0$  ( $\Rightarrow \overline{C_F^0} = \mathbb{R}$ )

$F$  è continuo a destra:  $\forall x \in (C_F^0)^c$  si possono definire

$$\omega_x^- := \lim_{y \nearrow x} F(y); \quad \omega_x^+ := F(x)$$

Si ha che  $\exists q_x \in (\omega_x^-, \omega_x^+)$  t.c.  $q_x \in \mathbb{Q}$ . Inoltre, siccome  $F$  è non decrescente,  $q_x \neq q_y \quad \forall x \neq y$ , quindi abbiamo creato una funzione iniettiva  $(C_F^0)^c \rightarrow \mathbb{Q}$

5.2 (2): Eventualmente  $F_n(z) > \omega \wedge X_n^+(\omega) \leq z$

$$z > \inf \{y | F_X(y) > \omega\} \implies F_X(z) > \omega$$

Siccome per ipotesi  $z \in C_F^0$ :

$$F_{X_n}(z) \rightarrow F_X(z) > \omega$$

Quindi la prima tesi eventualmente è vera.

Siccome  $F_{X_n}$  è debolmente crescente, questo implica anche che

$$z \geq \inf \{y | F_{X_n}(y) > \omega\}$$

5.3 (3):  $\limsup_n X_n^+(\omega) \leq X^+(\omega)$

$$\limsup_n X_n^+(\omega) \leq z \quad \forall z > X^+(\omega)$$

5.4 (4):  $\liminf_n X_n^-(\omega) \geq X^-(\omega)$

Basta rifare tutto invertendo tutti i segni.

5.5 (5):  $X_n^+ \rightarrow X^+ \quad q.c.$

Q.c.,  $X^- = X^+$ , quindi convergenza c'è per teorema dei 2 carabinieri.

## 6 Esercizio 3.6

**6.1 (1):**  $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X_1$

Nota: non ho capito la vera definizione formale di IID

Supponiamo che  $\mathbb{E}[h(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[h(X)]$  con  $h$  semplice. Allora sappiamo che tutte le funzioni continue bounded sono il limite di una serie crescente di funzioni semplici. Quindi tesi vera per convergenza dominata.

**6.2 (2):**  $\exists a < b : \mathbb{P}(X_1 \leq a) > 0 \wedge \mathbb{P}(X_1 \geq b) > 0$

Assumendo la tesi falsa per assurdo, siccome

$$\mathbb{P}(X_1 \leq a) + \mathbb{P}(a < X_1 < b) + \mathbb{P}(b \leq X_1) = 1$$

Si ha che  $\mathbb{P}(a < X_1 < b) = 1 \quad \forall a < b$ .

Quindi  $X_1$  è costante (che va contro l'ipotesi).

La seconda tesi è vera per BC2.

**6.3 (3):**  $(X_n)_n$  **non converge q.c.**

Q.c.  $(X_n(\omega))_n$  continua a saltare da sotto  $a$  a sopra  $b$  infinite volte, quindi non può convergere.

**6.4 (4):**  $(X_n)_n$  **non converge in prob**

Per qualsiasi  $X(\omega)$  (ad  $\omega$  fissato) si ha che

$$|X_n(\omega) - X(\omega)| > (b - a)$$

infinite volte.