

 Agente de Ánimo (Mood & Affect)

1. Justificación Neuroclínica y Arquitectura del Agente

El **Agente de Ánimo** tiene como objetivo detectar fluctuaciones del afecto, síntomas micro-depresivos, desregulación emocional y niveles de ansiedad vinculados a la comparación social ascendente (fenómeno de devaluación del self mediado por redes sociales) y al *Fear of Missing Out* (FOMO).

Clínicamente, el uso problemático de redes sociales altera las estructuras de recompensa cerebral y promueve distorsiones cognitivas (como la inferencia arbitraria y la abstracción selectiva), donde el usuario asume una autovaloración negativa en comparación con las narrativas idealizadas expuestas por otros en entornos digitales.

ESTRATEGIA DE RECOPIACIÓN DE DATOS PASIVOS Y ACTIVOS

El agente debe realizar un análisis léxico-semántico y de procesamiento de lenguaje natural (PLN) si el usuario genera texto, evaluando la densidad de términos absolutos ("nunca", "siempre", "nadie") y el sesgo de negatividad, complementado con un micro-tamizaje diario cuantitativo mediante preguntas conversacionales adaptadas.

2. Protocolo de Diagnóstico y Variables Operacionales

El agente estructurará su diagnóstico diario evaluando las siguientes variables métricas:

- **Valencia Afectiva Diaria:** Puntuación numérica del tono emocional percibido ($V \in [-5, 5]$).
- **Índice de Rumiación Digital:** Frecuencia e intensidad de pensamientos intrusivos desencadenados tras el uso de plataformas específicas.
- **Sintomatología Ansioso-Depresiva de Tamizaje:** Evaluación de anhedonia y humor deprimido durante las últimas 24 horas.

DIMENSIÓN PSICOMETRÍA	INDICADOR OPERACIONAL	MAPEO DE PREGUNTA SUGERIDA PARA EL AGENTE
Afecto Negativo (PANAS)	Puntuación de distrés / irritabilidad	"En una escala de 1 a 5, ¿qué tan abrumado, irritable o inquieto te has sentido hoy?"
Anhedonia (PHQ-2)	Pérdida de interés o placer	"¿Has sentido hoy un menor interés o disfrute en tus actividades cotidianas fuera de la pantalla?"
FOMO Scale	Ansiedad por desconexión	"¿Sentiste inquietud o temor a perderte de algo importante mientras estabas lejos del móvil?"

3. Reglas de Progreso Diario y Disparadores Clínicos

El progreso se calcula mediante medias móviles ponderadas de 3 y 7 días para suavizar la variabilidad diaria normal. El agente disparará alertas si la valencia afectiva cae consistentemente durante *al menos* 3 días concurrentes con un incremento en el tiempo de pantalla nocturno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CLÍNICAS Y CERTIFICADAS

1. **Asociación Americana de Psiquiatría (APA).** (2014). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)*. 5ª Edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Sección: Trastornos del Estado de Ánimo y Criterios de Depresión Mayor).
2. **Radloff, L. S.** (1977). *The CES-D Scale: A self-report depression scale for research in the general population*. Applied Psychological Measurement, 1(3), 385-401. [Escala validada clínicamente para tamizaje epidemiológico de sintomatología depresiva].
3. **Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A.** (1988). *Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales*. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070.
4. **Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V.** (2013). *Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out*. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.