24-06-2020 - I2 - R. DEGUEVARA - Neuroanatomie

Nom : **CHINAUD**	Statut : **Présent**
Prénom : **Margaux**	Points : **26.333 / 50**
Date de n. : **26/11/1998**	Note : **10.5 / 20**

Répartition des notes à l'épreuve



Détail des réponses

Q1 Les substances des aliments sont

- [ ] a) Dites liquides
- [ ] b) Nommées salivaires
- [x] c) Obligatoirement dissoutes
- [ ] d) Influencées par le contexte hormonal

Q2 Le squelette de la langue est

- [x] a) Osseux
- [x] b) Fibreux
- [x] c) mobile
- [ ] d) Membraneux

Q3 Les papilles gustatives sont

- [ ] a) Filiformes
- [x] b) Calciformes
- [x] c) Corolliformes
- [x] d) Foliées

Q4 Les bourgeons gustatifs répondent

- [x] a) A un stimulus spécifique
- [ ] b) A une infinité de stimuli
- [ ] c) Par des décharges hyperpolarisantes
- [x] d) De manière variable selon le stimulus

Q5 L'innervation de la langue est assurée par

- [ ] a) Le nerf glosso-pharyngien pour la gustation du tiers antérieur de la langue
- [ ] b) Le nerf lingual pour la gustation des deux tiers antérieurs de la langue
- [ ] c) Le nerf vague pour la gustation du V lingual
- [x] d) Des nerfs mixtes

Q6 Le codage gustatif implique

- [x] a) Des canaux ioniques pour le salé
- [x] b) Une forte amplification du signal
- [ ] c) Les stimulus thermiques
- [ ] d) Une aptitude à la quantification

Q7 La somesthésie fait intervenir

- [x] a) Des mécanorécepteurs
- [x] b) Des chémorécepteurs
- [x] c) Des nocicepteurs
- [x] d) Des thermorécepteurs
- [ ] e) Des photocepteurs

Q8 Les récepteurs ayant un champ récepteur de précision sont ceux appelés

- [x] a) De Meissner
- [ ] b) De Pacini
- [x] c) De Merkel
- [ ] d) De Ruffini

Q9 La sensibilité protopathique tactile ne fait pas intervenir

- [x] a) Le corpuscule de Meissner
- [x] b) Les disques de Merkel
- [ ] c) Le corpuscule de Pacini
- [ ] d) Les terminaisons libres des follicules pileux

Q10 Une fibre nerveuse en réseau ramifié correspond à

- [ ] a) Pacini
- [ ] b) Meissner
- [ ] c) Golgi-Mazzoni
- [x] d) Ruffini

Q11 Le seuil de discrimination tactile spatiale au niveau de l'avant bras est de l'ordre

- [ ] a) Du µm
- [x] b) Du mm
- [ ] c) Du cm

Q12 Je suis un récepteur statique, je suis

- [ ] a) Dynamique
- [x] b) Ruffini
- [x] c) Phasique
- [ ] d) Pacini

Q13 Le relai diencéphalique de la sensibilité tactile dorsale est localisé au niveau

- [ ] a) Du VPM
- [ ]

b) Du CGM

c) Du VPL

d) Du CGL

Q14 Une section des colonnes dorsales médullaires droites a pour conséquence

a) Une perte de la sensibilité controlatérale

b) Une perte de la sensibilité homolatérale

c) Une perte de la sensibilité infralésionnelle

d) Une perte de la sensibilité supralésionnelle

Q15 Le myélencéphale est un relais des voies

a) De la sensibilité gnosique mécanique

b) De la sensibilité protopathique mécanique

c) De la sensibilité douloureuse épicritique

d) De la sensibilité thermique mais uniquement épicritique

Q16 La voie extralemniscale est surtout constituée de fibres de type

a) I

b) II

c) III

d) IV

Q17 Le ganglion impliqué dans la sensibilité tactile de la face se nomme

a) Trigéminal principal

b) Facial

c) De Gasser

d) Palatin

Q18 Le faisceau trigémino-pontique

a) Transporte des informations sensitives

b) Transporte des informations motrices

c) Transporte des informations au VPL

d) N'existe pas

Q19 Le cortex somesthésique primaire est situé

a) Postérieurement au sillon central

b) Postérieurement au sillon post-cenral

c) De part et d'autre du sillon central

d) Dans un gyrus horizontal

Q20 Un objet à 35°C posé sur votre peau vous apparait

a) Chaud

b) Froid

c) Tiède

d) Vous ne pouvez pas répondre à cette question

Q21 Les afférences thermiques sont

a) Myélinisées

b) Amyéliniques

- [ ] c) De type VI
- [ ] d) De type II

Q22 Une douleur nociceptive correspond

- [ ] a) A une lésion d'une fibre nerveuse
- [x] b) A une douleur courte
- [ ] c) A une douleur chronique
- [ ] d) A une lésion d'un nerf

Q23 EVS signifie

- [ ] a) Echelle visuelle simple
- [x] b) Echelle verbale simple
- [ ] c) Evaluation volontaire simple
- [ ] d) Evaluation verbale simple

Q24 La convergence entre des entrées extéroceptive et intéroceptive

- [ ] a) Provoque une zone douloureuse impossible à localiser
- [ ] b) Provoque une fausse douleur
- [ ] c) Est pas possible car les voies sont mélangées
- [x] d) Toutes les réponses précédentes sont fausses

Q25 EVA correspond

- [ ] a) A échelle visuelle antalgique
- [ ]

b) A échelle verbale antalgique

c) A une autoévaluation

d) A une hétéro-évaluation

Q26 Les nocicepteurs sont absents dans

a) Les régions de peu de sensibilité tactile

b) Le cerveau

c) Les muscles lisses

d) Les méninges

Q27 Les chémo-nocicepteurs

a) Sont présents dans les muscles

b) Sont absents dans la peau

c) Sont uniquement myélinisés

d) Sont uniquement amyéliniques

Q28 Dans la genèse du message nociceptif cutané, les molécules abaissant le seuil de sensibilité sont

a) Les ions H+

b) La bradykinine

c) La substance P

d) Aucunes des réponses précédentes

Q29 Les états d'hyperalgie font intervenir

a) Le parasympathique

b) L'orthosympathique

☐ c) Le raphé

☐ d) La substance grise périaqueducale

Q30 Le neurone afférant nociceptif a son soma dans

■ a) La moelle épinière dorsale

☐ b) La racine dorsale médullaire

☐ c) Le ganglion géniculé

☐ d) La couche V de Rexed

Q31 L'allodynie

☐ a) Correspond à une divergence de neurones fonctionnellement identiques

☐ b) Représente une forme d'antalgie

☐ c) Répond aux antalgiques courants

■ d) Toutes les réponses précédentes sont fausses

Q32 Le faisceau néospinothalamique

■ a) Est composée de fibres de gros calibre

☐ b) Présente une somatotopie

☐ c) Projette entre autres sur la formation réticulée

■ d) Se projette sur le VPL

Q33 Les noyaux thalamiques de la douleur

☐ a) Représentent le troisième relais

☐

b) Sont en position inférieurs

- [ ] c) Interviennent uniquement dans les douleurs aigües et localisées
- [ ] d) Peuvent être responsables de douleurs neurogènes

Q34 Une destruction du gyrus cingulaire du cortex frontal rend le sujet

- [ ] a) Insensible à la douleur
- [ ] b) Indifférent à la douleur
- [ ] c) Hypersensible à la douleur
- [ ] d) Ce gyrus n'a rien à voir avec le traitement de la douleur

---

Q35 Les endorphines sont des molécules

- [ ] a) A effet relaxant
- [x] b) A effet analgésique
- [ ] c) Présentes dans le SNP
- [x] d) Associées à l'opium

Q36 Les cellules sensorielles olfactives sont de type

- [x] a) Pseudo-unipolaire
- [x] b) Amyélinisé
- [ ] c) Unipolaire
- [ ] d) Aucunes des réponses précédentes

Q37 Le nerf olfactif

- [ ] a) Se projette dans le noyau olfactif antérieur
- [ ]

b) Prend naissance dans le bulbe olfactif

■ c) Longe le pédoncule olfactif

☐ d) Toutes les réponses précédentes sont fausses

Q38 La surface de la tache olfactive est de l'ordre du

☐ a) µm2

☐ b) mm2

■ c) cm2

☐ d) nm2

Q39 Les cellules sensorielles olfactives traversent

☐ a) Le sphénoïde

■ b) L'ethmoïde

☐ c) Le chorion

☐ d) Le bulbe olfactif

Q40 Les cellules mitrales

☐ a) Traversent la couche plexiforme externe

☐ b) Forment la couche fibrillaire par leurs dendrites

■ c) Se projettent dans le bulbe olfactif

☐ d) Possèdent un axone myélinisé

Q41 Le récepteur membranaire olfactif

■ a) Est situé sur le cil olfactif

☐

b) Est créé par certains odorants

- [ ] c) Est présent dans le mucus
- [ ] d) Est une protéine transcellulaire

Q42 Le cortex primaire olfactif est représenté par

- [ ] a) Le cortex entorhinal
- [x] b) Le cortex piriforme
- [ ] c) Le cortex péri-amygdalien
- [ ] d) Aucunes des réponses précédentes

Q43 Un syndrome pariétal antérieur aboutit à

- [x] a) Des troubles cognitifs
- [x] b) Des troubles moteurs
- [x] c) Des troubles sensitifs
- [ ] d) Une lésion de l'artère pariétale postérieure

Q44 Une agénésie calleuse

- [ ] a) n'existe pas
- [x] b) Provoque systématiquement une anomie tactile gauche
- [ ] c) Provoque uniquement une anomie tactile droite
- [x] d) Peut être asymptomatique

Q45 La mémoire implicite est une mémoire

- [ ] a) Sémantique
- [ ]

b) Contextuelle

■ c) Innée

■ d) Procédurale

Q46 L'amnésie antérograde

☐ a) Est une amnésie d'évocation

■ b) Se caractérise par un encodage perturbé

☐ c) Implique une lésion du lobe temporal dans sa région latérale

☐ d) Se caractérise par un rappel perturbé

Q47 Le système trigéminal implique des neurones

☐ a) De l'olfaction

☐ b) Chémo-sensible

☐ c) Centraux

■ d) En relation avec des nocicepteurs

Q48 Les réponses physiologiques du système trigéminal sont

■ a) Une vasoconstriction

☐ b) Une implication de glandes endocrines

☐ c) Hyposalivation

■ d) Sudation

Q49 La neuroplasticité dans le développement se traduit par

■ a) Une réorganisation des gyrus nerveux

☐

b) Une réorganisation des sillons corticaux

☐ c) Une modification du fonctionnement des récepteurs postsynaptiques

☐ d) Une synaptogenèse corticale

Q50 Le circuit de Papez implique

■ a) Une structure thalamique

☐ b) Une structure de la face médiale

☐ c) Une structure évolutive ancienne

☐ d) Une structure hypothalamique antérieure

Q1 Les substances des aliments sont

- [ ] a) Dites liquides
- [ ] b) Nommées salivaires
- [x] c) Obligatoirement dissoutes
- [ ] d) Influencées par le contexte hormonal

Q2 Le squelette de la langue est

- [x] a) Osseux
- [x] b) Fibreux
- [x] c) mobile
- [ ] d) Membraneux

Q3 Les papilles gustatives sont

- [ ] a) Filiformes
- [x] b) Calciformes
- [x] c) Corolliformes
- [x] d) Foliées

Q4 Les bourgeons gustatifs répondent

- [x] a) A un stimulus spécifique
- [ ] b) A une infinité de stimuli
- [ ] c) Par des décharges hyperpolarisantes
- [x] d) De manière variable selon le stimulus

Q5 L'innervation de la langue est assurée par

- [ ] a) Le nerf glosso-pharyngien pour la gustation du tiers antérieur de la langue
- [ ] b) Le nerf lingual pour la gustation des deux tiers antérieurs de la langue

- [ ] c) Le nerf vague pour la gustation du V lingual
- [x] d) Des nerfs mixtes

Q6 Le codage gustatif implique

- [x] a) Des canaux ioniques pour le salé
- [x] b) Une forte amplification du signal
- [ ] c) Les stimulus thermiques
- [ ] d) Une aptitude à la quantification

Q7 La somesthésie fait intervenir

- [x] a) Des mécanorécepteurs
- [x] b) Des chémorécepteurs
- [x] c) Des nocicepteurs
- [x] d) Des thermorécepteurs
- [ ] e) Des photocepteurs

Q8 Les récepteurs ayant un champ récepteur de précision sont ceux appelés

- [x] a) De Meissner
- [ ] b) De Pacini
- [x] c) De Merkel
- [ ] d) De Ruffini

Q9 La sensibilité protopathique tactile ne fait pas intervenir

- [x] a) Le corpuscule de Meissner
- [x] b) Les disques de Merkel
- [ ] c) Le corpuscule de Pacini
- [ ] d) Les terminaisons libres des follicules pileux

Q10 Une fibre nerveuse en réseau ramifié correspond à

- ☐ a) Pacini
- ☐ b) Meissner
- ☐ c) Golgi-Mazzoni
- ☒ d) Ruffini

Q11 Le seuil de discrimination tactile spatiale au niveau de l'avant bras est de l'ordre

- ☐ a) Du µm
- ☒ b) Du mm
- ☐ c) Du cm

Q12 Je suis un récepteur statique, je suis

- ☐ a) Dynamique
- ☒ b) Ruffini
- ☒ c) Phasique
- ☐ d) Pacini

Q13 Le relai diencéphalique de la sensibilité tactile dorsale est localisé au niveau

- ☐ a) Du VPM
- ☐ b) Du CGM
- ☐ c) Du VPL
- ☐ d) Du CGL

Q14 Une section des colonnes dorsales médullaires droites a pour conséquence

- ☐ a) Une perte de la sensibilité controlatérale
- ☒ b) Une perte de la sensibilité homolatérale
- ☐ c) Une perte de la sensibilité infralésionnelle

- [ ] d) Une perte de la sensibilité supralésionnelle

Q15 Le myélencéphale est un relais des voies

- [ ] a) De la sensibilité gnosique mécanique
- [ ] b) De la sensibilité protopathique mécanique
- [ ] c) De la sensibilité douloureuse épicritique
- [ ] d) De la sensibilité thermique mais uniquement épicritique

Q16 La voie extralemniscale est surtout constituée de fibres de type

- [x] a) I
- [ ] b) II
- [ ] c) III
- [ ] d) IV

Q17 Le ganglion impliqué dans la sensibilité tactile de la face se nomme

- [ ] a) Trigéminal principal
- [ ] b) Facial
- [x] c) De Gasser
- [ ] d) Palatin

Q18 Le faisceau trigémino-pontique

- [ ] a) Transporte des informations sensitives
- [ ] b) Transporte des informations motrices
- [ ] c) Transporte des informations au VPL
- [ ] d) N'existe pas

Q19 Le cortex somesthésique primaire est situé

- [x] a) Postérieurement au sillon central
- [ ] b) Postérieurement au sillon post-cenral
- [ ] c) De part et d'autre du sillon central
- [ ] d) Dans un gyrus horizontal

Q20 Un objet à 35°C posé sur votre peau vous apparait

- [ ] a) Chaud
- [ ] b) Froid
- [ ] c) Tiède
- [x] d) Vous ne pouvez pas répondre à cette question

Q21 Les afférences thermiques sont

- [x] a) Myélinisées
- [x] b) Amyéliniques
- [ ] c) De type VI
- [ ] d) De type II

Q22 Une douleur nociceptive correspond

- [ ] a) A une lésion d'une fibre nerveuse
- [x] b) A une douleur courte
- [ ] c) A une douleur chronique
- [ ] d) A une lésion d'un nerf

Q23 EVS signifie

- [ ] a) Echelle visuelle simple
- [x] b) Echelle verbale simple
- [ ] c) Evaluation volontaire simple

- [ ] d) Evaluation verbale simple

Q24 La convergence entre des entrées extéroceptive et intéroceptive

- [ ] a) Provoque une zone douloureuse impossible à localiser
- [ ] b) Provoque une fausse douleur
- [ ] c) Est pas possible car les voies sont mélangées
- [x] d) Toutes les réponses précédentes sont fausses

Q25 EVA correspond

- [ ] a) A échelle visuelle antalgique
- [ ] b) A échelle verbale antalgique
- [x] c) A une autoévaluation
- [ ] d) A une hétéro-évaluation

Q26 Les nocicepteurs sont absents dans

- [ ] a) Les régions de peu de sensibilité tactile
- [x] b) Le cerveau
- [ ] c) Les muscles lisses
- [ ] d) Les méninges

Q27 Les chémo-nocicepteurs

- [ ] a) Sont présents dans les muscles
- [ ] b) Sont absents dans la peau
- [ ] c) Sont uniquement myélinisés
- [x] d) Sont uniquement amyéliniques

Q28 Dans la genèse du message nociceptif cutané, les molécules abaissant le seuil de sensibilité sont

- [x] a) Les ions H+
- [ ] b) La bradykinine
- [ ] c) La substance P
- [ ] d) Aucunes des réponses précédentes

Q29 Les états d'hyperalgie font intervenir

- [ ] a) Le parasympathique
- [ ] b) L'orthosympathique
- [ ] c) Le raphé
- [ ] d) La substance grise périaqueducale

Q30 Le neurone afférant nociceptif a son soma dans

- [x] a) La moelle épinière dorsale
- [ ] b) La racine dorsale médullaire
- [ ] c) Le ganglion géniculé
- [ ] d) La couche V de Rexed

Q31 L'allodynie

- [ ] a) Correspond à une divergence de neurones fonctionnellement identiques
- [ ] b) Représente une forme d'antalgie
- [ ] c) Répond aux antalgiques courants
- [x] d) Toutes les réponses précédentes sont fausses

Q32 Le faisceau néospinothalamique

- [x] a) Est composée de fibres de gros calibre
- [ ] b) Présente une somatotopie
- [ ] c) Projette entre autres sur la formation réticulée

☒ d) Se projette sur le VPL

Q33 Les noyaux thalamiques de la douleur

☐ a) Représentent le troisième relais

☐ b) Sont en position inférieurs

☐ c) Interviennent uniquement dans les douleurs aigües et localisées

☐ d) Peuvent être responsables de douleurs neurogènes

Q34 Une destruction du gyrus cingulaire du cortex frontal rend le sujet

☐ a) Insensible à la douleur

☐ b) Indifférent à la douleur

☐ c) Hypersensible à la douleur

☐ d) Ce gyrus n'a rien à voir avec le traitement de la douleur

Q35 Les endorphines sont des molécules

☐ a) A effet relaxant

☒ b) A effet analgésique

☐ c) Présentes dans le SNP

☒ d) Associées à l'opium

Q36 Les cellules sensorielles olfactives sont de type

☒ a) Pseudo-unipolaire

☒ b) Amyélinisé

☐ c) Unipolaire

☐ d) Aucunes des réponses précédentes

Q37 Le nerf olfactif

- [ ] a) Se projette dans le noyau olfactif antérieur
- [ ] b) Prend naissance dans le bulbe olfactif
- [x] c) Longe le pédoncule olfactif
- [ ] d) Toutes les réponses précédentes sont fausses

Q38 La surface de la tache olfactive est de l'ordre du

- [ ] a) µm2
- [ ] b) mm2
- [x] c) cm2
- [ ] d) nm2

Q39 Les cellules sensorielles olfactives traversent

- [ ] a) Le sphénoïde
- [x] b) L'ethmoïde
- [ ] c) Le chorion
- [ ] d) Le bulbe olfactif

Q40 Les cellules mitrales

- [ ] a) Traversent la couche plexiforme externe
- [ ] b) Forment la couche fibrillaire par leurs dendrites
- [x] c) Se projettent dans le bulbe olfactif
- [ ] d) Possèdent un axone myélinisé

Q41 Le récepteur membranaire olfactif

- [x] a) Est situé sur le cil olfactif
- [ ] b) Est créé par certains odorants
- [ ] c) Est présent dans le mucus

- [ ] d) Est une protéine transcellulaire

Q42 Le cortex primaire olfactif est représenté par

- [ ] a) Le cortex entorhinal
- [x] b) Le cortex piriforme
- [ ] c) Le cortex péri-amygdalien
- [ ] d) Aucunes des réponses précédentes

Q43 Un syndrome pariétal antérieur aboutit à

- [x] a) Des troubles cognitifs
- [x] b) Des troubles moteurs
- [x] c) Des troubles sensitifs
- [ ] d) Une lésion de l'artère pariétale postérieure

Q44 Une agénésie calleuse

- [ ] a) n'existe pas
- [x] b) Provoque systématiquement une anomie tactile gauche
- [ ] c) Provoque uniquement une anomie tactile droite
- [x] d) Peut être asymptomatique

Q45 La mémoire implicite est une mémoire

- [ ] a) Sémantique
- [ ] b) Contextuelle
- [x] c) Innée
- [x] d) Procédurale

Q46 L'amnésie antérograde

- [ ] a) Est une amnésie d'évocation
- [x] b) Se caractérise par un encodage perturbé
- [ ] c) Implique une lésion du lobe temporal dans sa région latérale
- [ ] d) Se caractérise par un rappel perturbé

Q47 Le système trigéminal implique des neurones

- [ ] a) De l'olfaction
- [ ] b) Chémo-sensible
- [ ] c) Centraux
- [x] d) En relation avec des nocicepteurs

Q48 Les réponses physiologiques du système trigéminal sont

- [x] a) Une vasoconstriction
- [ ] b) Une implication de glandes endocrines
- [ ] c) Hyposalivation
- [x] d) Sudation

Q49 La neuroplasticité dans le développement se traduit par

- [x] a) Une réorganisation des gyrus nerveux
- [ ] b) Une réorganisation des sillons corticaux
- [ ] c) Une modification du fonctionnement des récepteurs postsynaptiques
- [ ] d) Une synaptogenèse corticale

Q50 Le circuit de Papez implique

- [x] a) Une structure thalamique
- [ ] b) Une structure de la face médiale
- [ ] c) Une structure évolutive ancienne

☐ d) Une structure hypothalamique antérieure