# 2024-2025-Partiels I2-M1-Neurophysiologie-R. DE GUEVARA

| | |
|---|---|
| Nom : **MIEGEVILLE** | Statut : **Présent** |
| Prénom : **Océane** | Points : **25.333 / 40** |
| Date de n. : **12/11/2004** | Note : **12.5 / 20** |

## Répartition des notes à l'épreuve



## Détail des réponses

**Q1 L’étrier est en contact avec**

- [x] a) Le marteau
- [ ] b) La fenêtre ovale
- [ ] c) Le tympan
- [ ] d) Les réponses A, B, C sont fausses

**Q2 L'organe de Corti**

- [ ] a) Contient trois rangées de CCE
- [ ] b) Contient trois rangées de cellules piliers
- [x] c) Contient trois rangées de cellules de Deiters
- [ ] d) Repose sur une membrane apicale

**Q3 Les structures impliquées dans le traitement de l'audition sont**

- [ ] a) Le complexe olivaire mésencéphalique
- [x] b) Les colliculi inférieurs
- [x] c) Les gyrus transverses
- [x] d) Les corps genouillés thalamiques

**Q4 L'endolymphe remplit**

- [ ] a) Uniquement la rampe tympanique
- [ ] b) Uniquement la rampe cochléaire
- [x] c) Les deux rampes citées
- [ ] d) Les réponses A, B, C sont fausses

**Q5 Les vibrations sonores sont**

- [ ] a) Freinées par les osselets
- [ ] b) Amplifiées par la fenêtre ronde
- [x] c) Transmises par le nerf auditif
- [ ] d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

**Q6 Les cellules ciliées externes**

- [ ] a) Sont les plus nombreuses
- [ ] b) Participent à la discrimination des fréquences
- [x] c) Ont une forme cylindrique
- [ ] d) Reposent sur la membrane tectoriale

---

**Q7 La transduction de l'onde sonore**

- [x] a) Est mécano-chimique
- [ ] b) Suppose un courant de sodium
- [x] c) Suppose un courant potassique
- [ ] d) Est proportionnelle à l’étirement des stéréocils

---

**Q8 L'électrocochléogramme est**

- [x] a) Un enregistrement au niveau de la fenêtre ronde
- [ ] b) Utilisé pour mesurer l'activité des cellules ciliées
- [ ] c) Associé à l’activité des fibres auditives
- [ ] d) Une forme spécialisée d'audiogramme

---

**Q9 Le deuxième relais de la voie auditive primaire est**

- [ ]

a) Le noyau cochléaire

☐ b) Le corps genouillé médian

■ c) Le complexe olivaire

☐ d) Le colliculus inférieur

---

**Q10 Cochez ce qui est vrai**

☐ a) Les cellules ciliées internes, uniquement, se renouvellent jusqu'à 6 ans

■ b) Le gyrus temporal supérieur est au dessus du cortex auditif

☐ c) Les cellules ciliées reposent sur le pôle apical des cellules de soutien

☐ d) On possède environ 35000 cellules ciliées

---

**Q11 Les papilles gustatives sont**

■ a) Fongiformes

☐ b) Absentes du V lingual

☐ c) Corolliformes

■ d) Foliées

---

**Q12 Les bourgeons gustatifs répondent**

☐ a) A un stimulus spécifique

■ b) A une infinité de stimuli

☐ c) Par des décharges dépolarisantes

☐ d) De manière invariable selon le stimulus

---

**Q13 L'innervation de la langue est assurée par**

☐

a) Le nerf glosso-pharyngien pour la gustation du tiers antérieur de la langue

b) Le nerf facial pour la gustation des deux tiers antérieurs de la langue

c) Le nerf vague pour les papilles du V lingual

d) Des nerfs sensitifs purs

---

**Q14 Le codage gustatif implique**

a) Des canaux ioniques ou des récepteurs couplés aux protéines G

b) Une faible amplification du signal

c) Un flux d'ion chlore

d) Une aptitude à la quantification

---

**Q15 Les récepteurs ayant un champ récepteur pour la topie sont ceux appelés**

a) De Meissner

b) De Pacini

c) De Merkel

d) De Ruffini

---

**Q16 Une terminaison nerveuse ramifiée et encapsulée correspond à**

a) Pacini

b) Meissner

c) Golgi-Mazzoni

d) Ruffini

---

**Q17 Le relai diencéphalique de la sensibilité tactile du bas du corps est localisé au niveau**

a) Du VPM

☐ b) Du CGM

■ c) Du VPL

☐ d) Du CGL

---

**Q18 Une section des colonnes dorsales médullaires gauches a pour conséquence**

☐ a) Une perte de la sensibilité mécanique controlatérale

■ b) Une perte de la sensibilité mécanique homolatérale

☐ c) Une perte de la sensibilité thermique homolatérale

☐ d) Une perte de la sensibilité nociceptive controlatérale

---

**Q19 Le cerveau antérieur est un relais des voies**

☐ a) De la sensibilité gnosique mécanique

■ b) De la sensibilité protopathique mécanique

☐ c) De la sensibilité douloureuse épicritique

☐ d) De la sensibilité thermique mais uniquement épicritique

---

**Q20 La voie extralemniscale rapide est constituée de fibres de type**

☐ a) I

☐ b) II

■ c) III

☐ d) IV

---

**Q21 Le ganglion crânien impliqué dans la sensibilité épicritique tactile de la face se nomme**

☐

a) Trigéminal principal

- [ ] b) Facial
- [x] c) De Gasser
- [ ] d) Géniculé

---

**Q22 Les efférences thermiques sont**

- [ ] a) Myélinisées
- [ ] b) Amyéliniques
- [ ] c) De type III
- [x] d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

**Q23 Une douleur neurogène correspond**

- [ ] a) A une lésion d'une fibre nerveuse
- [x] b) A une douleur courte
- [x] c) A une douleur chronique
- [ ] d) A une lésion d'un nerf

---

**Q24 EVS signifie**

- [ ] a) Echelle visuelle simple
- [x] b) Echelle verbale simple
- [ ] c) Evaluation volontaire simple
- [ ] d) Evaluation verbale simple

---

**Q25 La convergence entre des entrées extéroceptive et intéroceptive**

- [ ]

a) Provoque une zone douloureuse de référence

■ b) Provoque une fausse douleur

☐ c) Trouve son origine dans le SNC

☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

**Q26 Les chémo-nocicepteurs**

■ a) Sont présents dans les muscles

■ b) Sont absents dans la peau

☐ c) Sont myélinisés ou non

☐ d) Sont uniquement sensibles aux molécules algogènes

---

**Q27 Dans la genèse du message nociceptif cutané, les molécules abaissant le seuil de sensibilité sont**

☐ a) Les ions H+

☐ b) La bradykinine

☐ c) La substance P

■ d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

**Q28 Les états d'hyperalgie impliquent**

☐ a) Le parasympathique

■ b) L'orthosympathique

☐ c) Le raphé

☐ d) Le thalamus

---

**Q29 L'allodynie**

☐

a) Correspond à une douleur causée par un stimulus non douloureux

- [ ] b) Représente une forme d'état d'hyperantalgie
- [ ] c) Répond aux antalgiques courants
- [x] d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

**Q30 Le faisceau paléospinothalamique**

- [ ] a) Est composée de fibres de petit calibre
- [ ] b) Est nécessaire à la sensibilité épicritique
- [ ] c) Projette entre autres sur la formation réticulée
- [x] d) Se projette sur le VPL

---

**Q31 Les noyaux thalamiques de la douleur**

- [ ] a) Représentent les avant-derniers relais
- [ ] b) Font partie des noyaux non spécifiques
- [ ] c) Interviennent uniquement dans les douleurs chroniques
- [x] d) Peuvent être responsables de douleurs neurogènes

---

**Q32 Une destruction d'une partie du gyrus cingulaire rend le sujet**

- [ ] a) Insensible à la douleur
- [x] b) Indifférent à la douleur
- [ ] c) Inapte à localiser la douleur
- [ ] d) Ce gyrus n’a rien à voir avec le traitement de la douleur

---

**Q33 Les enképhalines sont des molécules**

- [ ]

a) A effet myorelaxant

☐ b) A effet algésique

■ c) Appartenant aux neurotransmetteurs

☐ d) Dérivées de l'opium

---

**Q34 Les cellules sensorielles olfactives sont de type**

☐ a) Pseudo-unipolaire

■ b) Myélinisée

☐ c) Multipolaire

☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

**Q35 Le nerf olfactif**

☐ a) Se projette, entre autres, dans le noyau olfactif du cerveau

■ b) Montre trois racines à l'entrée du cerveau

☐ c) Transporte des informations destinées au cortex frontal

☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

**Q36 La surface de la tache olfactive**

☐ a) Est de l’ordre du µm2

☐ b) Est de l’ordre du mm2

☐ c) Est d'apparence lisse

■ d) Est d'apparence hérissée

---

**Q37 Les cellules sensorielles olfactives traversent**

■

a) La lame criblée

- [ ] b) Le sphénoïde
- [ ] c) L'épithélium olfactif
- [ ] d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

**Q38 Les cellules mitrales**

- [ ] a) Traversent la couche fibrillaire
- [ ] b) Structurent le glomérule par leur axone
- [ ] c) Se projettent dans le bulbe olfactif
- [x] d) Possèdent un axone myélinisé

---

**Q39 Le récepteur membranaire olfactif**

- [ ] a) Est situé au niveau du cil olfactif de la cellule glomérulaire
- [ ] b) Est peu spécifique
- [ ] c) Est présent dans le mucus
- [x] d) Est une protéine transmembranaire

---

**Q40 Le cortex primaire olfactif est représenté par**

- [ ] a) Le cortex entorhinal
- [ ] b) Le cortex orbitofrontal
- [ ] c) Le cortex péri-amygdalien
- [x] d) Les réponses A, B, C sont fausses

---

Nom MIEGEVILLE

Prénom OCEANE

Date de naissance 12 / 11 / 2004

2024-2025-Partiels I2-M1-Neurophysiologie-R. DE GUEVARA
N'oubliez pas de noter vos NOM et PRENOM
Remplir cette fiche avec un stylo ou feutre NOIR.
Si vous avez fait une erreur, veuillez utiliser la seconde ligne (ligne de repentance).
LE BLANC CORRECTEUR EST INTERDIT.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Q2 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q3 | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| Q4 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q5 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q6 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q7 | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q8 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Q9 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q10 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Q11 | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q12 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q13 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q14 | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q15 | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q16 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q17 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q18 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q19 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q20 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Q21 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q22 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q23 | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
| Q24 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q25 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q26 | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q27 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q28 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q29 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q30 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Q31 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q32 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q33 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| Q34 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q35 | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| Q36 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q37 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Q38 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q39 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| Q40 | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |