QUESTIONNAIRE

MODULE 1 – NEUROPHYSIOLOGIE
ISRP 2 – R. DE GUEVARA

Vendredi 17 Juin 2016

Durée : 1 heure — Aucun document n'est autorisé

Remplissez les renseignements demandés sur la fiche de réponses, en majuscules d'imprimerie, puis répondez aux questions en portant une croix au **feutre noir** à l'intérieur des cases correspondant aux **réponses justes**.

Exemple : si D est la seule réponse juste de la question 4 :

Q4 A ☐ B ☐ C ☐ D ☒

En dehors de ces indications et croix la fiche de réponses ne doit comporter aucune annotation, tache, graffiti. Toute erreur de saisie liée au non-respect de ces règles ne sera pas révisée.

Q 1. Les substances des aliments sont libérées par :
- **A.** Les neurones gustatifs
- **B.** La langue
- **C.** L'air
- **D.** Les papilles
- **E.** Aucune des réponses précédentes

Q 2. Concernant le système trigéminal :
- **A.** Il comprend surtout le nerf IX
- **B.** Sa projection se fait dans le VPL
- **C.** Il me permet de sentir le parfum de la rose
- **D.** On peut le considérer comme un système d'alerte

Q 3. Les papilles caliciformes sont :
- **A.** Sur les bords latéraux linguaux
- **B.** Sur le « V » lingual antérieur
- **C.** Une dizaine
- **D.** Tactiles comme les filiformes

Q 4. Les bourgeons gustatifs sont :
- **A.** Des structures de 8 mm sur 4 mm
- **B.** Reposent sur une membrane apicale
- **C.** Présents dans l'épiglotte
- **D.** Aucune des réponses précédentes

Q 5. L'innervation de la langue est assurée par :
- **A.** La terminaison des neurones bipolaires gustatifs
- **B.** Le ganglion géniculé du nerf VI
- **C.** Le pore gustatif
- **D.** Le glossopharyngien

Q 6. Quelles structures sont impliquées dans le traitement de la gustation ?
- **A.** Le noyau olivaire
- **B.** Le noyau solitaire
- **C.** Le thalamus ventrolatéral
- **D.** Le cortex orbitofrontal

Q 7. L'amplification du stimulus gustatif est :
- **A.** Important
- **B.** Faible
- **C.** Inexistant
- **D.** Aucune des réponses précédentes

Q 8. Les récepteurs à adaptation rapides sont ceux nommés :
- **A.** De Meissner
- **B.** De Pacini
- **C.** De Merkel
- **D.** De Ruffini

Q 9. Le toucher léger fait intervenir :
- **A.** Le corpuscule de Ruffini
- **B.** Les disques de Merkel
- **C.** Le corpuscule de Krause
- **D.** Aucune des réponses précédentes

Q 10. Le sens vibratoire fait intervenir :
- **A.** Pacini
- **B.** Meissner
- **C.** Golgi-Mazzoni
- **D.** Que le niveau osseux

Q 11. Le nombre de récepteurs tactiles est :
- **A.** Faible au niveau de la joue
- **B.** Important au niveau de la joue
- **C.** Faible au niveau de la narine
- **D.** Faible au niveau du dos

Q 12. Le faisceau cunéiforme :
- **A.** Intéresse la partie haute du corps
- **B.** Intéresse la partie basse du corps
- **C.** Est en position interne dans le cordon dorsal médullaire
- **D.** Est en position externe dans le cordon dorsal médullaire

Q 13. Le relai du faisceau gracile se fait au niveau :
- **A.** Du tronc cérébral
- **B.** Du thalamus
- **C.** Pontique
- **D.** Bulbaire

Q 14. La voie des colonnes dorsales médullaires est :
- **A.** Homolatérale jusqu'au thalamus
- **B.** Controlatérale jusqu'au thalamus
- **C.** Epicritique
- **D.** Associée à des fibres Aβ

Q 15. La lecture du braille entraine :
- **A.** Une augmentation de la sensibilité épicritique mécanique
- **B.** Une augmentation de la sensibilité protopathique mécanique
- **C.** Une augmentation du nombre de neurones corticaux
- **D.** Une augmentation du nombre de fibres sensitives

Q 16. Le nom du noyau du nerf crânien de la sensibilité tactile faciale :
- **A.** Se nomme spinal
- **B.** Se nomme principal
- **C.** Se nomme ventro-postérieur médian
- **D.** Aucune des réponses précédentes

Q 17. Le ganglion de Gasser impliqué dans la sensibilité tactile de la face correspond au nerf :
- **A.** III
- **B.** VI
- **C.** VII
- **D.** Aucune des réponses précédentes

Q 18. Une baresthésie correspond à :
- **A.** Une absence de sensibilité vibratoire
- **B.** Une sensibilité vibratoire
- **C.** Une sensibilité à la pression
- **D.** Une absence de sensibilité à la pression

Q 19. Le cortex somesthésique :
- **A.** S'étend sur le sillon intrapariétal
- **B.** Est un cortex homotypique
- **C.** Est un cortex granulaire
- **D.** Est situé dans la CFA

Suite des questions

Q 20. Le corpuscule de Krause :

A. Est sensible à une gamme de température entre 30° à 45°C
B. Est situé uniquement au niveau labial et palmaire
C. A un champ récepteur petit
D. Aucune des réponses précédentes

Q 21. Les fibres nerveuses thermiques appartiennent :

A. Au type I
B. Au type II
C. Au type III
D. Au type IV

Q 22. Une douleur nociceptive :

A. Correspond à une lésion nerveuse
B. Correspond à un excès de nociception
C. Est absente chez le nouveau-né
D. Entraine une réaction motrice

Q 23. Un codage spatial douloureux peu précis :

A. Signifie une lésion obligatoirement
B. Correspond à une douleur projetée
C. Correspond à une douleur de référence
D. Aucune des réponses précédentes

Q 24. La convergence entre des entrées extéroceptive et intéroceptive :

A. Peut être trompeuse
B. Existe mais de manière aléatoire
C. N'existe pas
D. Toutes les réponses précédentes sont fausses

Q 25. La théorie du » Gate control » :

A. Entraine une hypoalgie
B. Entraine une hyperalgie
C. Est observée à l'échelle médullaire
D. Est observée à l'échelle mésencéphalique

Q 26. L'échelle EVA :

A. Est une auto-évaluation
B. Est une hétéro-évaluation
C. Est une échelle des visages
D. Aucune des réponses précédentes

Q 27. Le seuil de douleur est :

A. Identique chez tous
B. Différent chez tous
C. Dépendant de facteurs culturels
D. Dépendant de la lésion

Q 28. Dans la genèse du message nociceptif cutané, les éléments abaissant le seuil de sensibilité sont :

A. Les ions H+
B. La bradykinine
C. Les prostaglandines
D. La dopamine

Q 29. Un état d'hypoalgie fait intervenir :

A. Des endorphines
B. L'orthosympathique
C. Le noyau de raphé
D. La substance grise périaqueducale

Q 30. Le neurone primaire nociceptif a son soma dans:

A. Le ganglion rachidien
B. La corne dorsale médullaire
C. La corne ventrale médullaire
D. La couche II de Rexed

Q 31. Les substances chimiques algogènes:

A. Diminuent la douleur
B. Augmentent la douleur
C. Sont hallucinatoires
D. Toutes les réponses précédentes sont fausses

Q 32. Le faisceau spinothalamique latéral:

A. Est sensori-discriminatif
B. Est constitué par des fibres rapides
C. Est dit, pour certains, spino-réticulo-thalamique
D. Aucune des réponses précédentes

Q 33. Les noyaux diencéphaliques de la douleur sont:

A. Dans l'hypothalamus
B. Impairs
C. Somatotopiques
D. Sensibles au rythme nycthéméral

Q 34. L'identification de la douleur à l'échelle corticale se fait:

A. Dans la zone frontale
B. Dans la zone pariétale
C. Dans la zone temporale
D. Aucune des réponses précédentes

Q 35. La codéine:

A. Est un opiacé
B. A une action centrale
C. A une action périphérique
D. Est interdite car est une drogue d'addiction

Q 36. Une atteinte de la CPA peut entrainer :

A. Une hypoesthésie hémicorporelle homolatérale
B. Une anesthésie hémicorporelle ipsilatérale
C. Une hyperesthésie hémicorporelle controlatérale
D. Une extinction sensitive

Q 37. Une apraxie idéomotrice peut être un signe d'une atteinte :

A. Occipitale
B. Pariétale
C. Pyramidale
D. Aucune des réponses précédentes

Q 38. Cherchez l'intrus :

A. Surdité centrale
B. Amnésie
C. Hémianopsie
D. Aphasie

Q 39. L'impossibilité de réaliser le même rythme avec les deux mains se nomme :

A. Asynergie
B. Asynchronisme
C. Apraxie bilatérale
D. Aucune des réponses précédentes

Q 40. Je trace un chiffre sur la peau du patient, je teste :

A. La pallesthésie
B. La stéréoagnosie
C. La voie lemniscale épicritique
D. La calculie

Q 41. Le signe de Kernig est lié à une atteinte :

A. Ventriculaire
B. Cérébelleuse
C. Méningée
D. Proprioceptive

Q 42. La plasticité cérébrale à court terme nécessite :

A. Des modifications du génome
B. Des modifications du fonctionnement des synapses existantes
C. Des disparitions de synapses
D. Des modifications de la conduction nerveuse

Q 43. La mémoire épisodique est :

A. Indépendante de la mémoire biographique
B. Présente de temps en temps d'où son nom
C. Affaiblie avec l'âge
D. Aucune des réponses précédentes

Q 44. Cherchez l'intrus :

A. Implicite
B. Inconsciente
C. Flexible
D. Procédurale

Q 45. L'amnésie antérograde :

A. Se caractérise par une consolidation défectueuse
B. Est une possible atteinte hippocampique
C. Est une perte de souvenirs
D. Est présente dans le syndrome de Korsakoff

Q 46. Le circuit de Papez implique :

A. Le thalamus
B. L'hypothalamus
C. Le cortex orbitofrontal
D. Le gyrus angulaire

Q 47. L'hippocampe est :

A. Au niveau de la T1
B. Au niveau de la T3
C. Une structure néocorticale
D. Sous le sillon latéral

Q 48. Cherchez l'intrus :

A. Amnésie
B. Apraxie
C. Abasie
D. Aphasie

Q 49. Et enfin, je vous souhaite :

A. De bonnes vacances
B. Une heureuse et enrichissante troisième année
C. Aucune des réponses précédentes !!!!!!