# QUESTIONNAIRE

## MODULE 1 – NEUROPHYSIOLOGIE – ISRP2

## R. DE GUEVARA

Vendredi 23 juin 2017

Aucun document n'est autorisé

Remplissez les renseignements demandés sur la fiche de réponses, en majuscules d'imprimerie, puis répondez aux questions en portant une croix au **feutre noir** à l'intérieur des cases correspondant aux **réponses justes**.

Exemple : si D est la seule réponse juste de la question 4 :

**Q4 A ☐ B ☐ C ☐ D ☒**

En dehors de ces indications et croix la fiche de réponses ne doit comporter aucune annotation, tache, graffiti. Toute erreur de saisie liée au non-respect de ces règles ne sera pas révisée.

---

**Q 1.** Les substances des aliments sont:
- **A.** Dites fluides
- **B.** Nommées savides
- **C.** Obligatoirement dissoutes
- **D.** Influencées par le contexte émotionnel

**Q 2.** Le squelette de la langue est:
- **A.** Gélatineux
- **B.** Fibreux
- **C.** absent
- **D.** Membraneux

**Q 3.** Les papilles gustatives sont:
- **A.** Non filiformes
- **B.** Calciformes
- **C.** Corolliformes
- **D.** Falciformes

**Q 4.** Les bourgeons gustatifs répondent:
- **A.** A une spécificité de quatre ou cinq stimuli selon les personnes
- **B.** A une infinité de stimuli
- **C.** Par des décharges hyperpolarisantes
- **D.** De manière variable selon le stimulus

**Q 5.** L'innervation de la langue est assurée par:
- **A.** Le nerf glosso-pharyngien pour la gustation du tiers antérieur de la langue
- **B.** Le nerf lingual pour la gustation des deux tiers antérieurs de la langue
- **C.** Le nerf glosso-pharyngien pour la gustation du V lingual
- **D.** Des nerfs mixtes

**Q 6.** Le codage gustatif implique:
- **A.** Des canaux ioniques
- **B.** Une forte amplification du signal
- **C.** La valeur hédonique du stimulus
- **D.** La connaissance de la concentration du stimulus

**Q 7.** La somesthésie ne fait pas intervenir:
- **A.** Des mécanorécepteurs
- **B.** Des chémorécepteurs
- **C.** Des nocicepteurs
- **D.** Des photorécepteurs

**Q 8.** Les récepteurs ayant un champ récepteur de précision sont ceux appelés:
- **A.** De Meissner
- **B.** De Pacini
- **C.** De Merkel
- **D.** De Ruffini

**Q 9.** La sensibilité épicritique tactile ne fait pas intervenir:
- **A.** Le corpuscule de Ruffini
- **B.** Les disques de Merkel
- **C.** Le corpuscule de Krause
- **D.** Les terminaisons libres des follicules pileux

**Q 10.** Une fibre nerveuse en réseau ramifié correspond à:
- **A.** Pacini
- **B.** Meissner
- **C.** Golgi-Mazzoni
- **D.** Ruffini

**Q 11.** Le seuil de discrimination tactile spatiale au niveau palmaire est de l'ordre:
- **A.** Du µm
- **B.** Du mm
- **C.** Du cm

**Q 12.** Je suis un récepteur statique, je suis:
- **A.** Dynamique
- **B.** Merkel
- **C.** Tonique
- **D.** Pacini

**Q 13.** Le relai diencéphalique de la sensibilité tactile pelvienne est localisé au niveau:
- **A.** Du VPM
- **B.** Du CGM
- **C.** Du VPL
- **D.** Du CGL

**Q 14.** Une section des colonnes dorsales médullaires gauches a pour conséquence:
- **A.** Une perte de la sensibilité controlatérale
- **B.** Une perte de la sensibilité homolatérale
- **C.** Une perte de la sensibilité infralésionnelle
- **D.** Une perte de la sensibilité supralésionnelle

**Q 15.** Le bulbe rachidien est un relais des voies:
- **A.** De la sensibilité discriminative mécanique
- **B.** De la sensibilité protopathique mécanique
- **C.** De la sensibilité douloureuse discriminative
- **D.** De la sensibilité douloureuse lente

**Q 16.** La voie lemniscale est constituée de fibres de type:
- **A.** Aa
- **B.** Aß
- **C.** Ad
- **D.** A?

**Q 17.** Le ganglion impliqué dans la sensibilité tactile de la face se nomme:
- **A.** Géniculé
- **B.** facial
- **C.** De Gasser
- **D.** Géminal

Suite des questions

**Q 18.** Le faisceau trigémino-subthalamique:
- **A.** Transporte des informations sensitives
- **B.** Transporte des informations motrices
- **C.** Transporte des informations au VPL
- **D.** N'existe pas

**Q 19.** Le cortex somesthésique est situé:
- **A.** Antérieurement au sillon central
- **B.** Postérieurement au sillon central
- **C.** De part et d'autre du sillon central
- **D.** A la confluence du lobe pariétal et temporal

**Q 20.** Un objet à 33°C posé sur votre peau vous apparait:
- **A.** Chaud
- **B.** Froid
- **C.** Tiède
- **D.** Vous ne pouvez pas répondre à cette question

**Q 21.** Les afférences thermiques sont:
- **A.** Toujours myélinisées
- **B.** Toujours amyéliniques
- **C.** De type IV
- **D.** De type II

**Q 22.** Une douleur nociceptive correspond:
- **A.** A une lésion nerveuse
- **B.** A une douleur aigüe
- **C.** A une douleur chronique
- **D.** A une lésion des téguments

**Q 23.** EVS signifie:
- **A.** Echelle visuelle simple
- **B.** Echelle verbale simple
- **C.** Evaluation validée simple
- **D.** Evaluation verbale simple

**Q 24.** La convergence entre des entrées extéroceptive et intéroceptive:
- **A.** Provoque une zone douloureuse bien délimitée
- **B.** Provoque une fausse douleur
- **C.** N'est pas possible car les voies sont séparées
- **D.** Toutes les réponses précédentes sont fausses

**Q 25.** EVA correspond:
- **A.** A échelle visuelle analogique
- **B.** A échelle verbale acoustique
- **C.** A une autoévaluation
- **D.** A une hétéro-évaluation

**Q 26.** Les nocicepteurs sont absents dans:
- **A.** Les régions de peu de sensibilité tactile
- **B.** Le cerveau
- **C.** Les muscles lisses
- **D.** Les méninges

**Q 27.** Les chémo-nocicepteurs:
- **A.** Sont absents dans les muscles
- **B.** Sont absents dans la peau
- **C.** Sont myélinisés
- **D.** Sont amyéliniques

**Q 28.** Dans la genèse du message nociceptif cutané, les molécules augmentant le seuil de sensibilité sont:
- **A.** Les ions H+
- **B.** La bradykinine
- **C.** Les prostaglandines
- **D.** Aucunes des réponses précédentes

**Q 29.** Les états d'hyperalgie font intervenir:
- **A.** Le parasympathique
- **B.** L'orthosympathique
- **C.** Le réflexe d'axone
- **D.** La substance grise périaqueducale

**Q 30.** Le neurone afférant nociceptif a son soma dans:
- **A.** La moelle épinière dorsale
- **B.** La corne dorsale médullaire
- **C.** Le ganglion trigéminé
- **D.** La couche V de Rexed

**Q 31.** L'allodynie:
- **A.** Correspond à une divergence de neurones fonctionnellement identiques
- **B.** Représente une forme d'antalgie
- **C.** Ne répond pas aux antalgiques classiques
- **D.** Toutes les réponses précédentes sont fausses

**Q 32.** Le faisceau spinothalamique:
- **A.** Est composée de fibres uniformes
- **B.** Décusse au niveau bulbaire
- **C.** Projette entre autres sur la formation réticulée
- **D.** Se projette sur le VPM

**Q 33.** Les noyaux thalamiques de la douleur:
- **A.** Présentent tous une somatotopie
- **B.** sont en position dorsale
- **C.** Interviennent uniquement dans les douleurs chroniques
- **D.** Peuvent être responsables de douleurs neurogène

**Q 34.** Une destruction du gyrus cingulaire du cortex frontal rend le sujet:
- **A.** Insensible à la douleur
- **B.** Indifférent à la douleur
- **C.** Incapable de localiser la douleur
- **D.** Hypersensible à la douleur
- **E.** Ce gyrus n'a rien à voir avec le traitement de la douleur

**Q 35.** Les enképhalines sont des molécules:
- **A.** A effet euphorisant
- **B.** A effet analgésique
- **C.** Présentes dans l'encéphale uniquement
- **D.** Permises mais à effets secondaires importants

**Q 36.** Les cellules sensorielles olfactives sont de type:
- **A.** Pseudo-unipolaire
- **B.** myélinisé
- **C.** apolaire
- **D.** Aucunes des réponses précédentes

**Q 37.** Le nerf olfactif:
- **A.** Se projette dans le noyau olfactif antérieur
- **B.** Porte le numéro II
- **C.** Longe le pédoncule olfactif
- **D.** Toutes les réponses précédentes sont fausses

**Q 38.** La surface de la tache olfactive est de l'ordre du :
- **A.** µm2
- **B.** mm2
- **C.** cm2
- **D.** dm2

**Q 39.** Les cellules sensorielles olfactives traversent:
- **A.** Le sphénoïde
- **B.** L'ethmoïde
- **C.** La lame criblée
- **D.** Le bulbe olfactif



Suite des questions

**Q 40.** Les cellules mitrales

**A.** Forment l'épithélium olfactif
**B.** Se projettent dans le bulbe olfactif
**C.** Se projettent dans les glomérules
**D.** Possèdent un axone myélinisé

**Q 41.** Le récepteur membranaire olfactif:

**A.** Est situé sur le cil olfactif
**B.** Est fixé par tous les odorants
**C.** Est appelé OBP
**D.** Est couplé aux protéines G

**Q 42.** Le cortex primaire olfactif est représenté par:

**A.** Le cortex entorhinal
**B.** Le cortex bulbo-olfactif
**C.** Le cortex péri-amygdalien
**D.** Aucunes des réponses précédentes

**Q 43.** Un syndrome pariétal antérieur aboutit à:

**A.** Des troubles cognitifs
**B.** Un trouble moteur
**C.** Un déficit sensitif
**D.** Une lésion de l'artère pariétale supérieure

**Q 44.** Une agénésie calleuse :

**A.** Est létale
**B.** Provoque systématiquement une anomie tactile gauche
**C.** Provoque systématiquement une anomie tactile droite
**D.** Peut être asymptomatique

**Q 45.** La mémoire déclarative est une mémoire:

**A.** Sémantique
**B.** Contextuelle
**C.** Biographique
**D.** Procédurale

**Q 46.** L'amnésie antérograde:

**A.** Se caractérise par une perte de souvenirs mais uniquement récents
**B.** Se caractérise par un encodage perturbé
**C.** Implique une lésion du thalamus
**D.** Peut être provoquée par une virose

**Q 47.** Le système trigéminal implique des neurones:

**A.** De l'olfaction
**B.** Tactiles de la face
**C.** Du circuit du plaisir
**D.** En relation avec des nocicepteurs

**Q 48.** Les réponses physiologiques du système trigéminal sont:

**A.** Vasodilatation
**B.** Une implication de glandes exocrines
**C.** Hyposalivation
**D.** Sédation

**Q 49.** La neuroplasticité se traduit par:

**A.** Une réorganisation des gyrus nerveux
**B.** Une réorganisation des artères cérébrales
**C.** Une augmentation du nombre de neurones corticaux
**D.** Une réduction corticale

**Q 50.** L'hippocampe :

**A.** Est le siège d'un circuit interne
**B.** Est le lieu de stockage des informations
**C.** Est une structure pariéto-temporale
**D.** Est une structure évolutive récente