QUESTIONNAIRE

MODULE 1 – NEUROPHYSIOLOGIE – ISRP2

R DE GUEVARA

Jeudi 21 juin 2018

Remplissez les renseignements demandés sur la fiche de réponses, en majuscules d'imprimerie, puis répondez aux questions en portant une croix au **feutre noir** à l'intérieur des cases correspondant aux **réponses justes**.

Exemple : si D est la seule réponse juste de la question 4 :

Q4 A ☐ B ☐ C ☐ D ☒

En dehors de ces indications et croix la fiche de réponses ne doit comporter aucune annotation, tache, graffiti. Toute erreur de saisie liée au non-respect de ces règles ne sera pas révisée.

Q 1. L'amnésie antérograde
- **A.** Se caractérise par une consolidation défectueuse
- **B.** Suppose une lésion du pôle antérograde du lobe frontal
- **C.** Concerne uniquement la mémoire sémantique
- **D.** Rend difficile l'exécution de taches complexes

Q 2. Vous vous souvenez que Bordeaux est en Gironde, vous utilisez la mémoire
- **A.** Implicite
- **B.** Episodique
- **C.** Sémantique
- **D.** De travail

Q 3. Une prosopagnosie :
- **A.** Est liée à un déficit de l'acuité visuelle
- **B.** Est une incapacité de reconnaissance des visages
- **C.** Peut être congénitale
- **D.** Est un déficit récupérable

Q 4. Le système trigéminal
- **A.** Implique trois voies
- **B.** Fait partie des sens physiques
- **C.** Provoque des sécrétions exocrines
- **D.** Implique un stimulus odorant

Q 5. Dans le cas de syndrome amnésique, quelle(s) structure(s) peut ou peuvent être atteinte(s) ?
- **A.** Hippocampe
- **B.** Amygdales
- **C.** Corps mamillaires
- **D.** Moelle cervicale

Q 6. Le cortex primaire olfactif
- **A.** Est représenté par le cortex orbito-frontal
- **B.** Est un néocortex
- **C.** Est connecté au bulbe olfactif
- **D.** Est associé aux voies de la gustation

Q 7. La neuroplasticité est permise par
- **A.** Une réorganisation des aires cérébrales
- **B.** Une synaptogenèse cérébrale
- **C.** Une neurogenèse sous corticale
- **D.** L'émergence de nouveaux axones

Q 8. L'organisation des sillons cérébraux
- **A.** Est propre à chaque individu
- **B.** Résulte de phénomènes génétiques
- **C.** Résulte d'apprentissages
- **D.** Une des trois réponses précédentes est fausse

Q 9. Le récepteur protéique olfactif
- **A.** Fixe l'ensemble des odorants
- **B.** Induit la synthèse d'un second messager
- **C.** Est situé dans le bulbe olfactif
- **D.** Fait partie de la famille des OBP

Q 10. Concernant les cellules sensorielles olfactives, éliminez le ou les intrus
- **A.** Sphénoïde
- **B.** Scaphoïde
- **C.** Lame criblée
- **D.** Ethmoïde

Q 11. Le syndrome rolandique est associé
- **A.** A un déficit moteur
- **B.** A un déficit sensitif
- **C.** A une atteinte de l'artère sylvienne
- **D.** A des troubles dysexécutifs

Q 12. Le faisceau spinothalamique
- **A.** Se projette sur le VPL
- **B.** Est constitué par le neurone efférent primaire
- **C.** Est impliqué dans la notion d'alerte
- **D.** Est observé dans les cordons latéraux médullaires

Q 13. L'épithélium olfactif contient
- **A.** Des cellules basales
- **B.** Des cellules sensorielles pseudo-unipolaires
- **C.** Des cellules glandulaires
- **D.** Des cellules de soutien

Q 14. Les cellules mitrales
- **A.** Contactent les glomérules
- **B.** Contactent le SNC
- **C.** Structurent l'épithélium olfactif
- **D.** Sont modulées par les cellules périglomérulaires

Q 15. Le seuil de discrimination tactile spatiale au niveau dorsal est de l'ordre
- **A.** Du micromètre
- **B.** Du millimètre
- **C.** Du centimètre
- **D.** Ne peut être déterminé

Q 16. Les afférences thermiques sont
- **A.** Possiblement amyéliniques
- **B.** Possiblement myélinisées
- **C.** Issues de structures corpusculaires
- **D.** Inhibées à 10°C

Q 17. Chassez l'intrus
- **A.** Cortex entorhinal
- **B.** Amygdale
- **C.** Cortex piriforme
- **D.** Hippocampe

Q 18. Les papilles caliciformes sont situées
- **A.** Sur le bord antérieur de la langue
- **B.** Sur le V lingual
- **C.** Sur les bords latéraux de la langue
- **D.** Dans plusieurs régions linguales

Q 19. Les papilles fongiformes sont
- **A.** Tactiles
- **B.** Gustatives
- **C.** Sur la pointe de la langue
- **D.** Peu nombreuses

Suite des questions

Q 20. Le nerf olfactif
- **A.** Est le I
- **B.** Est le V
- **C.** Est le VII
- **D.** N'existe pas

Q 21. Le faisceau cunéiforme
- **A.** Provient de la partie haute du corps
- **B.** Provient de la partie basse du corps
- **C.** Est en position interne dans le cordon dorsal
- **D.** Est en positon externe dans le cordon latéral

Q 22. La voie lemniscale est constituée de fibres de type
- **A.** I
- **B.** II
- **C.** III
- **D.** IV

Q 23. Les centres de traitement de l'information gustative sont situés
- **A.** Dans le thalamus
- **B.** Dans le cortex orbito-frontal
- **C.** Dans le cortex insulaire
- **D.** Dans le tronc cérébral
- **E.** Dans le noyau du VI

Q 24. La transduction du signal gustatif
- **A.** Fait intervenir des canaux ioniques
- **B.** Démarre au niveau de microvillosité
- **C.** Fait intervenir des récepteurs couplés à la protéine G
- **D.** En fait, on n'en sait rien !

Q 25. Les seuils de perception de l'odeur
- **A.** Dépendent de la concentration
- **B.** Sont influencés par des facteurs hormonaux
- **C.** Peuvent dépendre du sexe de l'individu
- **D.** Sont manipulés par des molécules de l'industrie chimique
- **E.** Sont déterminés par les circuits nerveux

Q 26. Les récepteurs à adaptation lente sont
- **A.** Meissner
- **B.** Merkel
- **C.** Pacini
- **D.** Ruffini

Q 27. Les AINS sont classés dans le traitement de la douleur dans
- **A.** La classe 1
- **B.** La classe 2
- **C.** La classe 3

Q 28. La perception tactile très fine fait intervenir
- **A.** Le corpuscule de Ruffini
- **B.** Le disque de Merkel
- **C.** Le corpuscule de Golgi
- **D.** Les terminaisons libres des follicules pileux

Q 29. Les noyaux thalamiques de la nociception sont
- **A.** Le noyau antérieur
- **B.** Le ventro-postérieur
- **C.** Le géniculé
- **D.** Les noyaux non spécifiques

Q 30. Le corpuscule de Ruffini se trouve au niveau
- **A.** De l'épiderme
- **B.** Du derme
- **C.** De l'hypoderme

Q 31. La somesthésie fait intervenir
- **A.** Des nocicepteurs encapsulés
- **B.** Des barocepteurs
- **C.** Des chimiorécepteurs
- **D.** Des thermocepteurs

Q 32. La perception d'une vibration dépend
- **A.** De la fréquence
- **B.** De l'amplitude
- **C.** De la taille du champ récepteur
- **D.** De la région stimulée

Q 33. Dans la notion d'hypoalgie, on trouve
- **A.** Le réflexe d'axone
- **B.** Le noyau de raphé
- **C.** Les endorphines
- **D.** Le glutamate

Q 34. La convergence entre les afférences extéroceptives et intéroceptives
- **A.** Est systématique
- **B.** N'existe pas
- **C.** Est trompeuse
- **D.** Toutes les réponses sont fausses

Q 35. La perte de goût est nommée
- **A.** Agueusie
- **B.** Anosmie
- **C.** A-saveurie
- **D.** Toutes les réponses sont fausses

Q 36. Les nocicepteurs sont présents
- **A.** Dans les muscles
- **B.** Dans le cerveau
- **C.** Dans les viscères pleins
- **D.** Dans les méninges

Q 37. Une lésion au niveau d'un épithélium correspond
- **A.** A une douleur neurogène
- **B.** A une douleur nociceptive
- **C.** A une douleur possiblement aigüe
- **D.** A une douleur possiblement chronique

Q 38. La théorie du portillon
- **A.** Est observée au niveau central
- **B.** Est observée au niveau périphérique
- **C.** Explique l'algie
- **D.** Nécessite un circuit spécifique

Q 39. Le faisceau antérolatéral transporte des informations
- **A.** Extéroceptives épicritiques
- **B.** Extéroceptives grossières
- **C.** Thermo-algiques
- **D.** Proprioceptives

Q 40. Le cortex somesthésique
- **A.** Présente une topie peu précise
- **B.** Est pariétal
- **C.** Est connecté au cortex moteur
- **D.** Est à tendance granulaire

Q 41. La branche maxillaire du nerf crânien V aboutit au ganglion
- **A.** Géniculé
- **B.** Pétreux
- **C.** De Gasser
- **D.** Plexiforme

Suite des questions

Q 42. Le neurone primaire nociceptif ne libère pas

A. Du glutamate
B. Des ions H+
C. Du GABA
D. De la substance P

Q 43. Dans l'algésimétrie, l'échelle EDIN correspond

A. A une autoévaluation
B. A une hétéroévaluation
C. A une observation chez le nouveau-né
D. A une utilisation chez l'enfant entre 2 et 7 ans

Q 44. Chassez l'intrus

A. ALGOPLUS
B. HEDEN
C. DOLOPLUS
D. ECPA

Q 45. Les nocicepteurs articulaires sont

A. Des mécanorécepteurs
B. Des chémorécepteurs
C. Sensibles à l'élongation
D. Insensibles à l'inflammation

Q 46. Les prostaglandines

A. Génèrent les PA nociceptifs
B. Augmentent le seuil de sensibilité
C. Provoquent les dépolarisations nociceptives
D. Abaissent le seuil de sensibilité

Q 47. Le noyau thalamique du traitement de la douleur faciale est

A. Le noyau spinal
B. Le noyau principal
C. Le noyau caudal
D. La cible du deutoneurone

Q 48. Le nombre de nerfs médullaires nociceptifs est de

A. 12
B. 24
C. 31
D. 62

Q 49. Les régions médullaires impliquées dans la nociception sont

A. La I
B. La II
C. La III
D. La VI

Q 50. Le cours de neurophysiologie

A. Vous a permis de comprendre certaines choses
B. Vous permettra de comprendre certaines choses
C. Vous sera inutile auprès de vos patients
D. Vous servira peut être en 3ème année !