

**Examenul de bacalaureat național 2019**

**Proba E. c)**

**Matematică M\_mate-info**

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Varianta 2**

*Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică -informatică*

*Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică -informatică*

✓ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.

✓ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

✓ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

<b>1.</b>	$q = 3 \quad b_3 = 9$ $b_1 + b_2 + b_3 = 1 + 3 + 9 = 13$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>2.</b>	$x_1 + x_2 = -m, \quad x_1 x_2 = 7$ $-2m + 21 = 1$ , deci $m = 10$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>3.</b>	$(x - 2)(x + 2) = 2^5 \quad x^2 - 36 = 0$ $x = -6$ , care nu convine, $x = 6$ , care convine	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>4.</b>	Prima cifră se poate alege în 5 moduri Pentru fiecare alegere a primei cifre, a doua cifră se poate alege în 4 moduri Pentru fiecare alegere a primelor două cifre, a treia cifră se poate alege în 3 moduri, deci se pot forma 5   4   3   de numere	<b>1p</b> <b>1p</b> <b>3p</b>
<b>5.</b>	Punctul $M$ este mijlocul segmentului $AB$ $x_M = 4, \quad y_M = 4$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>6.</b>	$\Delta_{ABC} = \frac{AB \cdot AC \cdot \sin \left  \frac{2\pi}{3} \right }{2} = \frac{3\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \left  \frac{\sqrt{3}}{2} \right }{2} =$ $= \frac{12 \cdot 3}{4} = 9$	<b>3p</b> <b>2p</b>

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$A(0) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \det(A(0)) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$ $= 0 + 1 + (-1) - 0 - 0 - 0 = 0$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>b)</b>	$\det(A(a)) = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = -a^3 + a =$ $= a(1 - a^2) = a(1 - a)(1 + a), \text{ pentru orice număr real } a$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	Pentru $a = 0$ , sistemul este compatibil nedeterminat și soluțiile sistemului sunt de forma $(1 + \alpha, 1 - \alpha, \alpha)$ , unde $\alpha \in \mathbb{R}$ Pentru orice $\alpha$ număr întreg, numerele $x_0 = 1 + \alpha, y_0 = 1 - \alpha$ și $z_0 = \alpha$ sunt întregi	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>2.a)</b>	$x * 2019 = (x - 2019)(2019 - 2019) + 2019 =$ $= 0 + 2019 = 2019, \text{ pentru orice număr real } x$	<b>3p</b> <b>2p</b>

<b>b)</b>	$x * x = (x - 2019)^2 + 2019, (x * x) * x = (x - 2019)^3 + 2019$ $(x - 2019)^3 + 2019 = x \mid x \in (x - 2019) \mid ((x - 2019)^2 + 2019) \neq \emptyset$ , deci $x = 2018$ sau $x = 2019$ sau $x = 2020$	<b>2p</b>  <b>3p</b>
<b>c)</b>	$(m - 2019)(n - 2019) + 2019 = 2020 \mid (m - 2019)(n - 2019) \neq 0$ Cum $m$ și $n$ sunt numere întregi, obținem $m = 2018, n = 2018$ sau $m = 2020, n = 2020$	<b>2p</b> <b>3p</b>

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x} =$ $= \frac{\sqrt{x}}{2x} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x} - 2}{2x}, x \in (0, +\infty)$	<b>3p</b>  <b>2p</b>
<b>b)</b>	$f(1) = 1, f'(1) = -\frac{1}{2}$ Ecuația tangentei este $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$ , adică $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$	<b>2p</b>  <b>3p</b>
<b>c)</b>	$f'(x) = 0 \mid x = 4$ $x \in (0, 4] \mid f'(x) < 0$ , deci $f$ descresc toată pe $(0, 4]$ și $x \in [4, +\infty) \mid f'(x) > 0$ , deci $f$ este crescătoare pe $[4, +\infty)$ Cum $f(4) = 2 - \ln 4$ , obținem $f(x) > 2 - \ln 4$ , deci $\sqrt{x} - \ln \frac{x}{4} > 2 - \ln 4$ , pentru orice $x \in (0, +\infty)$	<b>1p</b> <b>2p</b> <b>2p</b>
<b>2.a)</b>	$\int_0^1 (x^2 + 9)f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big _0^1 =$ $= \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$	<b>3p</b>  <b>2p</b>
<b>b)</b>	$F'(x) = f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 9}, F''(x) = f'(x) = \frac{18x}{(x^2 + 9)^2}, x \in \mathbb{R}$ , unde funcția $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o primitivă a lui $f$ $F''(x) = 0 \mid x = 0$ $x \in (-\infty, 0) \mid F''(x) < 0$ și $x \in (0, +\infty) \mid F''(x) > 0$ , deci $F$ are un singur punct de inflexiune	<b>2p</b>  <b>1p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	$x \in [0, 1] \mid x^{2n} \in [0, 1]$ și, cum $0 < f(x) < 1$ , obținem $0 < x^{2n} f(x) < x^{2n}$ $0 < \int_0^1 x^{2n} f(x) dx < \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big _0^1 = \frac{1}{2n+1}$ și $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+1} = 0$ , deci $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^{2n} f(x) dx = 0$	<b>2p</b>  <b>3p</b>