

TD N° 5 : CALCUL MATRICIEL

Exercice n° 1 Manipulation de coefficients

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -6 & 8 & 4 \\ 0 & 7 & 3 & 11 \\ 22 & 17 & 0,1 & 8 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 & \dots & 7 \\ \dots & 9 & \dots \\ 8 & \dots & 0 \\ 7 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

1. Donner la taille de A ;
2. Donner la valeur de chacun des éléments a_{14} , a_{23} , a_{33} et a_{32} ;
3. Compléter l'écriture de B de taille 4×3 avec : $b_{32} = 5$, $b_{23} = -4$, $b_{21} = 8$ et $b_{12} = 11$.
4. Donnez la matrice C telle que pour tout indice i et j avec, $1 \leq i \leq 3$ et $1 \leq j \leq 3$, le terme c_{ij} soit donné par la formule $c_{ij} = 2i - j$

Exercice n° 2 Somme de matrices, systèmes

On donne $A = \begin{pmatrix} x & 5 \\ 0 & 2x \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} y & 7 \\ -1 & 3y \end{pmatrix}$

1. Trouver x et y pour que $A + B = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -1 & 17 \end{pmatrix}$
2. Trouver x et y pour que $2A - 4B = \begin{pmatrix} -5 & -18 \\ 4 & -16 \end{pmatrix}$

Exercice n° 3 Produit de matrices

1. Soit les matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer $A \times B$, $B \times A$, $A \times u$, $v \times B$ et $u \times v$.

2. Soit A la matrice $A = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$

a) Calculer A^2 et montrer qu'il existe un réel α tel que $A^2 = \alpha A$.

b) En déduire la valeur de A^3 , A^4 et plus généralement A^n , pour $n \in \mathbb{N}^*$

3. Soit B la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

a) Calculer B^2 , B^3 , B^4 .

b) On admet l'existence, pour tout entier naturel non nul n , d'un réel a_n tel que $C^n = a_n C$.

Trouver une expression de a_{n+1} en fonction de a_n , et en déduire la valeur de C^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

4. Existe-t-il des matrices égales à leur carré ?

- a) Que peut-on dire des dimensions d'une matrice A égale à son carré $A \times A$?
- b) Savez-vous répondre à la question posée pour des matrices carrées d'ordre 1 ?
- c) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$

Calculer M^2 . Y a-t-il des valeurs de a et b pour lesquelles $M^2 = M$?

- d) Un brillant élève propose le raisonnement suivant à son professeur (où I est la matrice identité et où O est la matrice nulle) :

$$M^2 = M \Leftrightarrow M^2 - M = O \Leftrightarrow M(M - I) = O \Leftrightarrow M = O \text{ ou } M = I$$

Le professeur lui fait remarquer qu'on a trouvé d'autres solutions que les deux solutions évidentes O et I ! Où l'élève s'est-il trompé ?

Exercice n° 4 Application économique

Sur un chantier de bâtiment, trois entreprises cohabitent : Pouygues, Tumez et Sogea. Elles ont besoin par jour, pour le bon déroulement du chantier de :

	Ciment en tonnes	Sable en m^3	Gravillon en m^3
Pouygues	10	5	5
Tumez	8	3	2
Sogea	7	3	2

Ces renseignements sont présentés sous forme d'une matrice 3×3 , appelée matrice des achats, notée A .

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 5 \\ 8 & 3 & 2 \\ 7 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ces matériaux sont vendus par trois fournisseurs aux prix unitaires, en euros, indiqués dans le tableau suivant.

	Fournisseur 1	Fournisseur 2	Fournisseur 3
Ciment	60	55	63
Sable	15	17	13
Gravillon	17	16	15

Ces renseignements seront présentés sous forme d'une matrice 3×3 , appelée matrice des prix, notée P . Effectuer le produit $A \times P$. Que représentent les nombres obtenus dans chacune des colonnes de la matrice $A \times P$.

Exercice n° 5 Résolution de systèmes

1. Résoudre par substitution : $(S_1) \begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - 5y = -21 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} 7x - 3y = -48 \\ x + 11y = 16 \end{cases}$
2. Résoudre par combinaison linéaire : $(S_3) \begin{cases} 7x - 3y = 5 \\ 4x + 11y = -6 \end{cases} \quad (S_4) \begin{cases} 15x - 14y = -3 \\ 12x + 7y = 5 \end{cases}$
3. Un système admet-t-il toujours un couple solution ?
Étudier les systèmes :
 $(S_5) \begin{cases} x - 3y = 5 \\ -4x + 12y = -6 \end{cases} \quad (S_6) \begin{cases} x - 4y = -3 \\ -2x + 8y = 6 \end{cases}$

On appelle déterminant du système $(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ le réel $\delta = ab' - a'b$.

Si δ est nul le système admet

- soit, une infinité de couples solutions ; (Exemple $S = \{(4y - 3, y), y \in \mathbb{R}\}$)
- soit, aucune solution : $S = \emptyset$.

Si le déterminant du système est non nul, le système admet un unique couple solution.

4. Résoudre selon la méthode de votre choix :

$$(S_7) \begin{cases} 2x - 5y + 8 = 0 \\ x - 7y - 15 = 0 \end{cases} \quad (S_8) \begin{cases} \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y = 6 \\ \frac{1}{9}x - \frac{1}{4}y = -1 \end{cases}$$

Exercice n° 6 Matrices et systèmes

1. Mettre en évidence dans les systèmes suivants la matrice A telle que $A \times X = B$ où $X = (x, y, z)$ et B est un vecteur colonne (une matrice n lignes, 1 colonne).

$$(S_9) \begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ \quad y + 2z = -1 \\ -x - 4y - z = 3 \end{cases} \quad (S_{10}) \begin{cases} x + 3y + 3z = 6 \\ x + 4y + 3y = -1 \\ x + 3y + 4z = 5 \end{cases}$$

2. Effectuer les produits suivants :

$$\begin{pmatrix} 7 & -10 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & -4 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. En déduire les éventuelles matrices inverses des matrices A mises en évidence à la première question.
4. Résoudre les systèmes proposés.

Exercice n° 7 Matrices et systèmes

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$