



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



BRZUSZKOLE

Brzuszek zostaje w przedszkolu

Praktyczne wskazówki na temat profilaktyki otyłości
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 4-7 lat

Wstęp

Co siódme dziecko w wieku wczesnoszkolnym w Polsce ma nadwagę lub otyłość, w kolejnych latach dorastania problem u dzieci narasta. U 30% piętnastolatków BMI przekracza normę, a aż 80% nastolatków z nadwagą stanie się otyłymi dorosłymi. Otyłość u rodziców zwiększa ryzyko otyłości u dziecka do 70%.

W grupie najmłodszych dzieci łatwiej wprowadzać zmiany w nawykach żywieniowych i stylu życia, które będą zapobiegały otyłości w wieku dorosłym i powikłaniom zdrowotnym z tym związanym.

Dzieci z nadwagą i otyłością, które rozpoczynają naukę w szkole mierzą się często z negatywnymi komentarzami na temat swojego wyglądu i bywają wykluczane z grupy z rówieśniczej. Brzuszkole zawiera praktyczne wskazówki, dzięki którym Państwa dziecko ma szansę uporać się z nadwagą lub otyłością przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Zdrowe nawyki chroniące przed otyłością

- Jedzenie nie może być nagrodą ani formą pocieszenia
- Rób zakupy wspólnie z dzieckiem – sprawdzajcie wartość odżywczą i kaloryczność wybranych składników
- Zaangażuj dziecko we wspólne przyrządzanie posiłków
- Jak najwięcej posiłków spożywajcie razem w domu, przy wspólnym stole
- Nie pozwalaj na jedzenie przed telewizorem, komputerem, w czasie korzystania z telefonu komórkowego
- Ogranicz pokusy limitując dostęp dziecka do bogatokalorycznych przekąsek i słodzonych napojów
- Ty wybierasz czas i rodzaj posiłku, ale nie namawiaj dziecka do jedzenia, jeśli zgłasza, że jest już syte
- Nadmiar jedzenia i niezdrowych przekąsek może dziecku zaszkodzić – naucz się mu odmawiać
- Zadbaj o systematyczność jedzenia, nie pozwól na opuszczanie posiłków, zwłaszcza śniadania
- Używaj małych talerzy – wtedy porcje wydają się większe
- Nie dawaj dokładek
- Planuj posiłki z wyprzedzeniem
- Reaguj na reklamy niezdrowej żywności
- Wprowadź zmiany w życiu całej rodziny wg zasady *rób tak jak ja* (bądź przykładem), a nie *rób tak jak każę*
- Cała rodzina *mówi jednym głosem* – częścią zespołu terapeutycznego są również dziadkowie, ciocie, opiekunki



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Jeśli dziecko jest na diecie to nie może czuć się izolowane – wprowadź zmiany w żywieniu całej rodziny

Podstawowe zasady zdrowego żywienia

✓ Planuj 5 posiłków dziennie

- Przykładowo:
- 3 posiłki główne (śniadanie, obiad, kolacja)
 - 2 mniejsze dania (drugie śniadanie, podwieczorek)

✓ Często podawaj dziecku wodę

Najlepiej co najmniej 6 szklanek dziennie – do posiłków i między nimi.

1 szklanka to 240 ml wody – podawaj po 1 szklance do każdego posiłku i przynajmniej 1 szklankę między posiłkami.

✓ Unikaj soków owocowych

100 ml soku to 10 g węglowodanów przyswajalnych – zapamiętaj, że *soki „idą” w boki!*

1 szklanka soku naturalnego = 5 łyżeczek cukru (rysunek)

Ogranicz spożywanie soków owocowych do 170 ml dziennie.

✓ Soki zamień na surowe owoce

Najlepiej spożywać ok. 200-300 g surowych owoców dziennie.

- 200-300 g owoców to tyle samo co:
- 1,5 banana
 - 3 jabłka
 - 40 truskawek (rysunek)

✓ Do każdego posiłku dodawaj warzywa

Najlepiej zjadać ok. 500 g warzyw dziennie.

Najlepsze warzywa są w postaci surowej – w tej formie zachowują najwyższą wartość odżywczą i mają najwięcej witamin.

Wykorzystaj warzywa sezonowe niskokaloryczne: pomidory, ogórki, sałata, rzodkiewka, papryka, brokuły, kalafior.

Przykłady zestawów 500 g warzyw (rysunek)

○ Zestaw 1:

- 1 duży pomidor (150g)
- 4-5 listków sałaty (50g)
- 1 ogórek gruntowy świeży (100g)
albo ogórek kiszony (100g)
- 1 średnia marchew (100g)
albo 1 średni kwiat brokuła (bez nóżki) (100g)
- 7-8 średnich rzodkiewek (100g)

○ Zestaw 2:

- 1 średnia marchew (100g)
- 1 średni pomidor (100g)
- 1 średni obrany burak, tj. 5 łyżek (100g)
- 3 łyżki groszku (50g)
- 4 łyżki surówki z białej kapusty (100g)
- 5 średnich rzodkiewek (50g)

✓ **Wybieraj produkty zbożowe pełnoziarniste o niskim indeksie glikemicznym**

Indeks glikemiczny (IG) to wskaźnik informujący o wpływie produktów żywnościowych na wzrost poziomu glukozy we krwi po upływie ok. 2-3 godzin od ich spożycia.

U zdrowego człowieka po każdym posiłku stężenie glukozy podnosi się, jednak po upływie 2-3 godzin powinno ono wrócić do normalnego

poziomu (ok. 150 mg/dl).

Nie wszystkie produkty spożywcze podnoszą poziom glukozy w jednakowym stopniu, niektóre z nich robią to w sposób gwałtowny (wysoki IG), inne uwalniają glukozę stopniowo (niski IG).

Przykładowe produkty zbożowe o niskim IG: pieczywo razowe i graham, kasza gryczana, jęczmienna, ryż brązowy, makarony pełnoziarniste, płatki owsiane, jęczmienne, musli z suszonymi owocami i tym podobne.

✓ **Pamiętaj o źródłach wapnia**

Codziennie dziecku wapnia potrzeba tyle, ile znajduje się w 3-4 szklankach mleka.

Szklankę mleka można zastąpić innymi produktami mlecznymi:

- 1 szklanka mleka to tyle samo co:
- ½ serka homogenizowanego (75 g)
 - 1 większy plaster sera żółtego
 - 1 szklanka jogurtu
 - 2 łyżki twarogu

Przykładowy zestaw produktów mlecznych zapewniających dzienne pokrycie na wapno:

- 1 szklanka mleka
 - 2 łyżki twarogu
 - 1 opakowanie serka homogenizowanego (150 g)
- (rysunek)

✓ **Jako źródła białka wybieraj produkty o niskiej zawartości tłuszczu**

Przykładowe produkty spożywcze o niskiej zawartości tłuszczu: chude

mięso, ryby, jaja, sery oraz nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soczewica).

✓ **Staraj się zastępować tłuszcze zwierzęce – roślinnymi**

✓ **Unikaj słodkich napojów i słodczy**

Zastępuj je owocami, nasionami i orzechami.

✓ **Ogranicz spożycie soli**

Sól możesz zastąpić świeżymi i suszonymi przyprawami ziołowymi.

✓ **Pamiętaj, że prawidłowe żywienie powinno być realizowane wraz z pozostałymi elementami stylu życia**

Zadbaj o odpowiednią ilość snu (przynajmniej 9 godzin) i przynajmniej godzinną aktywność fizyczną swojego dziecka każdego dnia.

✓ **Sprawdzaj raz w miesiącu masę ciała i wzrost dziecka**

Dzięki temu oceniasz proporcje ciała i podtrzymujesz motywację do zmiany zachowań.

Opracowano na podstawie:

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4-18 lat),

Jarosz M., Narodowe Centrum Edukacji Żywnościowej, Warszawa,

<https://ncez.pzh.gov.pl/dzieci-i-mlodziez/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu->



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



[zycia-dzieci-i-młodzieży-2/](#) (dostęp: 08.2022)

Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, Horvath A., Szajewska H.,
Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, ISBN 9788374305143

Talerz zdrowego odżywiania w profilaktyce nadwagi i otyłości u dzieci

✓ **Tłuszcze**

Używaj zdrowych olejów (np. oliwa, olej rzepakowy) do gotowania i surówek, ale z umiarem. Ogranicz spożycie masła. Unikaj oleju kokosowego i palmowego oraz tłuszczów nasyconych typu trans, zawartych w słodyczach (wafelki, batoniki, herbatniki) i produktach typu *fast food* – sprzyjają chorobom układu krążenia.

✓ **Warzywa**

Im więcej różnokolorowych warzyw, tym lepiej (minimum 0,5 kg warzyw dziennie). Barwa warzyw wiąże się z zawartością określonych substancji, które mają wpływ na ich właściwości zdrowotne. Ziemniaki i frytki powinny być ograniczone ze względu na wysoką gęstość energetyczną i wysoki indeks glikemiczny.

✓ **Owoce**

Jedz codziennie od 200-300 g różnokolorowych owoców w postaci surowej do posiłków i między nimi.

✓ **Woda**

Pij jak najwięcej wody, poza tym herbatę, soki warzywne i warzywno-owocowe (sok pomidorowy, sok z białej kapusty, sok z pokrzywy, sok marchwiowy). Unikaj napojów słodzonych, w tym gotowych soków owocowych. Przykładowo, 100 ml soku jabłkowego zawiera tyle cukrów,

ile 400 ml soku pomidorowego.

✓ **Produkty zbożowe pełnoziarniste**

Produkty te powinny być składnikiem większości posiłków. Dostarczają węglowodanów złożonych, witamin z grupy B, składników mineralnych i błonnika pokarmowego ułatwiającego utrzymanie prawidłowej masy ciała.

✓ **Zdrowe białko**

Znajdziesz je w rybach, drobiu, warzywach strączkowych, jajach, twarogu i orzechach; spożywaj je kilka razy w tygodniu. Ogranicz spożycie czerwonego mięsa, żółtych serów i gotowych przetworów mięsnych poddawanych peklowaniu, wędzeniu i marynowaniu.

✓ **Bądź aktywny!**

Codzienna aktywność fizyczna zapewnia nie tylko dobrą kondycję fizyczną i umysłową, ale wpływa na prawidłową sylwetkę i atrakcyjny wygląd.

Powyżej tekst, którym trzeba zastąpić napisy na grafice talerza – dlatego poniżej tylko przykładowa grafika

IV. Siatki centylowe

Siatki centylowe to wykresy, na których znajdują się krzywe obrazujące typowe zmiany wagi i wzrostu dzieci zależnie od ich wieku i płci (siatki dla dziewcząt i chłopców są różne). Powstały dzięki danym zebranych z licznych pomiarów aby skutecznie monitorować rozwój dziecka.

Centyle (poprawniej: percentyle) są wartościami statystyczne. Przykładowo, średni wzrost i waga to te, które ma połowa dzieci w danym wieku.

Statystycznie oznacza to, że waga lub wzrost tych dzieci jest na poziomie 50-go centyla (to tzw. mediana) – na wykresach obrazuje to najczęściej środkowa krzywa. Pozostałe krzywe pokazują ile procent dzieci w danym wieku uzyskuje średnio wyższe, a ile niższe wyniki.

Na siatce typowo zaznacza się krzywe dla następujących punktów odniesienia: 3 centyla (lub 5), 10, 25, 50, 75, 90 i 97 (lub 95). Obszary między sąsiadującymi krzywymi określa się jako *przedziały centylowe*. Nanosząc co jakiś czas (najlepiej regularnie, np. co miesiąc) kolejne pomiary, można uzyskać *krzywą rozwoju* dziecka. Jeżeli mieści się ona cały czas w tym samym przedziale centylowym (ewentualnie w dwóch sąsiednich), oznacza to, że dziecko rozwija się harmonijnie.

Potrzeba konsultacji lekarskiej zachodzi jeśli wyniki pomiarów lokują dziecko poniżej 3. i powyżej 97. centyla. Jeśli wartości są poniżej 10. i powyżej 90. centyla, niekoniecznie świadczy to o nieprawidłowości, jednak wskazana jest wówczas rozmowa z lekarzem. Warto także zasięgnąć porady jeśli zachodzi duża rozbieżność pomiędzy wynikami pomiarów wagi i wzrostu.


Zamieszczone poniżej siatki centylowe zostały opracowane na podstawie danych reprezentatywnych dla populacji dzieci i młodzieży z całej Polski w wieku od 3 do 18 lat, dobranych w sposób losowy. Dane zostały pozyskane w

wyniku realizacji projektów OLAF i OLA koordynowanych przez Instytut
Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w latach 2007-2012.


Więcej o projekcie OLAF:

[http://olaf.czd.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=22&Itemid=23](http://olaf.czd.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=23)


(dostęp 08.2022)




Siatka centylowa masy ciała chłopców w wieku 3-18 lat; badania OLA i OLAF;
pomiarzy dzieci i młodzieży w latach 2007-2012




Siatka centylowa masy ciała dziewcząt w wieku 3-18 lat; badania OLA i OLAF;
pomiarzy dzieci i młodzieży w latach 2007-2012




Siatka centylowa wysokości ciała chłopców w wieku 3-18 lat; badania OLAi OLAF;
pomiarzy dzieci i młodzieży w latach 2007-2012



Siatka centylowa wysokości ciała chłopców w wieku 3-18 lat; badania OLAi OLAF;
pomiarzy dzieci i młodzieży w latach 2007-2012




Siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt w wieku 3-18 lat; badania OLAi OLAF;
pomiarzy dzieci i młodzieży w latach 2007-2012



BMI – wskaźnik masy ciała (ang. *body mass index*)

BMI wyliczamy dzieląc wagę dziecka (w kilogramach) przez kwadrat wzrostu (w metrach):

$$BMI[kg/m^2] = \frac{waga[kg]}{wzrost[m]^2}$$



BMI – wskaźnik masy ciała (ang. *body mass index*)

BMI wyliczamy dzieląc wagę dziecka (w kilogramach) przez kwadrat wzrostu (w metrach):

$$BMI[kg/m^2] = \frac{waga[kg]}{wzrost[m]^2}$$

Dzienniczek pomiarów

[illegible][illegible]



Z teorii do praktyki – ocena przestrzegania zaleceń

Możecie z dzieckiem wykorzystać poniższą tabelkę do systematycznej kontroli przestrzegania zasad zdrowego żywienia, wystawiając sobie oceny jak w szkole:

zalecenie	data →					
	ocena 1-6		ocena 1-6		ocena 1-6	
	R	D	R	D	R	D
- nie używaj jedzenia jako nagrody albo pocieszenia - w czasie zakupów sprawdzajcie wartości odżywcze produktów - zaangażuj dziecko we wspólne przyrządzanie posiłków - jak najwięcej posiłków spożywajcie razem w domu przy stole - nie pozwalaj na jedzenie przed ekranami - ogranicz dostęp do wysokokalorycznych przekąsek i słodzonych napojów - nie namawiaj dziecka do jedzenia, jeśli zgłasza, że jest już syte - naucz się dziecka odmawiać nadmiaru jedzenia i niezdrowych przekąsek - zadbaj o systematyczność jedzenia, nie pozwól na opuszczanie posiłków - używaj małych talerzy - nie dawaj dokładek - planuj posiłki z wyprzedzeniem - reaguj na reklamy niezdrowej żywności - wprowadź zmiany w życiu całej rodziny – bądź przykładem - cała rodzina dba o dietę, w tym dziadkowie i dalsi krewni - wprowadź zmiany w diecie całej rodziny – nie izoluj dziecka						

Legenda:

R – ocena od rodzica

D – ocena od dziecka