

Analiza 1

Vid Drobnič

Kazalo

1	Števila	3
1.1	Naravna števila	3
1.2	Cela števila	4
1.3	Racionalna števila	4
1.4	Dedekindov aksiom in Realna števila	11
1.5	Posledice Dedekindovega aksioma	18
1.6	Intervali	19
1.7	Decimalni ulomki	20
1.8	Absolutna vrednost	23
1.9	Kompleksna števila	24
1.9.1	Lastnosti	27
1.9.2	Geometrijska interpretacija	28
1.9.3	Polarni zapis	29
2	O množicah in preslikavah	31
3	Številska zaporedja	33
3.1	Monotona zaporedja	39
3.2	Podzaporedja	41
3.3	Računanje z zaporedji	42
3.4	Cauchyjev pogoj	47
3.5	Potence z realnimi eksponenti	52
3.6	Zgornja in spodnja limita	57
3.7	O zaporedjih kompleksnih števil	60

4	Številске vrste	61
4.1	Vrte z nenegativnimi členi	66
4.2	Absolutna konvergenca	74
4.3	O preureditvah vrst	76
4.4	Množenje vrst	78
4.5	Dvakratne vrste	80
5	Funkcije realne spremenljivke	81
5.1	Operacije s funkcijami	83
5.2	Zveznost	86
5.2.1	Opis zveznosti z zaporedji	87
5.2.2	Lastnosti zveznih funkcij	92
5.3	Monotone zvezne funkcije	94
5.4	Zveznost posebnih funkcij	95
5.5	Trigonometrične funkcije	98
5.6	Ciklometrične funkcije	98
5.7	Limita funkcije	99
5.8	Odvod	103
5.9	Diferencial	105
5.10	Pravila za odvajanje	107
5.10.1	Konstante	107
5.10.2	107

1 Števila

1.1 Naravna števila

- Z njimi štejemo: 1, 2, 3
- Množico naravnih števil označimo z \mathbb{N}

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

- Vsako naravno število n ima naslednika n^+ ($n^+ = n + 1$)

Peanovi aksiomi:

\mathbb{N} je množica skupaj s pravilom, ki vsakemu naravnemu številu n dodeli njegovega naslednika $n^+ \in \mathbb{N}$ in velja:

1. za vse $m, n \in \mathbb{N}$ če $m^+ = n^+$, potem $m = n$
2. obstaja $1 \in \mathbb{N}$, ki ni naslednik nobenega naravnega števila
3. Če je $A \subset \mathbb{N}$ in če je $1 \in A$ ¹ in če velja: če $n \in A$, potem $n^+ \in A$ ², potem $A = \mathbb{N}$

Aksiom (3) se imenuje **aksiom popolne indukcije**.

- Naravna števila lahko **seštevamo, množimo**.
- \mathbb{N} so urejena po velikosti 1, 2, 3, 4, 5, ...

$$\{3, 5, 6, 10\} \subset \mathbb{N}$$

$$\{3, 5, 7, 16, 23, \dots\} \subset \mathbb{N}$$

- Vsaka neprazna podmnožica \mathbb{N} ima najmanjši element.
- V splošnem ne velja³, da ima vsaka neprazna podmnožica \mathbb{N} največji element.

¹indukcijska baza

²indukcijski korak

³ne velja za vse (množice)

1.2 Cela števila

Označimo jih z \mathbb{Z}

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$$

- Seštevanje in množenje se iz \mathbb{N} razširita na \mathbb{Z} .
- Poleg tega je definiramo **odštevanje**.
- Množico celih števil uredimo na običajen način.
- Ni res, da bi imela vsaka neprazna podmnožica \mathbb{Z} najmanjši element.
- V splošnem deljenje ni definirano $\left(\frac{3}{2}\right)$

1.3 Racionalna števila

Racionalna števila so kvocienti celih števil. Bolj natančno: kvocienti celih in naravnih števil.

Dva ulomka $\frac{m}{n}, \frac{k}{l}$ predstavljata isto racionalno število če: $ml = nk$ lahko naredimo:

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N} = \{(m, n), m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$$

Množico $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ razdelimo na razrede: urejena para (m, n) in (k, l) sta v istem razredu, če velja $ml = nk$.

Racionalno število je razred urejenih parov in ga označimo z $\frac{m}{n}$.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Seštevanje v \mathbb{Q} :

$$\frac{m}{n} + \frac{k}{l} = \frac{ml + kn}{nl}, m, k \in \mathbb{Z}, n, l \in \mathbb{N}$$

Seštevanje ulomkov je *dobro definirano*:

če je: $\frac{m'}{n'} = \frac{m}{n}, \frac{k'}{l'} = \frac{k}{l}$

potem je: $\frac{m'}{n'} + \frac{k'}{l'} = \frac{m}{n} + \frac{k}{l}$

vemo: $m'n = mn'$ in $k'l = kl'$

Dokaz:

$$\begin{aligned}\frac{m'}{n'} + \frac{k'}{l'} & \stackrel{(def)}{=} \frac{m'l' + n'k'}{n'l'} \cdot \frac{mk}{mk} = \\ & = \frac{m'l'mk + n'k'mk}{n'ml'k} = \\ & = \frac{m'mk'l + m'nk'k}{m'nk'l} = \frac{ml + nk}{nl} \stackrel{(def)}{=} \frac{m}{n} + \frac{k}{l}\end{aligned}$$

Množenje v \mathbb{Q} :

$$\frac{m}{n} \cdot \frac{k}{l} = \frac{mk}{nl}, m, k \in \mathbb{Z}, n, l \in \mathbb{N}$$

Množenje je dobro definirano (izpeljava doma).

Deljenje v \mathbb{Q} :

$$\frac{m}{n} : \frac{k}{l} = \frac{ml}{nk}, m, k \in \mathbb{Z}, n, l \in \mathbb{N}, k \neq 0$$

Lastnosti seštevanja

Naj bo A (številsko) množica z operacijama $+$ in \cdot .

Osnovne lastnosti računskih operacij bomo imenovali **aksiomi**. Druge lastnosti izpeljemo iz aksiomov.

A1 asociativnost seštevanja

Za vse $a, b, c \in A$ velja $(a + b) + c = a + (b + c)$

A2 komutativnost seštevanja

Za vse $a, b \in A$ velja da $a + b = b + a$

A3 obstoj enote za seštevanje

Obstaja za element $0 \in A$ za katerega velja da: $0 + a = a$ za vse $a \in A$

A4 obstoj nasprotnega števila (elementa)

Za vsak $a \in A$ obstaja nasprotno število $-a \in A$ za katerega velja:
 $(-a) + a = 0$

Opomba: Množica A za operacijo $+$, ki ustreza aksiomom od A1 do A4 je **Abelova grupa** za $+$.

Trditev: Naj $(A, +)$ ustreza aksiomom od A1 do A4.

- (1) $\forall a \in A$ ima eno samo nasprotno število
- (2) **Pravilo krajšanja:** za vse $a, x, y \in A$ velja: $a + x = a + y \Rightarrow x = y$
- (3) $-0 = 0$

Dokaz:

- (1) izberemo poljubno število $a \in A$. Dokazujemo da ima a natanko 1 nasprotni element.

Po A4 nasprotno število obstaja. Denimo, da sta $b, c \in A$ nasprotni števili od a .

$$\begin{aligned} b + a = 0 \text{ in } c + a = 0 \\ (a + b) + c \stackrel{A2}{=} (b + a) + c \stackrel{\text{predp.}}{=} 0 + c \stackrel{A2}{=} c \\ (a + b) + c \stackrel{A2}{=} (b + a) + c \stackrel{A1}{=} b + (a + c) \stackrel{A2}{=} b + (c + a) \stackrel{\text{predp.}}{=} b + 0 \stackrel{A2}{=} 0 + b \stackrel{A3}{=} b \\ c = b \end{aligned}$$

- (2)

$$\begin{aligned} a + x = a + y &\stackrel{A4}{\Rightarrow} \\ \Rightarrow (-a) + (a + x) &= (-a) + (a + y) \stackrel{A1}{\Rightarrow} \\ \Rightarrow ((-a) + a) + x &= ((-a) + a) + y \stackrel{A4}{\Rightarrow} \\ \Rightarrow 0 + x = 0 + y &\stackrel{A3}{\Rightarrow} \\ \Rightarrow x = y \end{aligned}$$

- (3) $-0 = 0$

$$0 \stackrel{A4}{=} (-0) + 0 \stackrel{A2}{=} 0 + (-0) \stackrel{A3}{=} -0$$

Odštevanje v A : razlika števil a in b je vsota a in nasprotnega elementa od b .

$$a - b := a + (-b)$$

$b - a$ je rešitev enačbe $a + x = b$

Pozor: odštevanje ne ustreza aksiomom od A1 do A4.

Lastnosti množenja

A5 asociativnost množenja

Za vse $a, b, c \in A$ velja: $(ab)c = a(bc)$

A6 komutativnost množenja

Za vse $a, b, c \in A$ velja: $ab = ba$

A7 obstoj enote za množenje

$\exists 1 \in A : 1 \cdot a = a$, za $\forall a \in A$

A8 obstoj obratnega števila (elementa)

Vsak $a \in A, a \neq 0$, ima obratni element, tj.: $a^{-1} \in A : a^{-1} \cdot a = 1$

Množici A z operacijo $+$, ki ustreza A1-A4, rečemo **grupa za seštevanje** (Abelova grupa).

Množica $A \setminus \{0\}$ z operacijo \cdot , ki ustreza A5-A8 je **grupa za množenje**.

Podobno kot za seštevanje lahko izpeljemo:

Trditve: veljajo:

(1) Vsak $a \in A \setminus \{0\}$ ima eno samo obratno število

(2) (pravilo krajšanja za množenje)

Za vsak $a, x, y \in A$ velja: $ax = ay \Rightarrow x = y$

(3) $1^{-1} = 1$

A9 Števili 0 in 1 sta različni $0 \neq 1$

A10 Distributivnost

Za vsake $a, b, c \in A$ velja:

$$(a + b)c = ac + bc$$

Def: Množico A z operacijama $+$ in \cdot , ki ustreza aksiomom A1-A10, imenujemo **komutativen⁴ obseg** ali **polje**.

Primer: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ so polje.

V A vpeljemo urejenost z dvema aksiomoma:

A11: Za vsak $a \in A \setminus \{0\}$ velja, da je natanko eno od števil a , $-a$ pozitivno. Število 0 ni niti pozitivno niti negativno. (Število a je negativno, če je število $-a$ pozitivno).

A12: Za vsaka $a, b \in A$ velja: če sta a in b pozitivni števili, potem sta tudi $a + b$ in $a \cdot b$ pozitivni števili.

Def: Če ima obseg $(A, +, \cdot)$ urejenost, ki izpolnjuje A11 in A12, A imenujemo **urejen obseg** (urejeno polje).

Primer: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ z običajno urejenostjo je urejen obseg.

$\frac{m}{n}$ je pozitiven, če $m \cdot n > 0$

Def: Naj bo A urejen obseg. Za poljubna $a, b \in A$ definiramo:

Pišemo $a > b$ natanko tedaj, kadar je $a - b$ pozitivno število.

V tem primeru pišemo tudi $b < a$

V posebnem primeru pišemo $a > 0$, kadar je a pozitivno število.

Def: Naj bo A urejen obseg. Za poljubna $a, b \in A$

$a \leq b$ natanko takrat, kadar $a < b$ ali $a = b$

Trditev: V urejenem obsegu A velja:

(1) Za poljubni števili $a, b \in A$ velja natanko ena od možnosti:

$$a < b, a = b, a > b$$

Sledi iz A11 uporabljen za $a - b$.

⁴komutativnost se nanaša na komutativnost množenja

- (2) Za poljubne $a, b, c \in A$ velja:
če je $a > b \wedge b > c$, potem $a > c$ (tranzitivnost)
- (3) Za poljubne $a, b, c \in A$ velja:
če je $a > b$, potem $a + c > b + c$
- (4) Za poljubne $a, b, c, \in A, c > 0$:
če je $a > b$, potem je $ac > bc$
- (5) Za poljubne $a, b, c, d, \in A$:
če je $a > b > 0$ in $c > d > 0$, potem je $ac > bd$

Dokaz:

- (2) $a > b \wedge b > c \Rightarrow a > c$

Po definiciji: $a - b > 0$ in $b - c > 0$

Zato po A12:

$$\begin{aligned}(a - b) + (b - c) &> 0 \\a + (-b) + b + (-c) &> 0 \\a + 0 + (-c) &> 0 \\a - c &> 0\end{aligned}$$

zato $a > c$

- (3) denimo, da je $a > b$

dokazujemo, da je $a + b > b + c$, tj: $(a + c) - (b + c) > 0$

$$\begin{aligned}(a + c) - (b + c) &= a + c + (-(b + c)) = \\&= a + c + (-b) + (-c) = \\&= (a + (-b)) + (c + (-c)) = \\&= a + (-b) = a - b\end{aligned}$$

Dokaz da $-(b + c) = (-b) + (-c)$:

$-(b + c)$ je nasprotni element od $b + c$, kar pomeni da je njuna vsota enaka 0. Če velja $-(b + c) = (-b) + (-c)$, mora biti tudi $b + c + (-b) + (-c) = 0$:

$$b + c + (-b) + (-c) \stackrel{A2, A1}{=} (b + (-b)) + (c + (-c)) \stackrel{A4}{=} 0 + 0 \stackrel{A3}{=} 0$$

Če $a > b$ je $a - b > 0$, zato je $(a + c) - (b + c) > 0$, kar pomni $a + c > b + c$.

(5) $a > b > 0$ in $c > d > 0$

Dokazujemo $ac > bd$:

$$a > b \stackrel{A4}{\Rightarrow} ac > bc \quad (c > 0)$$

$$c > d \stackrel{A4}{\Rightarrow} bc > bd \quad (b > 0)$$

Z upoštevanjem tranzitivnosti (2) dobimo: $ac > bd$ \square

Racionalna števila predstavimo na številski premici.

Racionalna števila so na številski premici **povsod gosta** tj: na vsakem nepraznem odprtem intervalu leži racionalno število.

Racionalna števila ne pokrijejo številske premice

Trditev: rešitev enačbe $x^2 = 2, x > 0$ ni racionalno število. ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$)

Dokaz: Dokazujemo da x ni ulomek.

Dokazujemo s protislovjem.

- privzamemo, da tisto kar dokazujemo ni res. (predpostavimo, da x je ulomek)
- sklepamo
- skepi nas privedejo v protislovje s predpostavko

$$x = \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{N}$$

Če je x ulomek, ga lahko zapišemo kot okrajšan ulomek, zato sta m in n tuji

si števili.

$$\begin{aligned}
 x^2 = 2 &\Rightarrow \left(\frac{m}{n}\right)^2 = 2 \\
 \frac{m^2}{n^2} &= 2 \\
 m^2 &= 2n^2 \\
 2|m^2 &\Rightarrow 2|m \\
 \exists l \in \mathbb{N} : m &= 2l \\
 4l^2 &= 2n^2 \\
 2l^2 &= n^2 \\
 2|n^2 &\Rightarrow 2|n \\
 &\rightarrow \leftarrow
 \end{aligned}$$

Dokaz da $2|m^2 \Rightarrow 2|m$:

Če je m liho, potem $k \in \mathbb{N}_0$

$$\begin{aligned}
 m &= 2k + 1 \\
 m^2 &= 4k^2 + 4k + 1 \\
 m^2 &\text{ je lih}
 \end{aligned}$$

1.4 Dedekindov aksiom in Realna števila

Radi bi skonstruirali številsko množico, ki bo vsaj urejen obseg in, ki zapolni številsko premico.

Dedekindov pristop

Def: **Rez** je podmnožica $A \subset \mathbb{Q}$, za katero velja:

- (i) $A \neq \emptyset, A \neq \mathbb{Q}$
- (ii) Če je $p \in A$, potem za vsak $q \in \mathbb{Q}$ in $q < p$, velja $q \in A$
- (iii) za vsak $p \in A$ obstaja $q \in A, q > p$ (A nima največjega elementa)

Def: Množica realnih števil je množica vseh rezov, označimo jo s \mathbb{R}

Primer: 16 ustreza rez: $\{p \in \mathbb{Q}; p < 16\} = B$

Trditev: Preslikava $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ in je definirana s predpisom:

$$q \mapsto \{p \in \mathbb{Q}; p < q\} = p^*$$

vloži množico racionalnih števil v množico realnih števil.

Vpeljimo računski operaciji v \mathbb{R} .

Def: Naj bosta A in B reza. Vsota rezov A in B je

$$A + B = \{a + b, a \in A, b \in B\}$$

Opomba: Želimo si, da velja $(p + q)^* = p^* + q^*$

Trditev: Če sta A in B reza, potem je tudi $A + B$ rez.

Dokaz(trditev): Denimo da sta A in B reza.

Dokazujemo da je $A + B$ rez:

(i) $A + B \neq \emptyset$

Ker sta A in B reza, po lastnosti (i) obstaja $a \in A$ in $b \in B$. Potem je $a + b \in A + B$. Sledi $A + B \neq \emptyset$ \square

$$A + B \neq \mathbb{Q}$$

Obstaja $c \in \mathbb{Q}, c \notin A$ in obstaja $d \in \mathbb{Q}, d \notin B$.

$$c + d \notin A + B$$

Denimo, da je $c + d \in A + B$.

Potem velja, da je $c + d = a + b$ za $a \in A, b \in B$.

Iz (ii) sledi: $c > a$ in $d > b \Rightarrow a + b < c + d \rightarrow \leftarrow$

(ii) Denimo: $p \in A + B$, dokazujemo da za $q \in \mathbb{Q}, q < p$ velja $q \in A + B$

Obstajata $a \in A$ in $b \in B$, da $p = a + b$

$$q = a + q - a$$

Če je $q - a < b$, potem $q - a \in B$

$$q < a + b$$

$$q < p$$

\square

(iii) $A + B$ nima največjega elementa.

izberimo $p \in A + B$

iščemo $q \in A + B, q > p$

Obstajata $a \in A, b \in B$, da je $p = a + b$

Obstaja $a' \in A, a' > a$

$$q := a' + b \in A + B$$

$$q > p$$

□

Ni težko preveriti, da za $(\mathbb{R}, +)$ veljajo A1-A4.

Asociativnost in komutativnost se dokaže z operacijami na elementih reza.

0^* je enota za seštevanje.

Nasprotni rez od A :

$$-A = \{r \in \mathbb{Q}, \text{ obstaja } r' \in \mathbb{Q}, r' > r \text{ in } r' + p < 0 \text{ za vse } p \in A\}$$

(i) $-A \neq \emptyset$

$$\underline{-A \neq \mathbb{Q}}$$

$$q + a < 0 \text{ za vse } q \in \mathbb{Q}$$

$$q = -a$$

(ii) $q \in -A : r < q$

$$q + a < 0 \text{ za vse } a \in A$$

$$r + a < q + a \text{ za vse } a \in A \text{ po tranzitivnosti: } r + a < 0$$

(iii) Izberemo poljuben $r \in A$. Iščemo $q \in A, q > r$.

$$q := \frac{r + r'}{2} (r' > r, r' \in \mathbb{Q} : r' + p < 0 \text{ za vse } p \in \mathbb{Q})$$

$$q \in \mathbb{Q}, r' > q$$

Def: Pravimo da je A pozitiven, če je $0^* \in A, A \neq 0^*$. Denimo da sta A in B pozitivna reza:

$$A \cdot B = \{q \in \mathbb{Q}, \text{ obstajata } a \in A, a > 0 \text{ in } b \in B, b > 0, \text{ da je } q < ab\}$$

Želimo $(pq)^* = p^* \cdot q^*, p, q \in \mathbb{Q}$

Def: Naj bosta A in B poljubna reza.

$$A \cdot B = \begin{cases} A \cdot B & A > 0 \wedge B > 0 \\ -A \cdot (-B) & A > 0 \wedge B < 0 \\ -(-A) \cdot B & A < 0 \wedge B > 0 \\ (-A) \cdot (-B) & A < 0 \wedge B < 0 \end{cases}$$

Če je vsaj eden od rezov enak 0^* , potem $A \cdot B = 0^*$.

Ni težko preveriti, da množenje rezov izpolnjuje A5-A8 in A9, A10.

Enota za množenje je 1^* .

Urejenost izpolnjuje A11 in A12.

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ je **urejen obseg** in vsebuje \mathbb{Q} kot **urejen podobseg**.

Cilj: Obseg \mathbb{R} izpolnjuje še dodaten aksiom A13 (**Dedekindov aksiom**), ki pove, da \mathbb{R} zapolnjuje številsko premico.

Aksioma A13 obseg \mathbb{Q} ne izpolnjuje.

Def: Naj bo B urejen obseg in $A \subset B$. Pravimo, da je A navzgor omejena, če obstaja $M \in B$, da velja:

$$\forall a \in A : a \leq M$$

$\forall M$ s to lastnostjo pravimo zgornja meja množice A . Če je $A \subset \mathbb{Q}$ (ali \mathbb{R}) in je množica navzgor omejena, potem ima A neskončno zgornjih mej.

Def: Naj bo A navzgor omejena množica. Če obstaja najmanjša od vseh zgornjih mej množice A v B , jo imenuje natančna zgornja meja množice A .

Torej je $\alpha \in B$ natančna zgornja meja množice A , če velja:

(i) α je zgornja meja $\forall a \in A : a \leq \alpha$

(ii) Če $b \in B, b < \alpha$, potem b ni zgornja meja množice A , t.j.: $\exists a \in A : a > b$

Natančno zgornjo mejo množice A imenujemo tudi **supremum** množice A in jo označimo z $\sup A$.

Def: Če obstaja največji element množice A , ga imenujemo **maksimum** množice A in označimo z $\max A$.

Če ima A maksimum, potem velja:

$$\max A \in A \wedge \forall a \in A : a \leq \max A$$

Če ima A maksimum, potem $\max A = \sup A$. (Za a v (2) lastnosti definicije supremuma vzamemo $\max A$)

Dokaz:

- (1) $\max A$ je zgornja meja A (po definiciji maksimuma).
- (2) če $b < \max A$, potem b ni zgornja meja (ker je $\max A \in A$, b pa je manjši, velja da b ni zgornja meja od A , ker obstaja nek element is A , ki je večji od b).

Primeri:

$$1. A = \{x \in \mathbb{Q}, x < 0\} \subset \mathbb{Q}$$

4 je zgornja meja množice A , ker $x \in A, x < 0, 0 < 4 \Rightarrow x < 4$

$\Rightarrow A$ je navzgor omejena.

0 je natančna zgornja meja množice A

$$(a) x \in A, x < 0$$

(b) Izberemo poljuben $b \in \mathbb{Q}, b < 0$ in dokazujemo, da b ni zgornja meja.

$$b < \frac{b}{2} < 0; \frac{b}{2} \in A, \frac{b}{2} > b$$

Množica A nima maksimuma: $0 \notin A$.

$$2. C = \{x \in \mathbb{Q}, x^2 < 2\} \subset \mathbb{Q}$$

C je navzgor omejena z 2.

$$x \in C : x^2 < 2 \wedge 2 < 4 \Rightarrow x^2 < 4 \Rightarrow x < 2$$

(a) Vsako število $p \in \mathbb{Q}, p^2 > 2$ je zgornja meja množice C .

(b) Nobeno racionalno število $q \in \mathbb{Q}, q^2 < 2$ ni zgornja meja množice C .

Vemo: Rešitev enačbe $x^2 = 2, x > 0, x \notin \mathbb{Q}$.

Sledi: $C \subset \mathbb{Q}$ nima natančne zgornje meje.

Dokaz:

(a)

$$x^2 < 2 < p^2$$

sledi: $x^2 < p^2 \Rightarrow x < p$ za vse $x \in C$ \square

(b) Iščemo $c \in C$, da je $c > q, c^2 < 2$

$$c := \frac{2q+2}{q+2} = q + \frac{2q+2-q^2-2q}{q+2} = q + \frac{2-q^2}{q+2} > 0$$

($q^2 < 2$)

$$c^2 = \left(\frac{2q+2}{q+2}\right)^2 = \frac{4(q^2+2q+1)}{q^2+4q+4}$$

$$c^2 - 2 = \frac{4q^2+8q+4-2q^2-8q-8}{(q+2)^2} = \frac{2q^2-4}{(q+2)^2} = \frac{2(q^2-2)}{(q+2)^2} > 0$$

$$q^2 < 2$$

Podobno kot zgornjo mejo, navzgor omejeno množico, supremum in maksimum, definiramo spodnjo mejo, navzdol omejeno množico, infimum in minimum.

A13 (Dedekindov aksiom): Vsaka neprazna navzgor omejena podmnožica v množici A ima supremum (v množici A).

Def: Če množica $(A, +, \cdot, <)$ izpolnjuje aksiome A1-A13 jo imenujem *poln urejen obseg* (poln se nanaša na A13).

Trditev: $(\mathbb{Q}, +, \cdot, <)$ je urejen obseg, ki ne izpolnjuje A13.

Izrek: vsaka neprazna navzgor omejena podmnožica v \mathbb{R} ima natančno določeno zgornjo mejo. (\mathbb{R} izpolnjuje A13)

Posledica: $(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ je poln urejen obseg.

Posledica: Vsaka neprazna navzdol omejena podmnožica \mathbb{R} ima natančno spodnjo mejo.

A neprazna navzdol omejena.

$$-A = \{x; -x \in A\}$$

$-A$ je neprazna, navzgor omejena (če m spodnja meja od A , je $-m$ zgornja meja od $-A$). $\Rightarrow -A$ ima supremum in velja: $-\sup A = \inf A$

Dokaz (izrek): Izberemo poljubno neprazno navzgor omejeno podmnožico \mathcal{A} v \mathbb{R} .

$$C = \cup A, A \in \mathcal{A}$$

Dokazati je treba:

1. C je rez
2. $C = \sup \mathcal{A}$

1. (i) $C \neq \emptyset$

Ker \mathcal{A} ni prazna $\exists A \in \mathcal{A}$. Torej velja $A \subset C$, torej $C \neq \emptyset$.

$$C \neq \mathbb{Q}$$

Ker je \mathcal{A} omejena, obstaja zgornja meja M množice \mathcal{A} , velja:

$$\forall A \in \mathcal{A} : A \leq M$$

$$\forall A \in \mathcal{A} : A \subset M$$

Sledi: $C \subset M$, zato $C \neq \mathbb{Q}$ (ker $M \neq \mathbb{Q}/M$ je rez).

- (ii) $p \in C, q \in \mathbb{Q}, q < p \Rightarrow q \in C$

$p \in C \Rightarrow \exists A \in \mathcal{A}$, da je $p \in A$. Ker je A rez, za $q \in \mathbb{Q}, q < p$ velja $q \in A$.

Sledi: $q \in C$.

- (iii) $p \in C \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Q}, q > p : q \in C$ $p \in C \Rightarrow \exists A \in \mathcal{A}$, da je $p \in A$.

Ker je A rez, $\exists q \in A, q > p$.

Sledi: $q \in C$.

2. (i) C je zgornja meja \mathcal{A}

Ker je $A \subset C$ za vse $A \in \mathcal{A}$, velja $A \leq C$ za vse $A \in \mathcal{A}$. t.j.: C je zgornja meja.

- (ii) C je natančna zgornja meja \mathcal{A}

Izberimo poljuben $D < C$. Dokazujemo, da D ni zgornja meja \mathcal{A} .

Ker je $D < C, D \subset C$ in $D \neq C$, obstaja $p \in \mathbb{Q}, p \in C$ in $p \notin D$.

Ker je $p \in C$, obstaja $A \in \mathcal{A}$, da je $p \in A$.

Velja: $A > D$ in $A \in \mathcal{A}$ (vemo da sta vsaka reza primerljiva po velikosti.)

Sledi: D ni zgornja meja. \square

Za radovedne: Poleg Dedekinda je realna števila definiral tudi Cantor. Ta je to naredil s Cauchyjevimi zaporedji.

Opomba: Med obsegoma \mathbb{Q} in \mathbb{R} je še veliko obsegov.

Definicija: Pravimo, da je x iracionalno število, če $x \notin \mathbb{Q}$.

Rešitvam polinomskih enačb s celimi koeficienti rečemo *algebraična števila*.

Primer: $\sqrt{2} : x^2 - 2 = 0$

Niso vsa iracionalna števila algebraična: π, e . Tem pravimo *transcendentna števila*.

1.5 Posledice Dedekindovega aksioma

- Množica \mathbb{Z} ni navzgor omejena v \mathbb{R} .

Dokaz: Denimo, da je \mathbb{Z} navzgor omejena v \mathbb{R} . Potem obstaja $M \in \mathbb{R}$, da $M = \sup \mathbb{Z}$. Torej $M - 1$ ni zgornja meja \mathbb{Z} .

$$\begin{aligned} \exists a \in \mathbb{Z}, a > M - 1 \\ a + 1 > M, a + 1 \in \mathbb{Z} \rightarrow \leftarrow \end{aligned}$$

- $\forall a \in \mathbb{R} \exists b \in \mathbb{Z} : a < b$

Dokaz: če to ne bi bilo res, bi bilo število a zgornja meja \mathbb{Z} . To pa ni res (prejšnja posledica).

- *Arhimedska lastnost:* Naj bosta $a, b \in \mathbb{R}^+$. Potem obstaja $n \in \mathbb{N} : na > b$.

Dokaz: Obstajati mora $n \in \mathbb{N} : n > \frac{b}{a} \therefore$ Po prejšnji posledici tak n obstaja. \square

- Naj bo $a \in \mathbb{R}^+$. Potem obstaja $n \in \mathbb{N}$, da $\frac{1}{n} < a$.

Dokaz: uporabimo arhimedsko lastnost za $n = 1$.

- Naj bosta a, b poljubni \mathbb{R} , $a < b$. Obstaja $q \in \mathbb{Q}$, da velja $a < q < b$.

Dokaz: če je $b - a > 1$, potem obstaja $m \in \mathbb{Z}$, $a < m < b$

$\{n \in \mathbb{Z}, n \leq a\}$ je navzdol omejena neprazna.

$$\sup\{n \in \mathbb{Z}, n \leq a\} = x, x \in \mathbb{Z}$$

$$m := x + 1$$

$$b > m > 0$$

$$b - a > 0$$

$$\exists n \in \mathbb{N} : n(b - a) > 1$$

Obstaja $m \in \mathbb{Z} : an < m < nb$.

$$a < \frac{m}{n} < b \quad \square$$

Rečemo tudi: \mathbb{Q} so v \mathbb{R} *povsod gosta*.

1.6 Intervali

Def: Naj bosta $a, b \in \mathbb{R}, a < b$

1. $[a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$ *zaprti interval*
2. $(a, b) = \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$ *odprti interval*
3. $[a, b) = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\}$ *polodprti interval*
 $(a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}$
4. $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R}, x > a\}$
 $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R}, x \geq a\}$
 $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R}, x < a\}$
 $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R}, x \leq a\}$
 $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$

Def: Naj bo $a \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Interval $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ imenujemo ε -*okolica* števila a .

Okolica točke a je vsaka taka podmnožica v \mathbb{R} , ki vsebuje kakšno ε -okolico točke a .

1.7 Decimalni ulomki

Vsako \mathbb{R} število lahko zapišemo kot *decimalni ulomek*.

Naj bo $x \in \mathbb{R}^+$ in naj bo $n \in \mathbb{N}_0$ največje število, ki ne presega x :

$$n \leq x < n + 1$$

Interval $[n, n+1]$ razdelimo na 10 enakih delov. Nato poiščemo $n_1 \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, da velja:

$$n + \frac{n_1}{10} \leq x < n + \frac{n_1 + 1}{10}$$

Postopek nadaljujemo in na ta način sestavimo zaporedje decimalnih približkov za x .

$$\mathcal{A} = \{n, n + \frac{n_1}{10}, n + \frac{n_1}{10} + \frac{n_2}{100}, \dots\}$$

Trditev: $x = \sup \mathcal{A}$

Dokaz:

(i) x je zgornja meja množice \mathcal{A}

Velja po konstrukciji: $\forall a \in \mathcal{A} : a \leq x$.

(ii) x je najmanjša zgornja meja

Denimo da to ni res:

$$y := \sup \mathcal{A} < x$$

$$\exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} \leq x - y$$

$$\exists p \in \mathbb{N} : \frac{1}{10^p} < \frac{1}{n} < x - y$$

$$y + \frac{1}{10^p} < x$$

$$\begin{aligned} n + \frac{n_1}{10} + \frac{n_2}{100} + \dots + \frac{n_p}{10^p} &\leq y \\ n + \frac{n_1}{10} + \frac{n_2}{100} + \dots + \frac{n_p + 1}{10^p} &\leq y + \frac{1}{10^p} < x \end{aligned}$$

Trditev utemelji, da x lahko zapišemo, kot neskončni decimalni ulomek.

$$x = n_0 + \frac{n_1}{10} + \dots + \frac{n_p}{10^p} + \dots = n_0, n_1 n_2 \dots n_p \dots$$

Trditev: Naj bosta $x, y \in \mathbb{R}^+$

(1) Denimo, da obstaja $k \in \mathbb{N}_0$, za katerega velja:

$$\begin{aligned} x &= n_0, n_1 n_2 \dots n_{k-1} n_k 99 \dots \\ y &= n_0, n_1 n_2 \dots n_{k-1} (n_k + 1) 00 \dots \end{aligned}$$

in $n_k \neq 9$, potem $x = y$.

(2) Za dva različna decimalna zapisa $x \in \mathbb{R}^+$ velja (1).

Dokaz: Naj bo \mathcal{A} množica decimalnih preslikav za x .

(1)

$$\forall a \in \mathcal{A} : y \geq a \text{ (} y \text{ je zgornja meja)}$$

Zato $y \geq x$ (x je $\sup \mathcal{A}$)

Dokzujemo y je natančna zgornja meja od \mathcal{A}

Naj bo $l > k$ in a_l l -ti decimalni približek za x .

$$\begin{aligned} y - a_l &= \frac{1}{10^l} \\ y - \frac{1}{10^l} &= a_l \\ y - \frac{1}{10^l} &\leq a_l < a_{l+1} \end{aligned}$$

$\Rightarrow y - \frac{1}{10^l}$ ni zgornja meja za noben l , torej je y natančna zgornja meja.

(2) x naj ima dva decimalna zapisa:

$$\begin{aligned} x &= n_0, n_1 n_2 \dots \\ x &= m_0, m_1 m_2 \dots \end{aligned}$$

Obstaja najmanjši indeks $k \in \mathbb{N} : n_k \neq m_k$.

Predpostavimo, da je $m_k > n_k$

$m_0, m_1 m_2 \dots m_k$ je zgornja meja množice decimalnih približkov za x .

$$m_0, m_1 m_2 \dots m_k > m_0, m_1 m_2 \dots m_{k-1} n_k n_{k+1} n_{k+2} \dots$$

Če bi veljajo $n_k < m_k - 1$ (dokazujemo, da je razlika lahko največ 1, t.j. morajo se ponavljati 9-ke)

$$x \leq n_0, n_1 n_2 \dots n_{k-1} (n_k + 1) < m_0, m_1 \dots m_{k-1} m_k \leq x \rightarrow \leftarrow$$

($x < x$ ni možno)

Če bi bil $m_{k+1} \neq 0$ (ali za indeks $l > k$):

$$x \leq m_0, m_1 m_2 \dots m_k < m_0, m_1 \dots m_k m_{k+1} \leq x \rightarrow \leftarrow$$

Na podoben način dokažemo, da velja:

$$\forall l \in \mathbb{N} : n_{k+l} = 9$$

Podobno velja tudi za druge osnove. Primer v dvojiškem sistemu bi bil:

$$1101, 011 = 1101, 010\bar{1}$$

Trditev: Naj bo $x \in \mathbb{R}$. x ima periodičen decimalni zapis natanko tedaj, kadar $x \in \mathbb{Q}$ (tudi končen decimalni zapis je periodičen).

Dokaz: denimo, da je $x \in \mathbb{Q}^+$.

$$x = \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{N}$$

m delimo z n pisno. To pomeni da podpisujemo ostanke. Ker imamo na voljo n različnih ostankov: $o_j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, se bo med $n+1$ zaporednimi ostanki vsaj eden zagotovo ponovil. Ko se ostanek ponovi, se ponovi tudi cel zapis, kar je perioda.

Denimo, da ima x periodičen decimalni zapis:

$$\begin{aligned} x &= d, d_1 d_2 \dots d_n \overline{d_{n+1} d_{n+2} \dots d_{n+k}} \\ 10^k x &= d \cdot 10^k + d_1 d_2 \dots d_k, d_{k+1} \dots d_n \dots d_{n+k} \overline{d_{n+1} \dots d_{n+k}} \\ 10^k x - x &\text{ ima končen decimalni zapis } = p \in \mathbb{Q} \\ x &= \frac{p}{10^k - 1} \in \mathbb{Q} \quad \square \end{aligned}$$

1.8 Absolutna vrednost

Def: če je $x \in \mathbb{R}$, potem

$$|x| = \begin{cases} x & \text{če } x \geq 0 \\ -x & \text{če } x < 0 \end{cases}$$

Število $|x|$ imenujemo *absolutna vrednost realnega števila* x .

Trditev: Naj bo $x \in \mathbb{R}$. Veljajo:

- (i) $|x| \geq 0$
- (ii) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- (iii) $|x| = |-x|$
- (iv) $-|x| \leq x \leq |x|$
- (v) $|x|$ je razdalja x do 0 na številski premici
- (vi) *Trikotniška neenakost:* $|x + y| \leq |x| + |y|$ za vse $x, y \in \mathbb{R}$
- (vii) $|xy| = |x| \cdot |y|$ za vse $x, y \in \mathbb{R}$

Dokaz:

(vi) pregledamo vse možnosti glede na predznak

(1) $x \geq 0, y \geq 0$

$$|x + y| = x + y = |x| + |y|$$

(2) $x < 0, y < 0$

$$|x + y| = -(x + y) = -x - y = |x| + |y|$$

(3) $x \geq 0, y < 0$

$$|x| = x, |y| = -y$$

$$x + y = |x| - |y|$$

$$|x + y| = \begin{cases} |x| - |y| & \text{če } |x| \geq |y|, \\ |y| - |x| & \text{če } |x| < |y| \end{cases}$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

(4) simetrična (3)

Posledica:

- 1) $||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|$ za vse $x, y \in \mathbb{R}$
- 2) $|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|$ za vse $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

Dokaz:

- 1) Za $+$ je desna neenakost trikotniška neenakost.

Leva neenakost:

$$\begin{aligned} |x| &= |(x + y) - y| \leq |x + y| + |y| \\ |x| - |y| &\leq |x + y| \end{aligned}$$

Podobno velja: $|y| - |x| \leq |x + y|$

Iz tega sledi: $||x| - |y|| \leq |x + y|$ \square

1.9 Kompleksna števila

Motivacija za kompleksna števila je, da bi lahko rešili enačbo:

$$x^2 = -a, a \in \mathbb{R}^+$$

Definicija: Kompleksno število je urejeni par realnih števil: množica vseh kompleksnih števil je množica vseh urejenih parov realnih števil, t.j.: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ in jo označimo s \mathbb{C} .

$$\mathbb{C} = \{(a, b); a, b \in \mathbb{R}\}$$

Opomba (kdaj sta dve kompleksni števili enaki):

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}, \alpha = (a, b), \beta = (c, d) : \alpha = \beta \iff a = c \wedge b = d$$

V množico kompleksnih števil vpeljemo računski operaciji:

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}, \alpha = (a, b), \beta = (c, d) \text{ kjer } a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= (a + c, b + d) \\ \alpha \cdot \beta &= (ac - bd, ad + bc)\end{aligned}$$

Izrek: $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ je komutativen obseg. Enota za seštevanje je $(0, 0)$, enota za množenja pa $(1, 0)$. V \mathbb{C} se ne da vpeljati urejenosti, da bi bil urejen obseg. Drugače povedano: izraz kot npr. $z > 0$ je nesmislen.

Dokaz: (veljavnosti nekaterih aksiomov)

$$(A3) \quad \alpha + (0, 0) = (a, b) + (0, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b) = \alpha \quad \square$$

$$(A4) \quad \alpha = (a, b) \in \mathbb{C} \quad -\alpha = (-a, -b)$$

$$(a, b) + (-a, -b) = (a + (-a), b + (-b)) = (0, 0) = 0 \quad \square$$

$$(A7) \quad (a, b) \cdot (1, 0) = (1a - 0b, 0a + 1b) = (a, b) \quad \square$$

$$(A8) \quad \alpha \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0 \quad \alpha = (a, b)$$

$$\begin{aligned}\alpha^{-1} &= \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \\ \alpha \alpha^{-1} &= \left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}, \frac{-ab + ab}{a^2 + b^2} \right) = (1, 0) = 1 \quad \square\end{aligned}$$

Opomba: Kompleksni števili $(0, 0) \equiv 0$, $(1, 0) \equiv 1$ poimenujemo 0 in 1.

Opomba: Preslikava $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ definirana s predpisom $a \mapsto (a, 0)$ inducira vložitev realnih števil v kompleksnem in je usklajena z računskima operacijama.

$$\begin{aligned}(a, 0) + (b, 0) &= (a + b, 0) \\ (a, 0) \cdot (b, 0) &= (ab - 0 \cdot 0, 0a + 0b) = (ab, 0)\end{aligned}$$

Poleg te vložitve, bi si lahko zamislili tudi kakšno drugo, vendar ne bi bila dobra. Npr: $a \mapsto (a, 1)$ ni dobra vložitev, ker že pri seštevanju “pademo ven” iz realnih vrednosti $((a, 1) + (b, 1) + (a + b, 2))$.

Torej lahko kompleksna števila $(a, 0)$ *identificiramo* z realnimi: $(a, 0) = a$.

Definicija: Kompleksno število $(0, 1)$ označimo z i in ga imenujemo *imaginarna enota*.

$$\begin{aligned}i^2 &= (0, 1)(0, 1) = (0 - 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1 \\ (a, b) &= (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi\end{aligned}$$

Od tu naprej bomo kompleksna števila obravnavali kot

$$\mathbb{C} = \{a + bi, a, b \in \mathbb{R}\}$$

Definirani računski operaciji inducirata običajno računanje s kompleksnimi števili

Definicija: Naj bo $\alpha \in \mathbb{C}, \alpha = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$

- število a je realni del kompleksnega števila α in ga označimo: $a = \Re\alpha$
- število b je imaginarni del kompleksnega števila α in ga označimo: $b = \Im\alpha$. Opomba: $\Im\alpha \in \mathbb{R}$.
- številu $a - bi$ rečemo *konjugirano število* številu α in ga označimo z $\bar{\alpha}$
- šteilo $\sqrt{\alpha\bar{\alpha}}$ imenujemo *absolutna vrednost* kompleksnega števila α in označimo $|\alpha|$

Opomba: $\alpha = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$

$$\sqrt{\alpha\bar{\alpha}} = \sqrt{(a + bi)(a - bi)} = \sqrt{(a^2 - abi + abi + b^2)} = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R} \geq 0$$

$$\alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \sqrt{\alpha\bar{\alpha}} = \sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$$

To pojasni, zakaj lahko uporabljamo enako oznako za absolutno vrednost kompleksnega števila, kot za absolutno vrednost realnega števila.

Trditev: Za $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ velja:

$$(i) \quad \overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}$$

$$(ii) \quad \overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}$$

$$(iii)$$

$$\Re\alpha = \frac{1}{2}(\alpha + \bar{\alpha})$$

$$\Im\alpha = \frac{1}{2i}(\alpha - \bar{\alpha})$$

$$(iv) \quad \alpha\bar{\alpha} = (\Re\alpha)^2 + (\Im\alpha)^2$$

$$(v) \quad \bar{\bar{\alpha}} = \alpha$$

Dokaz:(ii) $\alpha = a + bi, \quad \beta = c + di, a, b, c, d \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\overline{\alpha\beta} &= \overline{(a + bi)(c + di)} = \overline{(ac - bd + (ad + bc)i)} = \\ &= ac - bd - (ad + bc)i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{\alpha} \cdot \overline{\beta} &= \overline{(a + bi)(c + di)} = (a - bi)(c - di) = \\ &= ac - bd - (ad + bc)i \quad \square\end{aligned}$$

1.9.1 Lastnosti

Za vse $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ velja:

- (i) $|\alpha| \geq 0$
- (ii) $|\alpha| = 0 \iff \alpha = 0$
- (iii) $|\alpha| = |\overline{\alpha}|$
- (iv) $|\alpha\beta| = |\alpha||\beta|$
- (v) $|\Re\alpha| \leq |\alpha|$
 $|\Im\alpha| \leq |\alpha|$
- (vi) $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$
 $||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha \pm \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$

Dokaz

$$(iv) \quad |\alpha\beta|^2 = (\alpha\beta)(\overline{\alpha\beta}) = \alpha\beta\overline{\alpha}\overline{\beta} = |\alpha|^2|\beta|^2$$

Ker je $|\alpha| \geq 0$, enakost sledi.

$$\begin{aligned}(vi) \quad |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta)(\overline{\alpha + \beta}) = (\alpha + \beta)(\overline{\alpha} + \overline{\beta}) = \\ &= \alpha\overline{\alpha} + \alpha\overline{\beta} + \beta\overline{\alpha} + \beta\overline{\beta} = \\ &= |\alpha|^2 + \alpha\overline{\beta} + \beta\overline{\alpha} + |\beta|^2\end{aligned}$$

$$(|\alpha| + |\beta|)^2 = |\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2$$

Dovolj je dokazati $\alpha\bar{\beta} + \beta\bar{\alpha} \leq 2|\alpha||\beta|$

$$\alpha\bar{\beta} + \beta\bar{\alpha} = \alpha\bar{\beta} + \overline{\overline{\alpha\bar{\beta}}} = \alpha\bar{\beta} + \overline{\alpha\beta} = 2\Re(\alpha\bar{\beta})$$

$$2\Re(\alpha\bar{\beta}) \leq 2|\alpha||\beta|$$

$$|\alpha\bar{\beta}| = |\alpha||\bar{\beta}| = |\alpha||\beta|$$

Neenakost velja zaradi (v).

1.9.2 Geometrijska interpretacija

Pri učenju geometrijske interpretacije toplo priporočam zvezek s skicami. Kot piše v datoteki README.md, skic v teh zapiskih ni in jih verjetno tudi ne bo. Če misliš, da imaš dovolj dobro domišljijo in se znajdeš samo iz tekstovnega opisa, potem pa kar pogumno, čeprav te pogum ne bo pripeljal do znanja.

Kompleksno število $\alpha \in \mathbb{C}, \alpha = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$ predstavimo s točko (a, b) v izbranem koordinatnem sistemu. Te točki nam lahko predstavljata tudi krajevna vektorja in ker kompleksna števila seštevamo po komponentah, se to ujema s seštevanjem vektorjev.

Tako kot nam absolutna vrednost realnega števila predstavlja oddaljenost števila od 0, nam tudi tu absolutna vrednost kompleksnega števila predstavlja oddaljenost števila od izhodišča koordinatnega sistema. Drugače povedano: predstavlja nam "dolžino" tega števila. To lahko vidimo tudi iz enačbe $|\alpha| = \sqrt{(\Re\alpha)^2 + (\Im\alpha)^2}$, ki nam pravzaprav predstavlja pitagorov izrek.

Če si narišemo dve števili α in β v koordinatni sistem in nato vanj vrišemo še njuno vsoto $\alpha + \beta$ po paralelogramskem pravilu za seštevanje vektorjev, opazimo, da dobimo trikotnik s stranicami α, β in $\alpha + \beta$. Za trikotnik pa vemo, da je vsota dolžin dveh stranic v trikotniku večja od dolžine tretje stranice. Iz tu izhaja ime trikotniška neenakost.

1.9.3 Polarni zapis

Lego točke v koordinatnem sistemu lahko podamo s poltrakom skozi izhodišče, na katerem leži točka in z razdaljo od izhodišča.

Poltrak je določen s kotom od pozitivnega poltraka abscisne osi do danega poltraka, meren v pozitivni smeri.

Kota φ in $\varphi + 2k\pi$ določata isti poltrak.

Če $\varphi \in [0, 2\pi]$, potem φ imenujemo *argument* kompleksnega števila.

Če zapišemo $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}x &= |z| \cos \varphi & |z| &= \sqrt{x^2 + y^2} \\y &= |z| \sin \varphi & \tan \varphi = \frac{y}{x} \Rightarrow \varphi &= \arctan \frac{y}{x} + k\pi, k \in \{0, 1\}\end{aligned}$$

$k = 1$ za kompleksna števila v II in III kvadrantu, sicer $k = 0$.

Polarni zapis: $z = x + iy = |z| \cos \varphi + i|z| \sin \varphi = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

$$|\cos \varphi + i \sin \varphi| = 1$$

$\cos \varphi + i \sin \varphi$ leži na *enotski krožnici* (krožnica s polmerom 1 in središčem v izhodišču).

Množenje v polarnem:

$$\begin{aligned}z &= |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \\w &= |w|(\cos \psi + i \sin \psi)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}zw &= |z||w|(\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \psi + i \sin \psi) = \\&= |z||w|(\cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi + i \sin \varphi \cos \psi + i \sin \psi \cos \varphi) = \\&= |z||w|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi))\end{aligned}$$

Pri množenju z kompleksnimi števili se absolutni vrednosti zmnožita, kota pa seštejeta

Konjugirana vrednost

$$\bar{z} = |z|(\cos \varphi - i \sin \varphi) = |z|(\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi))$$

Potenciranje

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$
$$z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Formuli pravimo *Moiivreova formula* (beremo "moavrova") in jo dokažemo z indukcijo.

Korenjenje

Korenjenje nam predstavlja reševanje enačbe $w^n = z$, kjer $z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}$. Rešitvam te enačbe pravimo n -ti koreni kompleksnega števila z .

Za reševanje najprej število z zapišemo v polarni obliki: $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. To storimo tudi s številom w : $w = r(\cos \psi + i \sin \psi)$.

To vstavimo v začetno enačbo:

$$r^n = (\cos n\psi + i \sin n\psi) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Kompleksni števili sta enaki, če sta enako oddaljena od izhodišča:

$$r^n = |z|$$

in ležita na istem poltraku. Ustrezna kota se razlikujeta kvečjemu za večkratnik 2π :

$$n\psi = \varphi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$
$$\psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}$$

To pomeni, da dobimo:

$$|w| = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right), k \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{2k\pi}{n} \in [0, 2\pi] \text{ za } k \in 0, 1, \dots, n.$$

Dokaz:

$$k \geq n \Rightarrow k = ln + o, l, o \in \mathbb{N}_0$$

$$\frac{2k\pi}{n} = \frac{2\pi ln}{n} + \frac{2\pi o}{n} = 2l\pi + \frac{2\pi o}{n}$$

To pomeni, da so različni n -ti koreni: w_0, w_1, \dots, w_{n-1} , če je $z \neq 0$.

Opomba: Oznake za koren ni, ker ni enolične rešitve.

Geometrijsko nam rešitve predstavljajo oglišča pravilnega n -kotnika, ki je včrtan krožnici s polmerom $\sqrt[n]{|z|}$.

Rešitvam enačbe $w^n = 1$ rečemo n -ti koreni enote in ležijo na enotski krožnici.

Osnovni izrek algebre: Vsak nekonstanten polinom s kompleksnimi koeficienti ima kompleksno ničlo.

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, a_j \in \mathbb{C}$$

2 O množicah in preslikavah

Definicija: Naj bosta A in B množici.

Preslikava f iz množice A v množico B je predpis, ki vsakemu elementu iz množice A priredi natanko en element iz množice B .

Pišemo $f : A \rightarrow B$

$$a \in A : a \mapsto f(a) \in B$$

A imenujemo *domena* ali *definijsko območje*, B pa imenujemo *kodomena*.

Zaloga vrednosti je množica $\{f(a); a \in A\} = Z_f$.

Definicija: Naj bosta A in B množici in $f : A \rightarrow B$ preslikava.

Pravimo, da je f *surjektivna*, če je $B = Z_f$.

Pravimo, da je f *injektivna*, če velja:

$$\forall x, y \in A : x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Ro lahko zapišemo tudi kot:

$$\forall x, y \in A : f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

Pravimo, da je f *bijektivna* (*povratno enolična*), kadar je surjektivna in injektivna.

Definicija: Naj bosta A in B množici, $f : A \rightarrow B$ bijektivna preslikava.

Inverzna preslikava $f^{-1} : B \rightarrow A$ vsakemu elementu $b \in B$ priredi tisti element $a \in A$, za katerega velja $f(a) = b$.

f^{-1} je dobro definirana

$\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$, ker je f surjektivna. Ta a je enolično določen, ker je f injektivna; $f(a_1) = f(a) \Rightarrow a_1 = a$.

Definicija: Naj bosta A in B množici.

Pravim, da sta množici *ekvipolentni* ali enako močni, kadar obstaja bijektivna preslikava $f : A \rightarrow B$.

Opomba: če je $f : A \rightarrow B$ bijektivna, potem je $f^{-1} : B \rightarrow A$ bijekcija.

Opomba: končni množici imata enako moč, kadar imata enako število elementov.

Definicija: Če ima množica A enako moč kot \mathbb{N} , pravimo, da je A *števno neskončna*.

Če je A števno neskončna, potem obstaja $\mathbb{N} \rightarrow A; n \mapsto f(n) = a_n$.

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} = \{a_n; n \in \mathbb{N}\}$$

pri čemer velja: $j \neq k : a_j \neq a_k$.

Trditev: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ so števno neskončna.

Dokaz za \mathbb{Z} : $\{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$

Pri \mathbb{Q} je dovolj, da dokažemo za nenegativna števila, nato sledi podobno kot za \mathbb{Z} . Za pozitivna števila naredimo tabelo 1.

	1	2	3	4	5
1	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{5}{1}$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{5}{2}$

Tabela 1: Dokaz da so \mathbb{Q} števno neskončna

Nato števila povežemo po diagonalah $(\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2})$ in izločimo števila ko so se že ponovila (npr: $\frac{2}{2} = \frac{1}{1}$).

Izrek: \mathbb{R} ni števno neskončna

Dokaz: Denimo da je. Potem $\{a_1, a_2, a_3, \dots\} = \mathbb{R}$.

a_j zapišemo kot decimalni ulomek:

$$a_1 = d'_1 d_{11} d_{12} d_{13} \dots$$

$$a_2 = d'_2 d_{21} d_{22} d_{23} \dots$$

$$a_3 = d'_3 d_{31} d_{32} d_{33} \dots$$

$$x := 0'x_1x_2x_3\dots \in \mathbb{R}$$

$$x_1 = 1, \text{ če je } d_{11} = 0, \text{ sicer } x_1 = 0x_2 = 1, \text{ če je } d_{22} = 0, \text{ sicer } x_2 = 0$$

Skonstruirali smo $x \notin \{a_1, a_2, a_3, \dots\} \rightarrow \leftarrow$.

3 Številska zaporedja

DEFINICIJA: Zaporedje realnih števil je preslikava $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Zapis je:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(n) \text{ označimo z } a_n$$

Preslikava f je podana z a_1, a_2, a_3, \dots

Zaporedje realnih števil podamo s *členi* a_1, a_2, a_3, \dots , kar krajše zapišemo $\{a_n\}_{n=1}^\infty$, $\{a_n\}$, $(a_n)_{n=1}^\infty$ ali pa kar zaporedje a_n .

OPOMBA: zaporedje $\{a_n\}$ ni množica $\{a_n; n \in \mathbb{N}\}$.

PRIMER:

1) $a_n = 1, n \in \mathbb{N}$ *konstantno zaporedje*

To zaporedje ustreza preslikavi $f(n) = 1, n \in \mathbb{N}$

- 2) $b_n = n, n \in \mathbb{N}$ Takemu zaporedju pravimo, da je podan s splošnim členom. Narišemo lahko njegov graf $\{(n, b_n); n \in \mathbb{N}\}$
- 3) $d_1 = 1, d_2 = 1, d_{n+2} = d_n + d_{n+1}, n \in \mathbb{N}$ je *rekurzivno podano*. Predstavlja Fibonaccijevo zaporedje.
- 4) *aritmetično aporedje*

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, n \in \mathbb{N}$$

$$a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, \dots$$

To lahko zapišemo tudi z rekurzivno zvezo:

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + d, n \in \mathbb{N} \\ a_1 = a_1 \end{cases}$$

- 5) *geometrijsko zaporedje*

$$a_n = a_1 q^{n-1}, n \in \mathbb{N}$$

$$a_1, a_1 q, a_1 q^2, \dots$$

Zapisano z rekurzivno zvezo:

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n q, n \in \mathbb{N} \\ a_1 = a_1 \end{cases}$$

DEFINICIJA:

- Zaporedje a_n je *navzgor omejeno* če je zaloga vrednosti preslikave $n \mapsto a_n$ navzgor omejena, t.j.:

$$\exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq M$$

- *Natančna zgornja meja* zaporedja a_n je natančna zgornja meja zaloge vrednosti preslikave $n \mapsto a_n$ in jo označimo s $\sup a_n$.
- Število M imenujemo *zgornja meja* zaporedja a_n .
- Analogno definiramo navzdol omejeno, natančno spodnjo mejo $\inf a_n$, \max in \min .

PRIMER:

$$a_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$$

navzgor omejeno z 1: $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} \leq 1$

navzdol omejeno z 0: $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} \geq 0$

$\sup \frac{1}{n} = 1$, ker je 1 zgornja meja in $a_1 = 1$.

$\inf \frac{1}{n} = 0$ je spodnja meja.

Izberemo $\varepsilon > 0$. Dokazujemo da ε ni spodnja meja. Po arhimedski lastnosti:

$$\exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$$\max \frac{1}{n} = 1$$

$\min \frac{1}{n}$ ne obstaja.

DEFINICIJA: Zaporedje a_n konvergira proti $a \in \mathbb{R}$, če:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$$

Število a imenujemo *limita zaporedja* in označimo z:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Če zaporedje a_n konvergira, je a_n *konvergentno zaporedje*. Sicer je *divergentno zaporedje*.

$$|a_n - a| < \varepsilon \iff a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

Zunaj ε -te okolice je kvečjemo končnomnogo čelnov.

Zapis $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ pomeni, da zaporedje konvergira in njegova limita je a . To ne velja, če zaporedje divergira, ali pa njegova konvergira in njegova limita ni a .

PRIMERI:

$$1) \ a_n = 1, n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

Izberemo poljuben $\varepsilon > 0 : |a_n - 1| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon$ za vse $n \in \mathbb{N}$.

$$2) \ b_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Po arhimedski lastnosti:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists m : \frac{1}{m} < \varepsilon$$

$$n \geq m : \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m}$$

$$-\varepsilon < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} < \varepsilon$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq m : \frac{1}{n} \in (-\varepsilon, \varepsilon)$$

$$3) \ c_n = (-1)^n \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$$

ker:

$$\left| (-1)^n \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

po prejšnjem primeru

$$4) \ d_n = (-1)^n$$

zaporedje divergira

Denimo, da je x limita tega zaporedja:

- če $x = -1 : \varepsilon = 1$, zunaj $(-1 - \varepsilon, -1 + \varepsilon) = (-2, 0)$ ležijo vsi sodi členi zaporedja, ki jih je neskončno, zato -1 ni limita.
- Analogno za $x = 1$.
- $x \neq 1 \wedge x \neq -1$

$$d = \min\{|x - 1|, |x + 1|\}$$

velja:

$$1 \notin (x - \frac{d}{2}, x + \frac{d}{2})$$

$$-1 \notin (x - \frac{d}{2}, x + \frac{d}{2})$$

Vsi členi zaporedja ležijo izven tega intervala, zato x ni limita. Sledi: d_n divergira.

TRDITEV: Konvergentno zaporedje ima eno samo limito.

DOKAZ: Denimo da sta a in b limiti zaporedja a_n .

Izberemo poljuben $\varepsilon > 0$:

$$\begin{aligned}\exists n_a \forall n : n > n_a &\Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon \\ \exists n_b \forall n : n > n_b &\Rightarrow |a_n - b| < \varepsilon\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|a - b| &= |(a - a_n) + (a_n - b)| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon \\ \forall \varepsilon > 0 : |a - b| < 2\varepsilon &\Rightarrow |a - b| = 0 \Rightarrow a = b\end{aligned}$$

TRDITEV: Konvergentno zaporedje je omejeno

DOKAZ: Denimo, da je a_n konvergentno zaporedje z limito a . Izberemo $\varepsilon = 1$ in po definiciji velja:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon = 1$$

Lahko konstruiramo množico členov, ki so izven ε -te okolice a . Tej množici dodamo tudi zgornjo mejo okolice $a + \varepsilon = a + 1$. Ker je izven okolice končnomnogo členov, ima ta množica maksimum:

$$\max \{a + 1, a_1, a_2, \dots, a_{n_0-1}\} = M$$

Za vsak n velja: $a_n \leq M$, ker če $n \leq n_0 - 1$, je a_n v zgornji množici, ki smo ji določili maksimum, če $n \geq n_0$ je a_n v okolici a , to pomeni $a_n < a + 1$, $a + 1$ je v zgornji množici, ki smo ji določili maksimum.

Analogno lahko naredimo za spodnjo mejo. □

Ni vsako omejeno zaporedje konvergentno. Primer: $a_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$.

DEFINICIJA: Naj bo a_n zaporedje. Število s je *stekališče zaporedja* a_n , če v vsaki okolici s leži neskončno členov zaporedja.

PRIMER: $a_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$

Vemo, da ni konvergentno. -1 in 1 sta stekališči a_n , ker vsi členi z lihimi indeksi ležijo na $(-1 - \varepsilon, -1 + \varepsilon)$ za $\varepsilon > 0$. Analogno za 1 in sode člene.

OPOMBI:

- 1) s je stekališče $\iff \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ je $|a_n - s| < \varepsilon$ izpolnjen za neskončno mnogo indeksov n .
- 2) Če je zaporedje a_n konvergentno z limito a , potem je a edino stekališče zaporedja a_n , ker na $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ ležijo vsi, razen končno mnogo členov.

PRIMERI:

- 1) Zaporedje s 3 stekališči: $a_n = n \bmod 3$.
- 2) Zaporedje z 2 stekališčama, ki ima same različne člene: $a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$
- 3) Zaporedje z neskončno stekališči:

$$1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Stekališča zaporedja so vsa naravna števila.

- 4) Ali ima zaporedje neštavno stekališč? Da.

Obstaja bijekcija $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$.

$$\mathbb{Q} = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

Stekališča zaporedja $a_n : x \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ na $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ leži neskončno mnogo \mathbb{Q} števil, torej neskončno mnogo členov zaporedja. Zato je x stekališče.

- 5) Divergentno zaporedje brez stekališč: $a_n = n$.

TRDITEV: Če vsaka okolica števila $s \in \mathbb{R}$ vsebuje člen zaporedja a_n , $a_n \neq s$, potem je s stekališče a_n .

DOKAZ: Izberemo poljuben $\varepsilon > 0$. Obstaja $n_1 \in \mathbb{N} : a_{n_1} \in (s - \varepsilon, s + \varepsilon)$, $a_{n_1} \neq s$. Definiramo razdaljo: $d_1 = |s - a_{n_1}|$. Obstaja $n_2 : a_{n_2} \in (s - d_1, s + d_1)$, $a_{n_2} \neq s$, $n_1 \neq n_2$. Postopek nadaljujemo \square .

IZREK: Vsako omejeno zaporedje ima stekališče.

DOKAZ: Ker je zaporedje a_n omejeno, ima spodnjo mejo m in zgornjo mejo M .

$$\mathcal{U} = \{u \in \mathbb{R}; a_n < u \text{ je izpolnjeno za končno mnogo členov zaporedja}\}$$

$$m \in \mathcal{U}, M + 1 \notin \mathcal{U}$$

$\Rightarrow \mathcal{U}$ je navzgor omejena in neprazna, torej obstaja $\sup \mathcal{U} = s$.

Izberemo $\varepsilon > 0$:

- $s + \varepsilon \notin \mathcal{U} : a_n < s + \varepsilon$ je izpolnjena za neskončno mnogo členov.
- $s - \varepsilon : \exists u \in (s - \varepsilon, s] \cap \mathcal{U}$. Ker $u \in \mathcal{U}$, $s - \varepsilon < u$, je $s - \varepsilon \in \mathcal{U}$, zato velja da $a_n < s - \varepsilon$ velja za končno mnogo členov zaporedja.

Sledi: na $[s - \varepsilon, s + \varepsilon)$ leži neskončno mnogo členov zaporedja. s je stekališče.

□

3.1 Monotona zaporedja

DEFINICIJA:

- Zaporedje a_n je *naraščajaoče*, če velja: $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} \geq a_n$.
- Zaporedje a_n je *padajaoče*, če velja: $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} \leq a_n$.
- Zaporedje a_n je *strogo naraščajaoče*, če velja: $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} > a_n$.
- Zaporedje a_n je *strogo padajaoče*, če velja: $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} < a_n$.
- Zaporedje a_n je *monotono*, če je zaporedje bodisi naraščajaoče, ali padajaoče.
- Zaporedje a_n je *strogo monotono*, če je zaporedje bodisi strogo naraščajaoče, ali strogo padajaoče.

PRIMER:

- 1) $a_n = -n$ (strogo) padajaoče
- 2) $a_n = 1$ naraščajaoče ali padajaoče
- 3) $a_n = \frac{1}{n}$ je padajaoče in navzdol omejeno
- 4) $a_n = (-1)^n$ ni ne padajaoče ne naraščajaoče

TRDITEV: Monotono zaporedje je konvergentno natanko tedaj, kadar je omejeno. Če je zaporedje a_n naraščajaoče in navzgor omejeno potem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup a_n$$

Če je zaporedje a_n padajoče in navzdol omejeno potem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf a_n$$

Dokaz za v eno stran že vemo.

DOKAZ: (v drugo stran ekvivalence)

Denimo, da je zaporedje a_n naraščajoče in navzgor omejeno. Ker je a_n navzgor omejeno: $\exists a := \sup a_n$.

Dokazujemo a_n konjugira proti a

Izberemo poljubne $\varepsilon > 0$. Ker $a - \varepsilon$ ni zgornja meja zaporedja: $\exists n_0 \in \mathbb{N} : a_{n_0} > a - \varepsilon$. Ker je zaporedje a_n naraščajoče in navzgor omejeno z a velja:

$$\begin{aligned} n \geq n_0 : a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq a \\ \forall n \geq n_0 a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \end{aligned}$$

Sledi: $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

□

Analogno za navzdol omejeno padajoče zaporedje.

PRIMER: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, n \in \mathbb{N}$

Najprej dokažemo, da je a_n padajoče zaporedje, t.j:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n+1}} &\leq \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \sqrt{n} &\leq \sqrt{n+1} \end{aligned}$$

Vemo, da je navzdol omejeno z 0. Ker je padajoče in navzdol omejeno, je konvergentno.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Vemo: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf a_n = a$

Vemo, da a ni negativen, ker so vsi členi zaporedja zaporedja pozitivni. Če bi $a > 0$:

$$\begin{aligned} a_n &\geq a \\ \frac{1}{\sqrt{n}} &\geq a \\ \frac{1}{n} &\geq a^2 > 0 \text{ za vse } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Zaradi arhimedske lastnosti vemo, da to ni res. $\rightarrow\leftarrow$

Torej a ni negativen in a ni pozitivne, torej $a = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

3.2 Podzaporedja

Podzaporedje zaporedja a_n je zaporedje, ki vsebuje samo nekatere člene zaporedja a_n v enakem vrstnem redu.

$$a_1, \cancel{a_2}, \cancel{a_3}, a_4, \dots$$

DEFINICIJA: Naj bo a_n zaporedje in naj bo n_j strogo naraščajoče zaporedje naravnih števil. Zaporedje $(a_{n_j})_{j=1}^{\infty}$ je podzaporedje $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

PRIMERI:

1) $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ zaporedje

podzaporedje $(a_n)_{n=1}^{\infty}$

2) $b_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$ ni konvergentno, ima dve stekališči

$b_{2n-1} = -1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$: b_1, b_3, b_5, \dots je podzaporedje lihih členov.

Podobno lahko naredimo podzaporedje sodih členov. Podzaporedja lihih in sodih členov sta konvergentna.

TRDITEV Naj bo a_n zaporedje. Če je a_n konvergentno, potem je konvergentno tudi vsako njegovo podzaporedje $(a_{n_j})_{j=1}^{\infty}$ in velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j}$$

DOKAZ: Naj bo $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

Izberemo poljuben $\varepsilon > 0$. Vemo: $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$

Potem velja:

$$j \geq n_0 : |a_{n_j} - a| < \varepsilon$$

ker je $n_j \geq n_{n_0} \geq n_0$

OPOMBA: Če neko podzaporedje danega zaporedja konvergira, ni nujno, da je dano zaporedje konvergentno. Primer: $(-1)^n$.

DEFINICIJA: *Rep zaporedja* je zaporedje, ki ga dobimo iz danega zaporedja tako, da izpustimo prvih končno mnogo členov.

Zaporedje je konvergentno natanko tedaj, kadar je konvergenten njegov rep.

PRIMER: $1, 2, 4, 16, 36, 16, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$

3.3 Računanje z zaporedji

TRDITEV: Naj bosta a_n in b_n konvergentni zaporedji. Tedaj konvergirajo tudi naslednja zaporedja:

- $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n, \dots$
- $a_1 - b_1, a_2 - b_2, \dots, a_n - b_n, \dots$
- $a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n, \dots$

in velja:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

DOKAZ

Vsota: Izberemo poljuben $\varepsilon > 0 : a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| \leq 2\varepsilon \text{ za } n \geq \max\{n_a, n_b\}$$

□

Produkt:

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| = |b_n(a_n - a) + a(b_n - b)| \leq |b_n(a_n - a)| + |a(b_n - b)|$$

Ker je b_n konvergentno, je omejeno: $\exists M_b \forall n \in \mathbb{N} : |b_n| < M_b$

$$\leq M_b |a_n - a| + |a| |b_n - b| \leq \varepsilon \text{ če } n \geq \max\{n_a, n_b\}$$

ker vemo: $|a_n - a| \leq \frac{\varepsilon}{2M_b}$ za $n \geq n_a$ in $|b_n - b| \leq \frac{\varepsilon}{2|a|}$ za $n \geq n_b$.

□

POSLEDICA: Če je a_n konvergentno zaporedje in $\lambda \in \mathbb{R}$, potem je zaporedje $\lambda a_1, \lambda a_2, \dots$ konvergentno in velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda a_n = \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Dokaz je enak kot dokaz za produkt limit, kjer $b_n = \lambda$.

Ker veljajo pravila za dva člena, veljajo tudi za končno mnogo.

TRDITEV: Naj bo a_n konvergentno zaporedje in $\forall n \in \mathbb{N} a_n \neq 0$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$. Potem je zaporedje

$$\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_n}, \dots$$

konvergentno in velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$$

DOKAZ: $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

$$\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{a - a_n}{a_n a} \right| = \frac{|a - a_n|}{|a| |a_n|} \leq \frac{|a - a_n|}{|a| \eta} < \varepsilon \text{ za dovolj velike } n$$

$|a_n|$ lahko omejimo stran od 0, t.j.: $\exists \eta > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \geq \eta$

Konstrukcija η : Zunaj $\left(a - \frac{|a|}{2}, a + \frac{|a|}{2} \right)$ leži končno mnogo členov zaporedja.

$$\eta := \min \left\{ \left| a - \frac{|a|}{2} \right|, \left| a + \frac{|a|}{2} \right|, |a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0}| \right\}$$

POSLEDICA: Naj bosta a_n in b_n konvergentni zaporedji, $\forall n \in \mathbb{N} : b_n \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$. Potem je zaporedje $\frac{a_n}{b_n}$ konvergentno in velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$$

IZREK O SENDVIČU: Naj bodo a_n, b_n, c_n taka zaporedja, da

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n \leq c_n$$

Če sta zaporedji a_n in c_n konvergentni in $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$, potem je b_n konvergentno in velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$$

PRIMER: $b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

$$\begin{aligned}\sqrt{n+1} - \sqrt{n} &= \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ 0 &\leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}\end{aligned}$$

ker $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

DOKAZ IZREKA:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$$

Vzamemo poljuben $\varepsilon > 0$:

$$\exists n_a : n \geq n_a \rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

$$\exists n_c : n \geq n_c \rightarrow |c_n - L| < \varepsilon$$

Če vzamemo $n \geq \max\{n_a, n_c\} : L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$.

Torej $b_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ za vse $n \geq \max\{n_a, n_c\}$. Zato b_n konvergira proti L .

TRDITEV: Naj bosta a_n in b_n konvergetni zaporedji. Če $a_n \leq b_n$ za vse $n \in \mathbb{N}$, potem velja $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. **Opomba:** Trditev s strogimi neenačaji v splošnem ne velja.

$$\begin{aligned}a_n &= 0, b_n = \frac{1}{n}, a_n < b_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n\end{aligned}$$

PRIMER: Obravnavaj konvergenco zaporedja (Newtnova formula):

$$\begin{aligned}x_1 &= 2 \\ x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}\end{aligned}$$

Zaporedje je s to rekurzivno zvezo dobro definirano, t.j.: $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \neq 0$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{2x_n^2 - x_n^2 + 2}{2x_n} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n} > 0$$

Če $x_n \neq 0$ potem $x_{n+1} \neq 0$. To lahko preverimo tudi z indukcijo.

Dokažemo lahko, da: x_n je padajoče

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

Če je $\frac{x_n^2 - 2}{2x_n} > 0$, potem je padajoče. Dovolj je dokazati, da je $x_n^2 - 2 \geq 0$, ker tedaj iz rekurzivne zveze sledi: $x_{n+1} \leq x_n$.

$$x_{n+1}^2 = \left(\frac{x_n^2 + 2}{2x_n} \right)^2 - 2 = \frac{x_n^4 + 4x_n^2 + 4 - 8x_n^2}{4x_n^2} = \frac{x_n^4 - 4x_n^2 + 4}{4x_n^2} = \frac{(x_n^2 - 2)^2}{4x_n^2} \geq 0$$

x_n je padajoče in navzdol omejeno, zato je konvergentno. Torej lahko izračunamo limito. Velja:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \frac{x_n^2 + 2}{2x_n} \\ 2x_n x_{n+1} &= x_n^2 + 2 \end{aligned}$$

in vemo:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n =: x$$

Ker je x_{n+1} rep zaporedja x_n , je konvergentno in ima isto limito kot x_n . Ker s konvergentnimi zaporedji lahko računamo:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (2x_n x_{n+1}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^2 + 2) \\ 2x^2 &= x^2 + 2 \\ x^2 &= 2 \\ x &= \pm\sqrt{2} \end{aligned}$$

vemo $x \geq 0$, torej

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$$

IZREK: Naj bo $I_n = [a_n, b_n]$, $a_n < b_n$ zaporedje vloženih zaprtih intervalov, t.j.:

$$\forall n \in \mathbb{N} : [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$$

Denimo, da zaporedje njihovih dolžin konvergira proti nič:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

Tedaj obstaja natanko eno število $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$

DOKAZ: a_n je naraščajoče zaporedje, b_n je padajoče zaporedje. Obe zaporedji sta omejeni (navzdol z a_1 in navzgor z b_1). Zato sta obe konvergentni. Zato $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n =: c \\ \forall n \in \mathbb{N} : c &\in I_n \\ c &= \sup a_n : a_n \leq c \\ c &= \inf b_n : c \leq b_n \\ c &\in [a_n, b_n] \end{aligned}$$

Dokaz, da je število c eno samo doma. □

IZREK: Naj bo a_n zaporedje. Število b je stekališče zaporedja a_n natanko tedaj, kadar obstaja podzaporedje zaporedja a_n , ki konvergira proti s .

DOKAZ:

(\Leftarrow) Denimo, da podzaporedje a_{n_j} konvergira proti s . Dokazujemo, da je s stekališče a_n .

Izberemo poljuben $\varepsilon > 0$. Obstaja j_0 , da za vsak $j \geq j_0$ velja:

$$a_{n_j} \in (s - \varepsilon, s + \varepsilon)$$

Torej je na $s - \varepsilon, s + \varepsilon$ neskončno členov zaporedja. Zato je s stekališče.

(\Rightarrow) Denimo, da je s stekališče zaporedja a_n . Za dokaz bomo skonstruirali tako zaporedje, da bo konvergiralo proti s . Naj bo

$$U_m = (s - \frac{1}{m}, s + \frac{1}{m})$$

Na U_1 obstaja neskončno mnogo členov zaporedja, zato lahko izberemo $a_{n_1} \in U_1$.

Na U_2 obstaja neskončno mnogo členov zaporedja, zato obstaja:

$$n_2 > n_1 \wedge a_{n_2} \in U_2$$

Ta postopek induktivno nadaljujemo. Recimo, da že imamo:

$$a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \text{ da } n_1 < n_2 < \dots < n_k \text{ in vsak } a_{n_j} \in U_j$$

Na intervalu U_{k+1} obstaja neskončno členov zaporedja, zato obstaja $n_{k+1} > n_k$ in $a_{n_{k+1}} \in U_{k+1}$

Podzaporedje a_{n_1} konvergira proti s po konstrukciji. □

3.4 Cauchyjev pogoj

Zanima nas opis konvergence brez sklicevanja na limito. a_n je konvergentno, če obstaja $a \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon \exists n_0 \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$$

DEFINICIJA: Zaporedje a_n izpolnjuje *Cauchyjev pogoj*, če velja:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \geq n_0 : |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Če zaporedje izpolnjuje Cauchyjev pogoj, pravimo, da je zaporedje *Cauchyjevo*.

IZREK: Zaporedje realnih števil a_n je konvergentno natanko tedaj, kadar je Cauchyjevo.

Opomba: Za zaporedje racionalnih števil ta izrek ne velja. Obstaja zaporedje $q_n, q_n \in \mathbb{Q}$, q_n je Cauchyjevo ni pa konvergentno v \mathbb{Q} . Npr. zaporedje racionalnih približkov za $\sqrt{2}$.

DOKAZ:

(\Rightarrow) Denimo, da zaporedje a_n konvergira proti a . Za poljuben $\varepsilon > 0$ po definiciji konvergence velja:

$$\exists n_0 \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$$

Za $n, m \geq n_0$ velja:

$$|a_n - a_m| = |a_n - a + a - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < 2\varepsilon$$

Torej je zaporedje Cauchyjevo.

(\Leftarrow) Denimo, da je a_n Cauchyjevo.

Potem je a_n omejeno

$$\exists n_0 : \forall n, m \geq n_0 : |a_n - a_m| < 1 = \varepsilon$$

Zato je $|a_n - a_{n_0}| < 1$ za vse $n \geq n_0$. (Namesto m vzamemo n_0 , saj vstreza pogoju)

Torej vsi členi razen a_1, a_2, \dots, a_{n_1} ležijo na $(a_{n_0} - 1, a_{n_0} + 1)$. Zato je a_n omejeno.

Vemo, da ima vsako omejeno zaporedje stekališče s . Trdimo $s = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

Izberemo poljuben $\varepsilon > 0$. Denimo, da je zunaj $(s - \varepsilon, s + \varepsilon)$ neskončno členov zaporedja. Potem bi zunaj $s - \varepsilon, s + \varepsilon$ obstajalo omejeno podzaporedje zaporedja a_n , zato ima to podzaporedje stekališče $t, t \neq s$. t je stekališče a_n .

Cauchyjevo stekališče nima nikoli dveh različnih stekališč.

Denimo, da sta s in t stekališči.

$$d = |s - t|$$

Na $(s - \frac{d}{3}, s + \frac{d}{3})$ leži neskončno členov zaporedja.

Na $(t - \frac{d}{3}, t + \frac{d}{3})$ leži neskončno členov zaporedja.

Če bi bilo zaporedje Cauchyjevo, $\exists n_0 \forall n, m \geq n_0 : |a_n - a_m| < \frac{d}{3}$.

Pridemo v protislovje s prejšnjima dvema izjavama. $\rightarrow \leftarrow$

□

IZREK: Vsako omejeno zaporedje, ki ima eno stekališče je konvergentno (v dokazu prejšnjega izreka (če si naredil domačo nalogo, tudi na dolgo)).

Opomba: Izrek (zelo očitno) ne velja za neomejena zaporedja.

DEFINICIJA: Naj bo a_n zaporedje. Pravimo, da zaporedje a_n *konvergira proti neskončno*, če velja:

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : a_n \geq M$$

V tem primeru pišemo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

Zaporedje, ki konvergira proti neskončno **ni** konvergentno. Z drugimi besedami: zaporedij, ki konvergirajo proti ∞ **ne** štejemo med konvergentna zaporedja.

Podobno definiramo tudi $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$:

$$\forall m \in \mathbb{R} \exists n_0 \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : a_n \leq m$$

PRIMER: a_n : $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

$b_n = n^{(-1)^n}$ ne konvergira proti neskončno.

Nekaj posebnih zaporedij:

TRDITEV: Naj bo $a \in \mathbb{R}$

- 1) $|a| < 1 \Rightarrow a^n$ konvergentno z limito 0
- 2) $a > 1 \Rightarrow a^n$ konvergira proti ∞

DOKAZ:

- 1) $a \in (0, 1)$ zaporedje a^n je padajoče: $a^{n+1} < a^n$ in navzdol omejeno z 0, zato je konvergentno.

Naj bo $b_n = a^n$ in $b_{n+1} = a^{n+1} = ab_n$. Vemo:

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Torej:

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (ab_n) = a \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = ab$$
$$b(1 - a) = 0$$

Ker $a \neq 1$ velja $b = 0$.

Če $a \in (-1, 0)$ velja:

$$-|a|^n \leq a^n \leq |a|^n$$

Za $|a|^n$ velja zgoren dokaz. Nato lahko uporabimo izrek o sendviču, zaradi katerega velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$$

- 2) $a > 1 : a^n$ je naraščajoče

Če bi bilo omejeno, bi bilo konvergentno. Po prejšnjem dokazu bi dobili $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, kar ni mogoče, ker je zaporedje naraščajoče in so vsi členi pozitivni. Torej a_n ni omejeno.

Zato $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \infty$

Ker je a_n neomejeno, za $M \in \mathbb{R}$ obstaja $n_0 : a^{n_0} \geq M$. Ker je naraščajoče velja:

$$\forall n \geq n_0 : a^n \geq M$$

TRDITEV: Za vsak $a > 0$ in vsak $m \in \mathbb{N}$ obstaja natanko en x_0 , ki reši enačbo $x^m = a$. To rešitev označimo z $\sqrt[m]{a}$. Veljajo osnovne lastnosti za $\sqrt[m]{}$:

$a, b > 0, m, n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}\sqrt[m]{ab} &= \sqrt[m]{a} \sqrt[m]{b} \\ \sqrt[n]{a^m} &= (\sqrt[n]{a})^m \\ \sqrt[nm]{a} &= \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} \\ \sqrt[np]{a^{nq}} &= \sqrt[p]{a^q} \\ \sqrt[p]{a^q} \sqrt[n]{a^m} &= \sqrt[pn]{a^{qn}} \sqrt[p]{a^{mp}} = \sqrt[p]{a^{qn+mp}}\end{aligned}$$

DEFINICIJA: Naj bo $a > 0, a \in \mathbb{R}, m, n \in \mathbb{N}$. Pišemo $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$

$$\begin{aligned}a^0 &= 1 \\ a^{-\frac{n}{m}} &= \frac{1}{a^{\frac{n}{m}}}\end{aligned}$$

Naj bo $q \in \mathbb{Q}$. Obstajata $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} : q = \frac{m}{n}$.

$$a^q = a^{\frac{m}{n}}$$

Opomba: Je dobro definirano, ker ni odvisno od izbire ulomka (ena izmed lastnosti nam dovoljuje "krajšanje")

TRDITEV: Naj bo $a \in \mathbb{R}, a > 0, p, q \in \mathbb{Q}$. Velja:

$$\begin{aligned}a^{pq} &= (a^p)^q \\ a^p a^q &= a^{p+q} \\ a^p b^p &= (ab)^p\end{aligned}$$

TRDITEV: Za $a \in \mathbb{R}, a > 0$ velja: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$

DOKAZ: $a > 1$:

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{a} &\geq \sqrt[n+1]{a} \\ a^{n+1} &\geq a^n\end{aligned}$$

Zaporedje je padajoče. Ker je navzdol omejeno z 0 (tudi z 1), je konvergetno in njegova limiti ≥ 1 .

Denimo, da je $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = L > 1$:

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{a} &\geq L > 1 \\ \forall n \in \mathbb{N} : a &\geq L^n\end{aligned}$$

Ker je $L > 1$, L^n konvergira proti ∞ , kar pomeni, da bo presegel a . Torej protislovje \longleftrightarrow .

Zato je $L = 1$.

Za $a < 1$ je podoben dokaz (DN). □

TRDITEV: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

DOKAZ:

$$\begin{aligned} n &= \left(\sqrt[n]{n}\right)^n = \left(\left(\sqrt[n]{n} - 1\right) + 1\right)^n = \\ &= 1 + \binom{n}{1} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right) + \binom{n}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 + \dots \geq \\ &\geq \binom{n}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 = \frac{n(n-1)}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \end{aligned}$$

Dobili smo:

$$0 \leq \frac{n(n-1)}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \leq n$$

torej velja:

$$0 \leq \frac{n-1}{2} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2 \leq 1$$

za $n \geq 2$.

Po izeku o sendviču velja: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{n} - 1) = 0$ □

IZREK: Zaporedje $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ je konvergentno. Njegovo limito označimo z:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

DOKAZ: a_n je naraščajoče

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \binom{n}{1} \frac{1}{n} + \binom{n}{2} \frac{1}{n^2} + \dots + \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} + \dots + \binom{n}{n} \frac{1}{n^n} \\ \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{nnnn\dots n} \end{aligned}$$

Ker je v števu in imenolacu tega ulomka enako števil, lahko naredimo rečemo:

$$\frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{nnnn\dots n} = \frac{1}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\dots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right)}_{k-1}$$

Torej velja:

$$a_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!}(\dots)$$

$$a_{n+1} = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!}(\dots) + \frac{1}{(n+1)!}(\dots)$$

Prva dva člena sta enaka, nato pa se začnejo razlikovati v oklepajih:

$$1 - \frac{1}{n} \leq 1 - \frac{1}{n+1}$$

Prav tako ima zaporedje a_{n+1} en člen več kot zaporedje a_n . Iz tega sledi:
 $a_n \leq a_{n+1}$

a_n je navzgor omejeno

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots \leq \\ &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = \\ &= 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} \leq 1 + \frac{1}{\frac{1}{2}} = 3 \end{aligned}$$

Sledi, da je a_n konvergentno.

3.5 Potence z realnimi eksponenti

$$a > 0, x \in \mathbb{R}, a^x \qquad r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x, r_n \in \mathbb{Q}$$

- Če r_n konvergira, potem a^{r_n} konvergira.
- Če $r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x, s_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x, r_n, s_n \in \mathbb{Q}$, potem velja: $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}$

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}, \text{ kjer } r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty}, r_n \in \mathbb{Q}$$

TRDITEV: Naj bo $a \in \mathbb{R}, a > 0$. Potem:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall h \in \mathbb{Q}, |h| < \delta : |a^h - 1| < \varepsilon$$

DOKAZ: $a > 0, \varepsilon > 0$,

Vemo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$. Če $\sqrt[n]{a}$ zapišemo kot $a^{\frac{1}{n}}$, potem po definiciji limite velja:

Za $\varepsilon > 0 \exists n_0 : |a^{\frac{1}{n}} - 1| < \varepsilon$ za vse $n \geq n_0$.

Naj bo $h \in \mathbb{Q}, 0 < h \leq \frac{1}{n}$. Za $a > 1$ velja:

$$0 < a^h - 1 < a^{\frac{1}{n}} - 1 < \varepsilon$$

in za $a < 1$ velja:

$$0 < 1 - a^h < 1 - a^{\frac{1}{n}} < \varepsilon$$

Spomnimo se: če $a < 1$ in $n, m \in \mathbb{Q}, n < m$ potem velja: $a^m < a^n$. V našem primeru to pomeni:

$$h < \frac{1}{n} : a^{\frac{1}{n}} < a^h$$

Zato pri $1 - a^{\frac{1}{n}}$ od 1 odštejemo več, kot pri $1 - a^h$, torej neenakost velja.

Sklep zgornjih dveh dokazov je:

$$\forall h \in \left(0, \frac{1}{n}\right) : |a^h - 1| < \varepsilon$$

Podobno lahko dokažemo za $h < 0$. □

TRDITEV: Naj bo $a > 0$ in naj bo r_n konvergentno zaporednje racionalnih števil z limito $r \in \mathbb{R}$. Potem velja naslednje:

- (1) Zaporedje $a^{r_1}, a^{r_2}, a^{r_3}, \dots$ konvergira.
- (2) Če je $r \in \mathbb{Q}$, potem je $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = a^r$.

DOKAZ:

- (1) za primer $a > 1$:

a^{r_n} je omejeno zaporedje za primer $a > 1$.

r_n je omejeno zaporedje, ker je konvergentno: obstaja $M \in \mathbb{Q}$, da velja:

$$\forall n \in \mathbb{N} : r_n \leq M$$

iz tega sledi:

$$\forall n \in \mathbb{N} : a^{r_n} \leq a^M$$

a^{r_n} je Cauchyjevo zaporedje (od tod sledi, da je konvergentno)

Naj bo $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} |a^{r_n} - a^{r_m}| &= \\ &= |a^{r_m}(a^{r_n-r_m} - 1)| = |a^{r_m}| \cdot |a^{r_n-r_m} - 1| \leq \\ &\leq a^M |a^{r_n-r_m} - 1| < \varepsilon \end{aligned}$$

Velja, ker po prejšnji trditvi obstaja $\delta > 0$, tako da velja:

$$|\underbrace{r_n - r_m}_h| < \delta \Rightarrow |a^{\overbrace{r_n - r_m}^h} - 1| < \frac{\varepsilon}{a^M}$$

Ker je r_n konvergentno, je Cauchyjevo, zato obstaja $n_0 \in \mathbb{N}$, tako da velja

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, m, n \geq n_0 : |r_n - r_m| < \delta$$

Podobno naredimo za $a < 1$.

(2) Če je $r \in \mathbb{Q}$:

$$|a^r - a^{r_n}| = |a^r(1 - a^{r_n-r})| = |a^r| |1 - a^{r_n-r}| < \varepsilon$$

za $\varepsilon > 0$. Torej mora veljati:

$$|1 - a^{r_n-r}| < \frac{\varepsilon}{a^r}$$

Po trditvi od prej:

$$\exists \delta > 0 \forall h \in \mathbb{Q}, |h| < \delta : |a^h - 1| < \frac{\varepsilon}{a^r}$$

Ker r_n konvergira proti r , obstaja $n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : |r_n - r| < \delta$

□

TRDITEV: Naj bo $a > 0$ in naj bosta r_n in s_n zaporedji racionalnih števil z isto limito

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

Potem velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}$$

DOKAZ: ideja dokaza je:

$$1 = a^0 = a^{\lim_{n \rightarrow \infty} r_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_n} = \frac{a^{\lim_{n \rightarrow \infty} r_n}}{a^{\lim_{n \rightarrow \infty} s_n}}$$

To še ni dokaz, ker ne vemo kaj je $a^{\lim_{n \rightarrow \infty} r_n}$, saj se lahko zgodi, da je limita zaporedja r_n iracionalno število, za kar še nismo definirali potenciranja.

Vemo: $a^{r_n - s_n} = \frac{a^{r_n}}{a^{s_n}}$ za vse $n \in \mathbb{N}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (r_n - s_n) = 0$, zato $1 = a^0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n - s_n}$. Ta neenakost velja zaradi prejšnje trditve. Ker je $\lim_{n \rightarrow \infty} (r_n - s_n)$ racionalno število, velja $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n - s_n} = a^{\lim_{n \rightarrow \infty} (r_n - s_n)} = a^0$

$$1 = a^0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n - s_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{r_n}}{a^{s_n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}}$$

Sklep:

$$1 = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}$$

To seveda velja, samo če $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} \neq 0$.

Ker je s_n konvergentno, je omejeno:

$$\exists M \in \mathbb{N} : |s_n| < M \Rightarrow a^{-M} \leq a^{s_n} \leq a^M$$

zato za $a > 1$ velja:

$$a^{-M} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} \leq a^M$$

za $0 < a < 1$ velja podobno:

$$a^M \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} \leq a^{-M}$$

torej je $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}$ pozitivno število.

□

DEFINICIJA: Naj bo $a > 0$ in $r \in \mathbb{R}$. Denimo, da zaporedje r_n racionalnih števil konvergira proti r . Potem definiramo:

$$a^r = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}$$

OPOMBE:

- 1) Definicija je dobra, ko za različni konvergentni zaporedji racionalnih števil z isto limito, zaporedji a^{r_n} in a^{s_n} konvergirati k istemu številu.

- 2) Če je $r \in \mathbb{Q}$, se nova definicija ujema z definicijo za racionalne potence.
- 3) Računska pravila za računanje z racionalnimi eksponenti se prenesejo na računanje z realnimi eksponenti.

TRDITEV: Naj bo $\alpha > 0$. Potem je $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$.

DOKAZ: za domačo nalogo. Če si priden si ga naredil, če si pridna se učiš iz svojih zapiskov, ker znate ženske brati za sabo (naredimo se fizike in zanemarimo, da zna Nik brati za sabo kljub temu, da ni ženskega spola⁵)).

TRDITEV: Naj bo $q \in \mathbb{Q}, q > 1$ in $\alpha \in \mathbb{R}$. Potem je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{q^n} = 0$$

DOKAZ:

$$a_n = \frac{n^\alpha}{q^n}$$

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^\alpha}{q^{n+1}} = \frac{(n+1)^\alpha}{q n^\alpha} \frac{n^\alpha}{q^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha \cdot \frac{1}{q} a_n$$

Vemo, da $\frac{1}{q} < 1$

Sledi:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha \frac{1}{q} < 1$$

Zato bo od nekod naprej $a_{n+1} < a_n$.

Ker je $\forall n \in \mathbb{N} : 0 a_n > 0$, je a_n konvergentno. Torej obstaja

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

in velja:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha \frac{1}{q} a_n \right) = \frac{1}{q} L$$

Torej lahko poračunamo L :

$$L = \frac{1}{q} L$$

$$L - \frac{1}{q} L = 0$$

$$L(1 - \frac{1}{q}) = 0$$

⁵lahko se sam odločiš ali zanemarimo njegov obstoj, ali pa samo njegov spol

Ker $1 - \frac{1}{q} \neq 1$, velja $L = 0$

□

3.6 Zgornja in spodnja limita

DEFINICIJA: Naj bo a_n omejeno zaporedje in \mathcal{S} množica njegovih stekališč. Natančno zgornjo mejo množice \mathcal{S} imenujemo *zgornja limita* ali *limes superior* in pišemo:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sup \mathcal{S}$$

Spodnja limita ali *limes inferior* je natančna spodnja meja od \mathcal{S} in pišemo

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \inf \mathcal{S}$$

OPOMBI:

- Ker je zaporedje a_n omejeno, $\mathcal{S} \neq \emptyset$.
- Množica \mathcal{S} je omejena, ker je zaporedje omejeno (z zgornjo in spodnjo mejo zaporedja).

DEFINICIJA:

(1) Če je zaporedje a_n navzgor neomejeno, potem definiramo:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

(2) Če je zaporedje a_n navzdol neomejeno, potem definiramo:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

(3) Denimo, da je a_n navzgor neomejeno in navzdol omejeno. Če je množica njegovih stekališč \mathcal{S} neprazna, potem definiramo:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \mathcal{S}$$

sicer:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

- (4) Denimo, da je a_n navzdol neomejeno in navzgor omejeno. Če je množica njegovih stekališč \mathcal{S} neprazna, potem definiramo:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \mathcal{S}$$

sicer:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

PRIMERI:

1) $a_n = (-1)^n$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$$

2) b_n konvergentno z limito b

$$b = \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n$$

3) $c_n = n^{(-1)^n} : 1, 2, \frac{1}{3}, 4, \frac{1}{5}, \dots$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$$

4) $d_n = 1, 2, 3, \dots$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} d_n = \infty$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} d_n = \infty$$

TRDITEV Naj bo a_n omejeno zaporedje in \mathcal{S} množica njegovih stekališč. Tedaj je

$$s = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \mathcal{S}$$

natanko tedaj, kadar za vsak $\varepsilon > 0$ velja:

$$a_n > s + \varepsilon \text{ kvečjemu za končno indeksov } n$$

$$a_n > s - \varepsilon \text{ za neskončno indeksov } n$$

POSLEDICA Naj bo a_n omejeno zaporedje. Potem je $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ največje stekališče a_n .

DOKAZ

(\Rightarrow) Naj bo $s = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \mathcal{S}$. Denimo, da bi za nek $\varepsilon > 0$

$$a_n > s + \varepsilon$$

veljalo za neskončno indeksov n . Sledi, da obstaja omejeno podzaporedje a_{n_j} , da je

$$\forall j a_{n_j} > s + \varepsilon$$

Ker je omejeno, ima stekališče $\geq s + \varepsilon \rightarrow \leftarrow$

(\Leftarrow) $\forall \varepsilon > 0$ na intervalu $(s - \varepsilon, s + \varepsilon]$ leži neskončno mnogo členov zaporedja, zato je stekališče. Dokazujemo $\underline{s = \sup \mathcal{S}}$

dovolj je dokazati, da a_n nima stekališča $x, x > s$

Denimo, da je $x > s$ stekališče a_n .

$$d = x - s$$

Na $\left(x - \frac{d}{2}, x + \frac{d}{2}\right)$ leži neskončno mnogo členov zaporedja. Torej $a_n > s + \frac{d}{2}$ izpolnjena za neskončno mnogo indeksov n . $\rightarrow \leftarrow$

□

TRDITEV: Naj bo a_n omejeno zaporedje. Tedaj velja:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_n (\sup_{k \geq n} a_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sup_{k \geq n} a_k) = b$$

SKICA DOKAZA:

$$b_n = \sup_{k \geq n} a_k = \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\} \geq b_{n+1} = \sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$$

b_n je padajoče in je omejen (ker je a_n omejeno). Torej je konvergentno. Njegova limita je njegova spodnja meja.

$\varepsilon > 0 : a_n > b + \varepsilon$ končno mnogo indeksov

$a_n > b - \varepsilon$ za neskončno indeksov

TRDITEV: Naj bosta a_n in b_n omejeni zaporedji. Če velja $a_n \leq b_n$ za $\forall n \in \mathbb{N}$ potem:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n$$

3.7 O zaporedjih kompleksnih števil

DEFINICIJA: Zaporedje kompleksnih števil je preslikava $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$. Pišemo:

$$z_n = f(n)$$

Teko kot pri realnih zaporedjih rečemo zaporedje z_n .

DEFINICIJA: Zaporedje kompleksnih števil z_n konvergira proti $z \in \mathbb{C}$, če:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_o \in \mathbb{N} \forall n \geq n_o : |z_n - z| < \varepsilon$$

Pišemo:

$$z = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$$

PRIMER: $z_n = \frac{1}{3n} + i \frac{2n-1}{n}$ zaporedje kompleksnih števil podano s splošnim "lenom.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 2i$$

TRDITEV: Zaporedje kompleksnih števil z_n konvergira proti $z \in \mathbb{C}$ natanko takrat, ko zaporedje $\Re z_n$ konvergira proti $\Re z$ in zaporedje $\Im z_n$ konvergira proti $\Im z$.

DOKAZ:

$$|z_n - z|^2 = (\Re z_n - \Re z)^2 + (\Im z_n - \Im z)^2 \quad (1)$$

(\Rightarrow) Denimo, da $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} z$

$$\varepsilon > 0 : \exists n_0 \forall n \geq n_0 : |z - z_n| < \varepsilon$$

Iz 1 sledi:

$$|\Re z_n - \Re z| \leq |z_n - z| \leq \varepsilon$$

$$|\Im z_n - \Im z| \leq |z_n - z| \leq \varepsilon$$

$$(\Leftarrow) \Re z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Re z \text{ in } \Im z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Im z$$

za $\varepsilon > 0$:

$$\exists n_{Re} : |\Re z_n - \Re z| < \varepsilon \text{ za } n \geq n_{Re}$$

$$\exists n_{Im} : |\Im z_n - \Im z| < \varepsilon \text{ za } n \geq n_{Im}$$

Iz 1 sledi:

$$|z - z_n|^2 \leq \varepsilon^2 + \varepsilon^2$$

$$|z - z_n| \leq \sqrt{2}\varepsilon$$

TRDITEV: Za konvergentni zaporedji kompleksnih števil z_n in w_n velja, da so zaporedja $z_n + w_n$, $z_n - w_n$ in $z_n w_n$ konvergentna in velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n + w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n + \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n - w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n - \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \cdot w_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$$

Če $w_n \neq 0$ za $\forall n \in \mathbb{N}$ in je $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n \neq 0$, potem $\frac{z_n}{w_n}$ konvergira.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} z_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} w_n}$$

Dokaže se tako, da s pomočjo prejšnje trditve pretvorimo na vsoto, razliko, zmnožek in kvocient realnih zaporedji.

IZREK: Zaporedje kompleksnih števil z_n je konvergentno natanko takrat, kadar izpolnjuje Cauchyjev pogoj.

Dokaz ponovno tako, da pretvorimo na realna zaporedja s pomočjo prejšnje trditve.

4 Številске vrste

DEFINICIJA: Naj bo a_n realno zaporedje. Neksončno formalno vrsto

$$a_1 + a_2 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

imenujemo *številsko vrsto*. Člen a_n imenujemo splošni člen številske vrste. Označimo:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

PRIMERI:

1) geometrijska vrsta

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

Osnovna lastnost: kvocijent zaporednih členov je konstanten

2)

$$1 - 1 + 1 - 1 \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

DEFINICIJA: Dana je številsko vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Zaporedje

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$s_n = \sum_{j=1}^n a_j$$

imenujemo *zaporedje delnih vsot*. Če zaporedje delnih vsot konvergira, pravimo, da vrsta konvergira. V tem primeru limito zaporedja delnih vsot s imenujemo *vsota vrste* in pišemo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

Če zaporedje delnih vsot divergira, rečemo, da vrsta divergira.

Opomba: Zapis $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$ pomeni:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira
2. njena vsota je s

PRIMERI:

1) Obrovnavaj konvergenco geometrijske vrste

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^n + \dots$$

$$s_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = a(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) = a \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Velja za $q \neq 1$. Oklepaj smo razrešili po formuli, ki smo jo našli v spominu:

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q}$$

Če $|q| < 1 \Rightarrow q^n \rightarrow 0$

Za $q > 1 : a \frac{1 - q^n}{1 - q} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ vrsta ne konvergira.

Za $q < -1 : a \frac{1 - q^n}{1 - q}$ ne konvergira

Za $q = -1 : a \frac{1 - (-1)^n}{2}$ ima dve stekališči, zato divergira.

Za $q = 1 : s_n = na$ divergira (ker konvergira proti $\pm\infty$).

Geiom vrsta $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ konvergira natanko takrat, kadar $|q| < 1$. V tem primeru velja:

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \frac{a}{1 - q}$$

2) Obravnavaj konvergenco $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira po definiciji natanko takrat, kadar zaporedje s_n konvergira.

$$s_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

Razceptimo na delne ulomke:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} = \frac{1}{k} + \frac{-1}{k+1}$$

Razpišemo s_n in dobimo:

$$s_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{1}{n} - \dots - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1}$$

Torej velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

Vrsta je konvergentna in $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

3) Obravnavaj konvergenco $\sum_{n=1}^{\infty} 1$

Vrsta divergira, ker $s_n = 1 + 1 + \dots + 1 = n$ divergira.

OPOMBA: Naj bo vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentna. Potem je zaporedje a_n konvergentno in $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

DOKAZ: Če je vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentna, je zaporedje delnih vsot s_n konvergentno.

$$\begin{aligned} s_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n \\ s_{n+1} &= a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} = s_n + a_{n+1} \end{aligned}$$

Torej:

$$a_{n+1} = s_{n+1} - s_n$$

$\Rightarrow a_{n+1}$ je konvergentno in velja:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 0$$

TRDITEV: (Cauchyjev pogoj za vrste) Vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira natanko tedaj, kadar velja:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \forall k \in \mathbb{N} : |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k}| < \varepsilon$$

DOKAZ: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira po definiciji natanko takrat, kadar zaporedje delnih vsot s_n konvergira. Po definiciji je zaporedje s_n Cauchyjevo:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \geq n_0, n, m \in \mathbb{N} : |s_n - s_m| < \varepsilon$$

Naj bo $m \geq n$:

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m| < \varepsilon$$

Lahko si izberemo $k = m - n$ in trditev velja.

TRDITEV: Dana je številska vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

(1) Če vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira, potem $\forall m \in \mathbb{N}$ konvergira vrsta $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$.

- (2) Če za nek $m \in \mathbb{N}$ vrsta $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ konvergira, potem konvergira vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

IDEJA DOKAZA:

$$\sum a_n \text{ konvergira} \Rightarrow s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \text{ konvergira.}$$

$$\sum_{n=m}^{\infty} a_n \rightsquigarrow t_n = a_m + a_{m+1} + \dots + a_{m+n}$$

$$s_{m+k} = \underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_{m-1}}_A + \underbrace{a_m + \dots + a_{m+k}}_{t_{k+1}}$$

$$s_{m+k} = A + t_{k+1}$$

Če konvergira eno zaporedje, konvergira tudi drugo zaporedje.

TRDITEV: Denimo, da sta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ in $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergentni vrsti, $c \in \mathbb{R}$. Potem konvergirajo tudi: $\sum_{n=1}^{\infty} (ca_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ in $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$ ter velja:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} ca_n &= c \sum_{n=1}^{\infty} a_n \\ \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \\ \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \end{aligned}$$

Opomba: Konvergentne vrste sestavljajo vektorski prostor (nad obsegom).

DOKAZ: Če $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira, konvergira tudi njeno zaporedje delnih vsot $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, zato konvergira $cs_n = ca_1 + ca_2 + \dots + ca_n$ in velja ustrezna zveza za limito.

PRIMER: Obravnavaj konvergenco vrsto $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (*harmonična vrsta*).

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergira.

$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ je neomejeno

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{\geq 2\frac{1}{4} = \frac{1}{2}} \geq \frac{3}{2} + \frac{1}{2}$$

$$s_8 = s_4 + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{\geq 4\frac{1}{8}} \geq \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

Opazimo vzorec:

$$s_{2^k} \geq \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(k-1)$$

To formulo lahko dokažemo z indukcijo. s_k je neomejeno in vrsta divergira.

4.1 Vrte z nenegativnimi členi

DEFINICIJA: Denimo, da je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta z nenegativnimi členi. Potem je zaporedje delnih vsot s_n naraščajoče ($s_{n+1} = s_n + \underbrace{a_{n+1}}_{\geq 0} \geq s_n$)

TRDITEV: Vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ z nenegativnimi členi konvergira natanko takrat, kadar je njeno zaporedje delnih vsot s_n navzgor omejeno.

IZREK: (primerjalni kriterij za konvergenco vrst): Naj bosta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ in $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ vrsti z nenegativnimi členi in naj velja:

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n$$

(1) Če vsota $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergira, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.

(2) Če vsota $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergira, potem $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergira.

Opomba: Pravimo, da je $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *majoranta* za $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

PRIMER: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ali konvergira?

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n^2+n} \geq \frac{1}{n^2+2n+1} = \frac{1}{(n+1)^2}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$ konvergira po primerjalnem kriteriju. Ker je to rep zaporedja $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergira.

DOKAZ trditve:

$$\begin{aligned}s_n &= a_1 + \dots + a_n \\ t_n &= b_1 + \dots + b_n\end{aligned}$$

Po predpostavki $s_n \leq t_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.

- (1) Če vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergira, zaporedje t_n konvergir, t.j.: t_n je navzgor omejeno:

$$\exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : t_n \leq M$$

Sledi: $s_n \leq M$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej s_n in s tem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.

- (2) Če $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergira, potem je zaporedje s_n navzgor neomejeno. Ker $s_n \leq t_n$ je tudi t_n navzgor neomejeno, zato $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergira.

PRIMER: Obravnavaj konvergenco $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ v odvisnosti od $p \in \mathbb{R}$.

$p = 1$ Vemo, da je harmonična vrsta in divergira.

$p \leq 1$ $\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$ odtod po primerjalnem kriteriju sledi, da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ divergira.

$p > 1$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergira

Podoben dokaz kot pri harmonični vrsti (samo druge ocene)

$$\begin{aligned}s_4 &= \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \underbrace{\frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p}}_{\leq 2 \frac{1}{2^p} = \frac{1}{2^{p-1}}} \leq 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^{p-1}} \\ s_8 &= s_4 + \underbrace{\frac{1}{5^p} + \frac{1}{6^p} + \frac{1}{7^p} + \frac{1}{8^p}}_{\leq 4 \frac{1}{4^p} = \frac{1}{4^{p-1}}} \leq 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^{p-1}} + \frac{1}{4^{p-1}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s_{2^k} &= 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^{p-1}} + \frac{1}{4^{p-1}} + \dots + \frac{1}{(2^{k-1})^{p-1}} \leq \\ &\leq \underbrace{1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^{p-1}} + \frac{1}{4^{p-1}} + \dots + \frac{1}{(2^{k-1})^{p-1}} + \dots}_{\text{zgornja meja}}\end{aligned}$$

Opazimo, da je od nekega člena naprej to geometrijska vrsta z $q = \frac{1}{2^{p-1}} < 1$, kar pomeni, da ima vsoto. Torej je s_{2^k} navzgor omejeno, ker je naraščajoče je tudi s_n navzgor omejeno in je zato s_n konvergentno.

IZREK: (*kvocientni kriterij ali d'Alembertov kriterij*) Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta s pozitivnimi členi. Sestavimo zaporedje:

$$d_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

- 1) Če obstaja $q \in (0, 1)$, da velja $d_n \leq q \forall n \in \mathbb{N}$, potem vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.
- 2) Če velja $d_n \geq 1 \forall n \in \mathbb{N}$, potem vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergira.

Če obstaja $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = d$, potem velja:

- 1') Če je $d < 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.
- 2') Če je $d > 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergira.

Opombi:

- Če je $d = 1$, kriterij ne da odgovora.
- Če je $\limsup_{n \rightarrow \infty} d_n < 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.

PRIMER:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

$$d_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}} = \frac{2^{n+1}n!}{(n+1)!2^n} = \frac{2}{n+1}$$

$$d = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

\Rightarrow vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ konvergira.

- Obravnavaj konvergenco vrste $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$, $x > 0$

$$d_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)x^{n+1}}{nx^n} = \frac{(n+1)x}{n}$$

$$d = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)x}{n} = x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = x$$

- Če $x < 1$ vrsta konvergira.
- Če $x > 1$ vrsta divergira.
- Če $x = 1$: $\sum_{n=1}^{\infty} n$ divergira (ker členi ne konvergirajo proti 0).

DOKAZ:

- 1) Denimo, da je $d_n \leq q < 1$ za vse $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q \forall n$$

$$a_{n+1} \leq qa_n \leq q \cdot qa_{n-1} \leq q^3 a_{n-2} \leq \dots \leq q^n a_1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} q^n a_1$$

Po primerjalnem kriteriju vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ konvergira $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.

- 2) $d_n \geq q \forall n \in \mathbb{N}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$a_{n+1} \geq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Zaporedje d_n je naraščajoče zaporedje pozitivnih števil. Zato členi a_n ne konvergirajo proti 0. Torej vrsta divergira.

Iz 1 sledi 1', iz 2 sledi 2'. Dokaz je bil za DN. Si naredil/a?

IZREK:(*korenski* kriter ali *Cauchyjev* kriterij) Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta z nenegativnimi členi. Sestavimo zaporedje

$$c_n = \sqrt[n]{a_n}$$

Tedaj velja:

- 1) Če obstaja $q \in (0, 1)$, da velja $c_n \leq q$ za vse $n \in \mathbb{N}$, potem vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.
- 2) Če velja $c_n \geq 1 \forall n$, potem vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergira.

Če obstaja $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c$, potem velja:

- 1') Če je $c < 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.
- 2') Če je $c > 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergira.

Opombi:

- Če je $c = 1$, kriterij ne da odgovora.
- Če je $\limsup_{n \rightarrow \infty} c_n < 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.

DOKAZ:

- 1) Naj bo $q \in (0, 1)$, $c_n \leq q \forall n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} c_n &\leq q \\ \sqrt[n]{c_n} &\leq q \\ a_n &\leq q^n \end{aligned}$$

Členi v vrsti $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ so majonirani s členi konvergentne geometrijske vrste q^n , zato $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira po primerjalnem kriteriju.

- 2) Naj bo $c_n \geq 1, \forall n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} c_n &\geq 1 \\ \sqrt[n]{a_n} &\geq 1 a_n && \geq 1^n \end{aligned}$$

Vrsta divergira, ker členi ne konvergirajo proti 0.

Tako kot pri prejšnjem primeru iz 1 sledi 1' in iz 2 sledi 2'. Ponovno je bil dokaz za DN.

PRIMER:

- Obravnavaj konvergenco vrste $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n}\right)^n, x > 0$

$$c_n = \sqrt[n]{\left(\frac{x}{n}\right)^n} = \frac{x}{n}$$

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Po korenskem kriteriju vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n}\right)^n$ konvergira za vse $x > 0$.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. Že od prej vemo, da konvergira, ampak si vseeno pogledjmo kvocientni in korenski kriterij.

– **Kvocienčni kriterij:**

$$d_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

– **Korenski kriterij:**

$$c_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{(\sqrt[n]{n})^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

IZREK: (*Raabejev* kriterij) Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ vrsta s pozitivnimi členi. Sestavimo zaporedje:

$$r_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$$

- 1) Če obstaja $r > 1$, da velja $r_n > r \quad \forall n \in \mathbb{N}$, potem vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.
- 2) Če velja $r_n \leq 1 \forall n$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergira.

Če obstaja $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = R$, potem velja:

- 1') Če je $R > 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.
- 2') Če je $R < 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergira.

Opombi:

- Če je $R = 1$ kriterij ne da odgovora.
- Če je $\limsup_{n \rightarrow \infty} r_n > 1$, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.

DOKAZ:

1) Naj bo $r_n \geq r > 1 \quad \forall n$

$$\begin{aligned} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &\geq r \\ \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 &\geq \frac{r}{n} \\ \frac{a_n}{a_{n+1}} &\geq \frac{r}{n} + 1 \end{aligned}$$

Trditve: Če je $s \in \mathbb{Q} \quad 1 < s < r$, potem velja $1 + \frac{r}{n} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^s$

Dokaz trditve: $s = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} 1 + \frac{r}{n} &> \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{p}{q}} \\ \left(1 + \frac{r}{n}\right)^q &> \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p \\ \left(1 + \frac{r}{n}\right)^q - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p &> 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^q - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p &= \\ = 1 + q\frac{r}{n} + \frac{1}{n^2}(\dots) - \left(1 + \frac{p}{n} + \frac{1}{n^2}(\dots)\right) &= \frac{1}{n}(qr - p) + \frac{1}{n^2}(\dots) = \\ = \underbrace{\frac{1}{n}}_{>0} \underbrace{((qr - p) + \frac{1}{n}(\dots))}_{>0} &> 0 \end{aligned}$$

$qr - p > 0$, ker $r > \frac{p}{q} \Rightarrow qr > p$. $\frac{1}{n}(\dots) > 0$ za dovolj velik n , ker je

limita tega člena 0.

$$\begin{aligned}
\frac{a_n}{a_{n+1}} &\geq 1 + \frac{r}{n} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^s = \left(\frac{n+1}{n}\right)^s \\
a_{n+1} &\leq a_n \left(\frac{n}{n+1}\right)^s \text{ za dovolj velik } n \\
a_{n_0+1} &\leq a_{n_0} \left(\frac{n_0}{n_0+1}\right)^s \\
a_{n_0+2} &\leq a_{n_0+1} \left(\frac{n_0+1}{n_0+2}\right)^s < a_{n_0} \left(\frac{n_0}{n_0+1}\right)^s \cdot \left(\frac{n_0}{n_0+1}\right)^s = a_{n_0} \frac{n_0^s}{(n_0+2)^s} \\
a_{n_0+3} &\leq a_{n_0+2}(\cdots) < a_{n_0} \frac{n_0^s}{(n_0+3)^s} \\
a_{n_0+k} &\leq a_{n_0} \frac{n_0^s}{(n_0+k)^s} \quad \forall k \in \mathbb{N} \\
\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_0} \frac{n_0^s}{(n_0+k)^s} &= a_{n_0} n_0^s \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(n_0+k)^s}
\end{aligned}$$

Ta vrsta konvergira, ker je $s > 1$ in je ostanek vrste $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$. Torej po primerjalnem kriteriju konvergira tudi vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

2) Naj bo $r_n \leq 1$ za vse $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &\leq 1 \\
\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 &\leq \frac{1}{n} \\
\frac{a_n}{a_{n+1}} &\leq 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} \\
a_{n+1} &\geq \frac{n}{n+1} a_n \\
a_{n+2} &\geq \frac{n+1}{n+2} a_{n+1} \geq \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{n}{n+1} a_n = \frac{n}{n+2} a_n \\
a_{n+k} &\geq \frac{n}{n+k} a_n \\
a_{k+1} &\geq \frac{1}{k+1} a_1 \\
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1} a_1 &= a_1 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1}
\end{aligned}$$

Je harmonična vrsta, ki divergira. Po primerjalnem kriteriju divergira tudi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

PRIMER: Obravnavaj konvergenco $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1)(x+2)\dots(x+n)}, x > 0$.

• **Kvocietni:**

$$d_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(x+1)\dots(x+n)(n+1)!}{(x+1)(x+2)\dots(x+n+1)n!} = \frac{n+1}{x+n+1}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 1$ in kriterij ne da odgovora

• **Raabejev:**

$$r_n = n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = n \left(\frac{x+n+1}{n+1} - 1 \right) = \frac{nx}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x$$

- Če je $x > 1$, potem vrsta konvergira.
- Če je $x < 1$, potem vrsta divergira.
- Če je $x = 1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2 \cdot 3 \cdot n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ divergira.

4.2 Absolutna konvergenca

DEFINICIJA: Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ številska vrsta. Pravimo, da vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *absolutno konvergira*, če konvergira vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Opomba: Za vrste z nenegativnimi členi, je absolutna konvergenca isto kot konvergenca.

IZREK: Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ številska vrsta. Če $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolutno konvergira, potem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira.

DOKAZ: Vemo: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira natanko takrat, ko $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ izpolnjuje Cauchyjev pogoj. Spomnimo se Cauchyjevega pogoja za vrste:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall k \in \mathbb{N} : |a_{n+1} + \dots + a_{n+k}| < \varepsilon$$

Naj vsota $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergira, zato izpolnjuje Cauchyjev pogoj. Dokažimo, da $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ izpolnjuje Cauchyjev pogoj.

Izberemo ε .

$$|a_{n+1} + \dots + a_{n+k}| \leq \underbrace{|a_{n+1}| + \dots + |a_{n+k}|}_{||a_{n+1}| + \dots + |a_{n+k}|| < \varepsilon} < \varepsilon$$

□

PRIMER: Ugotovi ali vrsta konvergira

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ konvergira. Vemo $|\sin n| \leq 1$:

$$\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ konvergira}$$

Po primerjalnem kriteriju $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ konvergira.

IZREK: (*Leibnizov kriterij* za alternirajoče vrste) Naj bo a_n padajoče zaporedje pozitivnih števil z limito 0. Tedaj vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ konvergira. Velja ocena:

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n - \sum_{n=0}^{m-1} (-1)^n a_n \right| \leq a_m$$

PRIMER: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ alternirajoča harmonična vrsta. $a_n = \frac{1}{n}$ ustreza pogoju, zato vrsta konvergira. Ne konvergira absolutno (ker harmonična vrsta divergira).

DEFINICIJA: naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ številska vrsta. Če je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentna, ni pa absolutna konvergentna, potem rečemo, da je *pogojno konvergentna*.

DOKAZ:

$$\begin{aligned} s_n &= a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^{n-1} a_{n-1} \\ s_{2n+1} &= \underbrace{(a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots)}_{s_{2n-1}} - \underbrace{a_{2n-1} + a_{2n}}_{>0} \leq s_{2n-1} \end{aligned}$$

$\Rightarrow s_{2n+1}$ je padajoče

$$s_{2n+2} = \underbrace{(a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots)}_{s_{2n}} + \underbrace{a_{2n} - a_{2n+1}}_{>0} \geq s_{2n}$$

$\Rightarrow s_{2n}$ je naraščajoča

$$\begin{aligned} s_{2n+1} &= (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{2n-2} - a_{2n-1}) + a_{2n} \geq 0 \\ s_{2n+2} &= a_0 + (-a_1 + a_2) + (-a_3 + a_4) + \cdots + (-a_{2n-1} + a_{2n}) - a_{2n+1} \leq a_0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow s_{2n+1}$ je navzdol omejeno

$\Rightarrow s_{2n+2}$ je navzgor omejeno

$\Rightarrow s_{2n+1}, s_{2n+2}$ sta konvergentni podzaporedji v s_n .

$$s_{2n+1} = s_{2n} + \underbrace{a_{2n}}_{\rightarrow 0}$$

Zato velja $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n}$. Zato je s_n konvergentno $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ konvergira.

$$|s_{m+k} - s_m| = |(-1)^m| |a_m + (-a_{m+1} + a_{m+2}) + (-\dots) + (-1)^{k-1} a_{m+k-1}| \leq a_m$$

$$k \rightarrow \infty : |s - s_m| \leq a_m \quad \square$$

4.3 O preureditvah vrst

Zamenjava vrstnega reda seštevanja.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

$\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijekcija

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)} = a_{\pi(1)} + a_{\pi(2)} + \dots + a_{\pi(n)} + \dots$$

IZREK: Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolutno konvergentna vrsta in $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijektivna preslikava. Potem je $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$ konvergentna in velja:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$$

DOKAZ:

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

Dokazujemo $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)} = s$

$$\left| s - \sum_{k=1}^m a_{\pi(k)} \right| = \left| s - s_n - \underbrace{\sum_{k=1}^m a_{\pi(k)}}_{\text{razen } \pi(k) \in \{1 \dots n\}} \right| \leq |s - s_n| + \sum_{k=1}^m |a_{\pi(k)}| \leq |s - s_n| + \sum_{k=m+1}^{\infty} |a_k| < \varepsilon$$

- $|s - s_n| < \frac{\varepsilon}{2}$, ker $\exists n_0 \forall n \geq n_0$ to velja.

- $\exists m_0 \forall n \geq m_0 : \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$
- $\exists m \in \mathbb{N} : \{\pi(1), \dots, \pi(m)\} \supset \{1, 2, \dots, n\}$

IZREK:(Reimann) Naj bo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ pogojno konvergenta. Potem $\forall A \in \mathbb{R}$ obstaja bijekcija $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, da je $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)} = A$. Obstaja še dve bijekciji $\pi_1, \pi_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m a_{\pi_1(n)} = \infty$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m a_{\pi_2(n)} = -\infty$$

DOKAZ: Predpostaviti smemo, da $a_n \neq 0 \forall n$.

$$s_n = a_1 + \dots + a_n = P_{k(n)} - Q_{m(n)}$$

Pri čemer so v $P_{k(n)}$ sešteti vsi pozitivni členi, med a_1 in a_n , v $Q_{m(n)}$ pa nasprotno vrednosti vseh negativnih členov med a_1 in a_n .

$$P_{k(n)} = p_1 + p_2 + \dots + p_{k(n)}$$

$$Q_{m(n)} = q_1 + q_2 + \dots + q_{m(n)}$$

Velja tudi $k(n) + m(n) = n$.

$$P_{k(n)} + Q_{m(n)} = |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$$

$\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ in $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ divergirata

- Če bi obe konvergirali, bi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergirala $\rightarrow \leftarrow$
- Če bi ena konvergirala, druga pa ne: iz $s_n = P_{k(n)} - Q_{m(n)}$ sledi, da če bi ena od vrst konvergirala bi tudi druga, ker s_n konvergira.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 0$$

Vemo: ker $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergira, je $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. p_n je podaporedje v $a_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$. Podobno velja za q_n . Torej

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 0$$

Sedaj lahko sestavimo, tako zaporedje, ki konvergira proti $A \in \mathbb{R}$. Obstaja najmanjši $k_1 \in \mathbb{N}$, da velja

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 + \cdots + p_{k_1} &> A \\ p_1 + p_2 + \cdots + p_{k_1-1} &\leq A \end{aligned}$$

Obstaja najmanjši $k_2 \in \mathbb{N}$, da velja:

$$\begin{aligned} p_1 + \cdots + p_{k_1} - q_1 - q_2 - \cdots - q_{k_2} &< A \\ p_1 + \cdots + p_{k_1} - q_1 - \cdots - q_{k_2-1} &\geq A \end{aligned}$$

Postopek nadaljujemo. Ker je $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = 0$, bo preurejena vrsta konvergentna z vsoto A . Dobili smo bijektivno preslikavo po konstrukciji.

Če želimo skonstruirati vrsto, ki konvergira proti neskončno $A = \infty$ naredimo sledeče

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 + \cdots + p_{k_1} &> 1 \\ p_1 + \cdots + p_{k_1} - q_1 + p_{k_1+1} + p_{k_1+2} + \cdots + p_{k_2} &> 2 \end{aligned}$$

□

4.4 Množenje vrst

Naj bosta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ in $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ številske vrste.

$$\begin{aligned} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) &= \\ &= a_1 b_1 + a_1 b_2 + \cdots + a_1 b_n + \\ &+ a_2 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_2 b_n + \cdots \end{aligned}$$

To lahko zapišemo v tabelo, podobno kot urejenost racionalnih števil. Vsota iz vseh produktov je vrsta oblike

$$\sum_{s=1}^{\infty} a_{i_s} b_{k_s}$$

kjer je $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ bijektivna preslikava s predpisom $s \mapsto (i_s, k_s)$. *Cauchyjev produkt*

$$c_n = a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1$$

je produkt kontra diagonal v tabeli. Vsota produktov je

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

IZREK: Naj bosta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ in $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ absolutno konvergentni številske vrsti. Potem je vrsta, ki je sestavljena iz vseh produktov konvergentna in njena vsota je

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right)$$

Natančneje, za vsako bijektivno preslikavo $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, je vrsta

$$\sum_{s=1}^{\infty} a_{\varphi_1(s)} b_{\varphi_2(s)}$$

konvergentna in velja:

$$\sum_{s=1}^{\infty} a_{\varphi_1(s)} b_{\varphi_2(s)} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right)$$

DOKAZ: dokazujemo absolutno konvergenco vrste iz vseh produktov. $\sum_{s=1}^{\infty} |a_{\varphi_1(s)} b_{\varphi_2(s)}|$ je konvergentna

Zaporedje delnih vsot:

$$|a_{\varphi_1(1)} b_{\varphi_2(1)}| + |a_{\varphi_1(2)} b_{\varphi_2(2)}| + \cdots + |a_{\varphi_1(m)} b_{\varphi_2(m)}|$$

Obstaja $n_0 = \max\{\varphi_1(1), \varphi_1(2), \dots, \varphi_1(m)\}$ in $k_0 = \max\{\varphi_2(1), \varphi_2(2), \dots, \varphi_2(m)\}$, tako da lahko zgornjo vsoto omejimo navzgor in dobimo

$$\begin{aligned} |a_{\varphi_1(1)} b_{\varphi_2(1)}| + |a_{\varphi_1(2)} b_{\varphi_2(2)}| + \cdots + |a_{\varphi_1(m)} b_{\varphi_2(m)}| &\leq \\ &\leq (|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_{n_0}|) (|b_1| + |b_2| + \cdots + |b_{k_0}|) \leq \\ &\leq \underbrace{\left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \right)}_{\text{število}} \end{aligned}$$

Ker $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolutno konvergira, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergira. Podobno velja za $|b_n|$.

Zaporedje delnih vsot $\sum_{s=1}^{\infty} |a_{\varphi_1(s)} b_{\varphi_2(s)}|$ je navzgor omejeno, zato je vrsta z nenegativnimi členi konvergentna.

Vosta vrste je neodvisna od izbire vrstnega reda členov, zato izberemo vrstni red „po kvadratih”.

$$s_{m^2} = \left(\sum_{n=1}^m a_n \right) \left(\sum_{n=1}^m b_n \right)$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} s_{m^2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right)$$

Vsako podzaporedje konvergentnega zaporedja konvergira proti limiti zaporedja, zato tudi s_m konvergira k temu številu.

□

PRIMER: $a_n = b_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ konvergira po Leibnizevem kriteriju, vendar ne konvergira absolutno. Izračunajmo produkt vrst s Cauchyjevo ureditvijo

$$c_n = a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \dots + a_{n-1} b_1 =$$

$$= (-1) \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} + (-1)^2 \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (-1)^{n-2} \frac{1}{\sqrt{n-1}} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot (-1) \frac{1}{\sqrt{2}} =$$

$$= (-1)^n \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n+1-k)}}$$

$$|c_n| = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{\underbrace{(k+1)}_{\leq n} \underbrace{(n+1-k)}_{\leq n}}} \geq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} \geq \frac{n-1}{n}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ divergira, ker členi ne gredo proti 0.

4.5 Dvakratne vrste

Imamo neskončno matriko $[a_{ij}]$

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \cdots & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \cdots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

Formalni vrsti

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right)$$

in

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \right)$$

imenujemo *dvakratni vrsti*, če $\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$ konvergira za vsak i , oziroma če $\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$ konvergira za vsak j .

Naj bo $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ bijektivna preslikava. Elemente $[a_{ij}]$ s φ uredimo v zaporedje in sestavimo številsko vrsto.

$$\sum_{s=1}^{\infty} a_{\varphi(s)} \tag{2}$$

VELJA:

- 1) Če 2 absolutno konvergira, potem dvakratni vrsti konvergirata in vse tri imajo enako vsoto.
- 2) Če dvakratna vrsta konvergira, ko njene člene nadomestimo z absolutnimi vrednostmi, potem 2 konvergira in vsote so enake.

5 Funkcije realne spremenljivke

DEFINICIJA: Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$. (*Realna*) *funkcija* (*realne spremenljivke*) je preslikava

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

Spomnimo se, da je preslikava predpis, za katerega velja

$$\forall x \in D \exists! y \in \mathbb{R} : y = f(x)$$

OPOMBI:

1. V pojmu funkcija sta združena dve predpostavki:
 - definicijsko območje
 - predpis

2. Funkciji f in g sta enki, če imata enako definicijsko območje in predpis.

DOGOVOR: Funkcijo lahko podamo samo s predpisom. V tem primeru vzamemo za definicijsko območje množico vseh x , za katero ima predpis smisel.

PRIMER:

1) $f(x) = \sqrt{x}$ $D_f = [0, \infty)$

2) Ali sta funkciji, ki sta dani s predpisoma

$$f(x) = \ln(x - 1) + \ln(x + 1)$$

$$g(x) = \ln(x^2 - 1)$$

enaki?

$$D_f = (1, \infty)$$

$$D_g = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

Nista enaki, vendar data enake vrednosti na preseku definicijskih območji.

$$\forall x \in D_f \cap D_g : f(x) = g(x)$$

DEFINICIJA: Naj bosta f in g funkciji. Če velja $D_f \subset D_g$ in če velja $f(x) = g(x)$ za vse $x \in D_f$, potem rečemo, da je funkcija g *razširitev* funkcije f in da je f *zožitev* funkcije g . Zožitev zapišemo kot

$$g|_{D_f} = f$$

DEFINICIJA: Naj bo f funkcija. Množico

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in D_f\} \subset \mathbb{R}^2$$

imenujemo *graf funkcije*.

OPOMBA:

1. Funkcija f je s svojim grafom natančno določena.

2. Katere podmnožice $S \subseteq \mathbb{R}^2$ so grafi funkcij? Presek vsake navpične premice z množico S je točka ali prazna množica.

5.1 Operacije s funkcijami

DEFINICIJA: Naj bosta $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ in $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ funkciji. Če je $Z_f \subset D_g$, potem lahko definiramo *kompozitum funkcij*

$$g \circ f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$$

s predpisom:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Ni nujno, da bi bila $g \circ f$ in $f \circ g$ v kakšni zvezi.

PRIMER:

1) $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \ln x^2$. $D_f = \mathbb{R}$, $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\ln x^2) = \ln^2 x^2 + 1 = 4 \ln^2 |x| + 1$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 1) = \ln(x^2 + 1)^2 = 2 \ln(x^2 + 1)$$

2) $f(x) = x^2$ ni injektivna

$$f|_{[0, \infty)} : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

je injektivna. Naredimo lahko inverzno funkcijo $f^{-1} : Z_f \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$

DEFINICIJA: Naj bo $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ injektivna funkcija z zalogo vrednosti Z_f . Inverzno preslikavo $f^{-1} : Z_f \rightarrow \mathbb{R}$ imenujemo *inverzna funkcija*. Njen predpis je znan že iz poglavja o preslikavah

$$f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b$$

PRIMER: Funkcija f je dana s predpisom:

$$f(x) = \frac{2x + 3}{3x - 1}$$

Določi inverzno funkcijo, če obstaja.

$$\begin{aligned} D_f &= \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\} \\ y &= \frac{2x + 3}{3x - 1} \\ y(3x - 1) &= 2x + 3 \\ 3xy - 2x &= 3 + y \\ x(3y - 2) &= 3 + y \\ x &= \frac{3 + y}{3y - 2} \end{aligned}$$

Iz računa sledi: če je $y \neq \frac{2}{3}$, potem obstaja natanko en x za katerega velja $f(x) = y$. Torej je $Z_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$, f je injektivna in $f^{-1}(y) = \frac{y+3}{3y-2}$.

$$\begin{aligned}\Gamma_f &= \{(x, f(x)) : x \in D_f\} = \{(f^{-1}(y), y) : y \in Z_f\} \\ \Gamma_{f^{-1}} &= \{(y, f^{-1}(y)) : y \in Z_f\}\end{aligned}$$

Zato je $\Gamma_{f^{-1}}$ dobljen iz Γ_f z zrcaljenjem preko simetrane lihih kvadrantov.

DEFINICIJA: Naj bo f funkcija.

- Pravimo, da je f navzgor omejena, če je Z_f navzgor omejena, t.j.:

$$\exists M \in \mathbb{R} \forall x \in D_f : f(x) \leq M$$

- Pravimo, da je f navzdol omejena, če je Z_f navzdol omejena, t.j.:

$$\exists m \in \mathbb{R} \forall x \in D_f : f(x) \geq m$$

- Funkcija f je omejena, kadar je navzgor in navzdol omejena.
- Če je f navzgor omejena, potem je supremum funkcije f natančna zgornja meja zaloge vrednosti

$$\sup f := \sup Z_f$$

- Če je f navzdol omejena, potem je infimum funkcije f natančna spodnja meja zaloge vrednosti

$$\inf f := \inf Z_f$$

- Če obstaja maksimum zaloge vrednosti, velja

$$\max f := \max Z_f$$

- Če obstaja minimum zaloge vrednosti, velja

$$\min f := \min Z_f$$

DEFINICIJA: Naj bo f funkcija. Pravimo, da je $x \in D_f$ ničla funkcije f , če

$$f(x) = 0$$

DEFINICIJA: Naj bosta $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ funkciji. Funkcije $f + g, f - g, f \cdot g : D \rightarrow \mathbb{R}$ definiramo s predpisi:

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ (f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\ (f \cdot g)(x) &= f(x) \cdot g(x)\end{aligned}$$

Če $\forall x \in D, g(x) \neq 0$, potem definiramo $\frac{f}{g} : D \rightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

DEFINICIJA: Naj bosta $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ funkciji. Funkciji $\max\{f, g\}, \min\{f, g\} : D \rightarrow \mathbb{R}$ definiramo s predpisoma:

$$\begin{aligned}\max\{f, g\}(x) &:= \max\{f(x), g(x)\} \\ \min\{f, g\}(x) &:= \min\{f(x), g(x)\}\end{aligned}$$

DEFINICIJA: Naj bo Γ množica in naj bo za vsak $\gamma \in \Gamma$

$$f_\gamma : D \rightarrow \mathbb{R}$$

funkcija. Če je $\{f_\gamma(x) : \gamma \in \Gamma\}$ navzgor omejena za vsak $x \in D$, potem lahko definiramo funkcijo

$$\sup_{\gamma \in \Gamma} f_\gamma : D \rightarrow \mathbb{R}$$

s predpisom

$$\left(\sup_{\gamma \in \Gamma} f_\gamma\right)(x) = \sup\{f_\gamma(x) : \gamma \in \Gamma\}$$

Podobno definiramo

$$\inf_{\gamma \in \Gamma} f_\gamma : D \rightarrow \mathbb{R}$$

PRIMER: $f_\gamma(x) = \frac{1}{1 + \gamma x^2}, \gamma \in (0, \infty), D_{f_\gamma} = \mathbb{R}$

$\left\{\frac{1}{1 + \gamma x^2} : \gamma \in (0, \infty)\right\}$ je navzgor omejena z 1 in navzdol omejena z 0

5.2 Zveznost

Zvezna funkcija je funkcija, kjer „majhna” sprememba neodvisne spremenljivke povzroči „majhno” spremembo odvisne spremenljivke.

PRIMERA

- $g(x) = \sin \frac{1}{x}$: V 0 ni definirana, zato ne moremo govoriti v zveznosti. Lahko določimo $g(0) = 0$, vendar ne glede na vrednost, ki jo določimo v 0, g ne bo zvezna.
- $h(x) = x \sin \frac{1}{x}$. Če določimo $h(0) = 0$, potem je h zvezna.

DEFINICIJA: Naj bo $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija in $a \in D$ točka. Funkcija f je *zvezna v točki* $a \in D$, če velja

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Opomba: δ je odvisna od ε . Najprej si izberemo ε , nato pa določimo δ .

PRIMERI:

- 1) $C \in \mathbb{R}$, $f(x) = C$ f je zvezna v $a \in \mathbb{R}$

Izberemo poljuben $\varepsilon > 0$. Vemo $f(a) = C$. Če si izberemo $\delta = 1$, velja:

$$|x - a| < 1 \Rightarrow |f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$$

- 2) $g(x) = x$ g je zvezna v $a \in \mathbb{R}$

Izberemo $\varepsilon > 0$. Dokazujemo

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Naj bo $\delta := \varepsilon$. Velja:

$$|f(x) - f(a)| = |x - a| < \varepsilon$$

ker $|x - a| < \delta$ in $\varepsilon = \delta$

- 3) $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$ f ni zvezna v 0

Negacija definicije je:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D : |x - a| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$$

Naj bo $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Izberemo poljuben $\delta > 0$. Naj bo $x_\delta = \frac{\delta}{2}$. x_δ je v okolici točke 0, ker

$$|0 - x_\delta| = |0 - \frac{\delta}{2}| = \frac{\delta}{2} < \delta$$

Funkcijske slike niso v ε -ti okolici točke $f(0)$, ker:

$$|f(0) - f(x_\delta)| = |0 - 1| = 1 \geq \varepsilon = \frac{1}{2}$$

DEFINICIJA: Naj bo $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, $D \subset \mathbb{R}$, $a \in D$. Množico $(a - \delta, a + \delta) \cap D$ imenujemo δ okolice točk a v D . Množica $U \subset \mathbb{R}$ je okolica točke a v D , če vsebuje kakšno δ -okolico točke a v D .

EKVIVALENTNI DEFINICIJA ZVEZNOSTI

- Naj bo $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija in $a \in D$. Potem je f zvezna v točki a natanko tedaj, kadar velja, da za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da f preslika δ -okolico točke a v ε -to okolico točke $f(a)$.
- Funkcija f je zvezna v točki a natanko tedaj, če za vsako okolico V točk $f(a)$, obstaja taka okolica U točke a , da velja $f(U) \subset V$.

5.2.1 Opis zveznosti z zaporedji

Naj bo $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna v $a \in D$. Izberemo poljubno konvergentno zaporedje $x_n \in D$ z limito a . Opazujemo $f(x_n)$. Trdimo $f(x_n)$ konvergira proti $f(a)$.

Izberemo $\varepsilon > 0$. Ker je f zvezna v a , obstaja $\delta > 0$, da za $x \in D$ velja, če $|x - a| < \delta$ sledi $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Ker x_n konvergira proti a , obstaja $n_0 \in \mathbb{N}$, da velja $|x_n - a| < \delta$ za vse $n \geq n_0$. Potem velja $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$ za vse $n \geq n_0$. \square

IZREK: Naj bo $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija in $a \in D$. f je zvezna v $a \in D$ natanko tedaj, kadar za **vsako** zaporedje $x_n \in D$, ki konvergira proti a , zaporedje $f(x_n)$ konvergira proti $f(a)$.

DOKAZ:

(\Rightarrow) Že dokazano.

(\Leftarrow) Denimo, da f ni zvezna v točki a . Potem velja:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D : |x - a| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$$

Torej za vsak n velja:

$$x_n \in D : |x_n - a| < \frac{1}{n} \wedge |f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon$$

kjer je $\frac{1}{n} = \delta$.

Zaporedje x_n konvergira proti a , ker $|x_n - a| < \frac{1}{n}$ za vsak n . Zaporedje $f(x_n)$ ne konvergira proti $f(a)$, ker $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon$ za vsak n .

□

PRIMERI:

$$1) f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ 1 & x \in \mathbb{Q} \end{cases} \quad \text{Dirichletova funkcija}$$

Ni zvezna v nobeni točki. Naj bo $a \in \mathbb{R}$. Velja

$$\exists q_n \in \mathbb{Q}, q_n \rightarrow a$$

$$\exists a_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, a_n \rightarrow a$$

Torej je $f(q_n) = 1$ za vsak n in $\lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = 1$. Vemo tudi, da $f(a_n) = 0$ za vsak n in $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$. Torej f ni zvezna v a .

2)

$$g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$$
$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} & x = \frac{m}{k} \text{ okrajšan ulomek} \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

g ni zvezna v \mathbb{Q} točkah.

IZREK: Naj bosta $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zvezni funkciji v točki $a \in D$. Potem so funkcije $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ zvezne v točki a . Če je $g(a) \neq 0$, potem je $\frac{f}{g}$ zvezna v točki a .

DOKAZ Vemo, da je f zvezna v $a \in D \iff$ za vsako zaporedje x_n v D , ki konvergira proti a , zaporedje $f(x_n)$ konvergira proti $f(a)$. Izberemo poljubno zaporedje $x_n \in D$, ki konvergira proti a . Dokazujemo $(f + g)(x_n)$ konvergira proti $(f + g)(a)$.

$(f + g)(x_n) = f(x_n) + g(x_n)$ ker sta f in g zvezni, $f(x_n)$ konvergira proti $f(a)$ in $g(x_n)$ konvergira proti $g(a)$. Torej $f(x_n) + g(x_n)$ konvergira proti $f(a) + g(a) = (f + g)(a)$.

Če $g(a) \neq 0$, potem je $\frac{f}{g}$ definirana na okolici točke $a \in D$. Obstaja $\delta > 0$, da za

$$x \in (a - \delta, a + \delta) \cap D$$

velja $g(x) \neq 0$. Torej lahko izberemo poljubno zaporedje $x_n \in (a - \delta, a + \delta) \cap D$, ki konvergira proti a . Tedaj je zaporedje $\left(\frac{f}{g}\right)(x_n)$ dobro definirano in konvergira proti $\left(\frac{f}{g}\right)(a)$ (podoben sklep kot prej).

IZREK: Naj bosta f in g funkciji, za kateri velja $Z_f \subseteq D_g$. Če je f zvezna v a in g zvezna v $f(a)$, potem je $g \circ f$ zvezna v a .

DOKAZ: Izberemo poljubno konvergentno zaporedje $x_n \in D_f$ z limito a . Ker je f zvezna v a , zaporedje $f(x_n)$ konvergira proti $f(a)$. Ker je g zvezna v $f(a)$, zaporedje $g(f(x_n))$ konvergira proti $g(f(a))$.

DEFINICIJA: Naj bo $f : D \rightarrow R$ funkcija. Pravimo, da je f *zvezna funkcija*, če je zvezna v vsaki točki $a \in D$.

PRIMERI:

- 1) Konstante so zvezne funkcije. Polinome in racionalne funkcije lahko dobimo z deljenjem in množenjem linearnih funkcij. Posledica je, da so polinomi in racionalne funkcije zvezne.

DEFINICIJA: Naj bo $f : D \rightarrow R$ funkcija. Pravimo, da je f *enakomerno zvezna* na D , če velja:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in D : |x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

Opomba: Če je f enakomerno zvezna na D , potem je f zvezna na D . f je zvezna na D (f je zvezna na vsaki točki $a \in D$):

$$\forall a \in D \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

$f(x) = \frac{1}{x}$ ni enakomerna zvezna na $(0, \infty)$

Naj bo $0 < a < \frac{1}{2}$. Velja:

$$|f(a) - f(2a)| = \left| \frac{1}{a} - \frac{1}{2a} \right| = \frac{1}{2a}$$

Za $\varepsilon = 1$ izveremo poljuben $\delta > 0$. Obstaja a , da velja: $\frac{1}{2a} > 1$ in $2a \in (0, \delta)$.

$$|a - 2a| = a < \delta \wedge |f(a) - f(2a)| \geq 1$$

Lema o pokritjih: Dan je nek zaprt interval $[a, b]$ in za vsak $x \in [a, b]$ imamo $\delta(x) > 0$. Označimo $O_x = (x - \delta(x), x + \delta(x))$ okolica točke x . Tedaj v družini okolic $\{O_x; x \in [a, b]\}$ obstaja končno število okolic, ki pokrijejo $[a, b]$, t.j. obstaja $n \in \mathbb{N}$ in obstaja $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, da velja $[a, b] \subset \bigcup_{j=1}^n O_{x_j}$

DOKAZ: O_a pokrije vsak interval $[a, c]$, kjer je $c < a + \delta(a)$.

$S = \{c \in [a, b], \text{interval } [a, c] \text{ je mogoče pokriti s končno mnogo okolicami iz družine } O_x\}$

Vemo $S \neq \emptyset$ in $S \subset [a, b]$. Torej je S neprazna navzgor omejena množica in ima $\sup S := M$.

Dokazujemo $M \in S$

Vemo $M \in [a, b]$. Ker je $M - \delta(M) < M$, obstaja $c > M - \delta(M), c \in S$. Velja

$$\begin{aligned} [a, c] &\subset O_{x_1} \cup O_{x_2} \cup \dots \cup O_{x_k} \\ [a, M] &\subset O_{x_1} \cup O_{x_2} \cup \dots \cup O_{x_k} \cup O_M \end{aligned}$$

$\Rightarrow M \in S$

Če $M \neq b$ potem zgornji interval pokrije $[a, M + \delta(M)) \cap [a, b]$, kar je več kot $[a, M]$. To je v protislovju s tem, da $M = \sup S$. $\rightarrow \leftarrow$

$\Rightarrow M = b$

POSLEDICA: Naj bo $K = [a, b]$. Iz vsakega pokritja K z odprtimi intervali je mogoče izbrati končno podpokritje. To pomeni: $\{I_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$ družina odprtih intervalov, za katero velja:

$$K \subset \bigcup_{\gamma \in \Gamma} I_\gamma$$

Obstaja $m \in \mathbb{N}$ in $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m \in \Gamma$, da velja:

$$K \subset \bigcup_{i=1}^m I_{\gamma_i}$$

DOKAZ POSLEDICE Za $x \in [a, b]$ velja $x \in \bigcup_{\gamma \in \Gamma} I_{\gamma}$.

Obstaja $\gamma \in \Gamma : x \in I_{\gamma}$.

Obstaja $\delta(x) > 0 : (x - \delta(x), x + \delta(x)) \subset I_{\gamma}$

Na ta način dobimo pokritje $[a, b]$ z O_x . Po lemi o pokritjih obstaja $m \in \mathbb{N}, x_1, \dots, x_m \in [a, b]$

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^m O_{x_i} \subset \bigcup_{i=1}^m I_{\gamma_i}$$

ker $O_{x_i} \subset I_{\gamma_i}$ za ustrežno izbrane γ . □

IZREK: Naj bo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Potem je f enakomerna zvezna na $[a, b]$

$c \in [a, b] : f$ je zvezna v točki c :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in [a, b] : |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$$

f je enakomerno zvezna na $[a, b]$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in [a, b] : |x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

DOKAZ: Ker je f zvezna na $[a, b]$ je za $x \in [a, b]$ f zvezna v x . Izberemo poljuben $\varepsilon > 0$. Obstaja $\delta(x) > 0$, za katerega velja

$$x' \in [a, b] : |x' - x| < 2\delta(x) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (3)$$

$$O_x = (x - \delta(x), x + \delta(x)) : \{O_x : x \in [a, b]\}$$

je odprto pokritje $[a, b]$ in po lemi o pokritjih obstaja končno podpokritje:

$$m \in \mathbb{N} : x_1, \dots, x_m \in [a, b]$$

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^m O_{x_i}$$

$$\delta := \min\{\delta(x_1), \dots, \delta(x_m)\}$$

Naj bosta $x, x' \in [a, b], |x - x'| < \delta$.

Obstaja $i \in 1, \dots, m : x \in (x_i - \delta(x_i), x_i + \delta(x_i))$:

$$|x' - x_i| = |x' - x + x - x_i| \leq |x' - x| + |x - x_i| < 2\delta(x_i)$$

Po (3) sledi:

$$|x - x_i| < \delta(x_i) < 2\delta(x_i) \Rightarrow |f(x) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|x' - x_i| < 2\delta(x_i) \Rightarrow |f(x') - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|f(x) - f(x')| = |f(x) - f(x_i) + f(x_i) - f(x')| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(x')| < \varepsilon$$

□

5.2.2 Lastnosti zveznih funkcij

IZREK: (*bisekcija*) Naj bo f zvezna funkcija na $[a, b]$. Če ima f v krajiščih intervala $[a, b]$ nasprotno predznačeni vrednosti, potem ima f na $[a, b]$ ničlo.

$$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow (\exists c \in [a, b] : f(c) = 0)$$

DOKAZ: $c_1 = \frac{a+b}{2}$. Če je $f(c_1) = 0$, potem končamo.

Sicer označimo z $[a_1, b_1]$ tistega od podintervalov $[a, c_1], [c_1, b]$, na katerem ima f v krajiščih nasprotno predznačeni vrednosti.

Nadaljujemo podobno $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}, \dots$. Če se postopek ni ustavil.

Na ta način konstruiramo zaporedje vloženih intervalov:

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$$

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b - a) \quad \text{in} \quad f(a_n)f(b_n) < 0$$

Po izreku obstaja natanko ena točka c , ki je vsebovana v vseh intervalih

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Ker je f zvezna, velja:

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$$

Ker velja $f(a_n)f(b_n) < 0$

$$(f(c))^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)f(b_n) \leq 0 \Rightarrow f(c) = 0$$

□

Opomba: Metoda bisekcije je metoda za numerično iskanje ničel

IZREK: Naj bo f zvezna funkcija na $[a, b]$. Potem je f omejena. Ozaničimo:

$$m = \inf_{[a,b]} f \quad \text{in} \quad M = \sup_{[a,b]} f$$

Obstajata $x_m, x_M \in [a, b]$, za kateri velja

$$f(x_m) = m \quad \text{in} \quad f(x_M) = M$$

Opomba: Zvezna funkcija na zaprtem intervalu doseže minimum in maksimum.

DOKAZ: Denimo, da f ni omejena. Recimo, da ni navzgor omejena. Torej velja:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] : f(x_n) > n$$

Zaporedje x_n je omejeno, zato ima stekališče s . Torej obstaja konvergentno podzaporedje $x_{n_k} \rightarrow s$. Ker je f zvezna, je $f(x_{n_k})$ konvergentna z limito $f(s)$. Pridemo do protislovja, ker mora biti $f(x_{n_k}) > n$ neomejeno. $\rightarrow \leftarrow$

Naj bo $M = \sup f$. Vemo $\forall x \in [a, b] : f(x) \leq M$. Recimo, da funkcija f ne zadodoseže vrednosti M .

$$M - f(x) > 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

$M - f$ je zvezna na $[a, b]$, zato $\frac{1}{M-f}$ zvezna na $[a, b]$ Po pravkar dokazanem je $\frac{1}{M-f}$ omejena. Torej

$$\exists A \in \mathbb{R}, A > 0 : \frac{1}{M-f} \leq A \quad \forall x \in [a, b]$$

$$\frac{1}{A} \leq M - f(x)$$

$$f(x) \leq M - \frac{1}{A} \quad \forall x \in [a, b]$$

Pridemo do protislovja, ker $M = \sup f \rightarrow \leftarrow$.

Torej obstaja $x_M \in [a, b] : f(x_M) = M$

□

POSLEDICA: Naj bo f zvezna funkcija na $[a, b]$. Označimo $m = \min f$, $M = \max f$. Potem funkcija f doseže vse vrednosti med m in M .

$$\forall c \in [m, M] \exists x_c \in [a, b] : f(x_c) = c$$

DOKAZ: Če je $m = M$ je f konstantna.

Če $m \neq M$: naj bo $c \in (m, M)$. Definiramo $g(x) = f(x) - c$. g je definirana na $[a, b]$ in je zvezna. Obstajata x_m in x_M : $f(x_m) = m, f(x_M) = M$. g zožimo med x_m in x_M . g ima na tem intervalu v krajiščih nasprotno predznačeni vrednosti: $m - c < 0$ in $M - c > 0$. Zato obstaja x_c : $g(x_c) = 0$. Velja: $f(x_c) = c$.

□

5.3 Monotone zvezne funkcije

DEFINICIJA: Naj bo $I \subset \mathbb{R}$ interval in $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija. Pravimo, da je f *naraščajoča funkcija* (na I), če velja

$$\forall x_1, x_2 \in I : x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

Pravimo, da je f *strogo naraščajoča* (na I), če

$$\forall x_1, x_2 \in I : x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Podobno definiramo padajočo in strogo padajočo funkcijo.

Funkcija je (strogo) *monotona*, če je ali (strogo) naraščajoča, ali (strogo) padajoča.

IZREK: Naj bo f strogo monotona funkcija na $[a, b]$. Če je f zvezna, potem je njena inverzna funkcija f^{-1} zvezna.

DOKAZ: Denimo, da je f strogo naraščajoča. Ker je f strogo naraščajoča, je injektivna, zato inverzna funkcija obstaja.

Vemo: Ker je f zvezna, je njena zaloga vrednosti zaprt interval od najmanjše do največje vrednosti, t.j.: $[f(a), f(b)]$.

$$f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$$

Dokazujemo, da je f^{-1} zvezna $\forall y_0 \in [f(a), f(b)]$.

Izberimo $\varepsilon > 0$. Obstaja natanko en $x_0 \in (a, b) : f(x_0) = y_0$ ($f^{-1}(y_0) = x_0$).

Ker je f strogo naraščajoča:

$$f(x_0 - \varepsilon) < \underbrace{y_0}_{f(x_0)} < f(x_0 + \varepsilon)$$

Izberemo

$$\delta = \min\{f(x_0 + \varepsilon) - y_0, y_0 - f(x_0 - \varepsilon)\} > 0$$

Če $|y - y_0| < \delta : f(x_0 - \varepsilon) < y < f(x_0 + \varepsilon)$

Ker je f^{-1} strogo naraščajoča:

$$\begin{aligned} x_0 - \varepsilon &< f^{-1}(y) < x_0 + \varepsilon \\ |f^{-1}(y) - \underbrace{x_0}_{f^{-1}(y_0)}| &< \varepsilon \end{aligned}$$

□

5.4 Zveznost posebnih funkcij

Vemo, da so polinomi in racionalne funkcije zvezne.

PRIMER $f(x) = x^n$ je zvezna funkcija

- $n \in \mathbb{N}$, n liho, potem je f strogo naraščajoča na \mathbb{R} . Po izreku $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ zvezna funkcija na \mathbb{R} .
- n sodo: $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ je zvezna funkcija na $[0, \infty)$.

Zato so *algebraične* funkcije zvezne.

Eksponentna funkcija $a > 0, a \neq 1$. Definirali smo že $a^x, x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} a^{\frac{m}{n}} &= \sqrt[n]{a^m} \\ x \in \mathbb{R}, x &= \lim_{n \rightarrow \infty} q_n \\ a^x &:= \lim_{n \rightarrow \infty} a^{q_n} \end{aligned}$$

Iz pravil za računanje z racionalnimi potencami sledi:

$$a^{x+y} = a^x a^y, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

IZREK: Eksponentna funkcija $x \mapsto a^x$ je zvezna na \mathbb{R} , njena zaloga vrednosti je $(0, \infty)$.

Če je $a > 1$, potem je eksponentna funkcija naraščajoča, če je $a < 1$, potem je padajoča.

DOKAZ: Za $a > 1$, za $a < 1$ je podobno. $x \mapsto a^x$ strogo naraščajoča

$$x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

$$a^{x_2} = a^{x_1 + (x_2 - x_1)} = a^{x_1} \cdot \underbrace{a^{x_2 - x_1}}_{>1} > a^{x_1}$$

Zveznost: Vemo že

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall h \in \mathbb{Q}, |h| < \delta \Rightarrow |a^h - 1| < \varepsilon$$

Ker je $x \mapsto a^x$ strogo naraščajoča, velja zgornja trditev tudi če \mathbb{Q} zamenjamo z \mathbb{R} .

$$h > 0 : \exists h_1 \in (h, \delta) : 0 < h < h_1 < \delta \Rightarrow a^0 < a^h < a^{h_1}$$

ker je $|a^{h_1} - a^0| < \varepsilon$ je tudi $|a^h - a^0| < \varepsilon$.

Podobno lahko naredimo za $h < 0$.

Torej je $x \mapsto a^x$ zvezna v točki 0.

Naj bo $x_0 \in \mathbb{R}$ in dokažimo zveznost v x_0 . Izberemo $\varepsilon > 0$ in iščemo $\delta > 0$:

$$\begin{aligned} |a^x - a^{x_0}| &= a^{x_0} |a^{x-x_0} - 1| \\ |a^{x-x_0} - 1| &< \frac{\varepsilon}{a^{x_0}} \end{aligned}$$

Ker je zvezna v točki 0, obstaja $\delta > 0$:

$$|h| = |x - x_0| < \delta \Rightarrow |a^h - 1| < \frac{\varepsilon}{a^{x_0}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a^n &= \infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a^{-n} &= 0 \end{aligned}$$

Na $[-n, n]$ a^x doseže vse vrednosti od $[a^{-n}, a^n]$. Za $a^x = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [a^{-n}, a^n] = (0, \infty)$

Posledica: Naj bo $a > 0, a \neq 1$. Potem velja:

$$(a^x)^y = a^{xy}, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

DOKAZ: (skica)

$$\begin{aligned} p_n &\in \mathbb{Q}, & p_n &\rightarrow x \\ q_m &\in \mathbb{Q}, & q_m &\rightarrow y \end{aligned}$$

$(a^{p_n})^{q_m} = a^{p_n q_m}$ za $\forall n, m$ (ker so racionalne potence)

$a^{p_n q_m} = a^{x q_m}$, ko gre $n \rightarrow \infty$ po definiciji. $a^{x q_m} = a^{xy}$, ko gre $m \rightarrow \infty$ po definiciji.

$(a^{p_n})^{q_m} = (a^x)^{q_m}$, ko gre $n \rightarrow \infty$, ker je $x \mapsto x^{q_m}$ zvezna. $(a^x)^{q_m} = (a^x)^y$, ko gre $m \rightarrow \infty$, zaradi zveznosti.

DEFINICIJA: Naj bo $a > 0, a \neq 1$ inverzno funkcijo eksponentne funkcije $x \mapsto a^x$ imenujemo *logaritemska funkcija* z osnovo a in označimo z \log_a . Logaritem z osnovo e označimo z \ln in imenujemo *naravni logaritem*.

Opomba:

- \log obstaja (po nekem izreku)
- $\log_a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ slika bijektivno

Po definiciji inverzne funkcije je

$$y = \log_a x \iff a^y = x$$

IZREK: Funkcija \log_a je zvezna na $(0, \infty)$. Če je $a > 1$, potem je strogo naraščajoča, če je $a < 1$, potem je strogo padajoča. **Velja:**

$$\begin{aligned} \log_a(xy) &= \log_a x + \log_a y & \forall x, y > 0 \\ \log_a x^\lambda &= \lambda \log_a x & \forall x > 0, \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

DOKAZ: Vse razen lastnosti so posledica prejšnjih izrekov

$$\begin{aligned} c &= \log_a x \quad \text{in} \quad d = \log_a y \\ \Rightarrow a^c &= x \quad \text{in} \quad a^d = y \\ \Rightarrow \underbrace{a^c \cdot a^d}_{a^{c+d}} &= xy \\ \Rightarrow c + d &= \log_a(xy) \\ \Rightarrow \log_a x + \log_a y &= \log_a(xy) \end{aligned}$$

□

5.5 Trigonometrične funkcije

Iz prosminarja vemo

$$\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \varphi$$
$$\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \tan \varphi$$

zato je za študij osnovnih lastnosti dovolj obravnati le eno funkcijo.

IZREK: Sinus je zvezna funkcija \mathbb{R} .

DOKAZ: Narišemo si enotsko krožnico in v njo vrišemo kot φ_0 in φ , kjer $\varphi_0 < \varphi$. Ozaničimo trikotnik ABC , tako da je $A(\cos \varphi_0, \sin \varphi_0)$, in $B(\cos \varphi, \sin \varphi)$. Vemo, da je ABC pravokotni trikotnik, in je dolčina loka $AB = l$. Velja $l > AB > AC, BC$.

Vemo: $\overline{BC} = |\sin \varphi - \sin \varphi_0|$ in dolžina loka $AB = |\varphi - \varphi_0|$. Velja $|\sin \varphi - \sin \varphi_0| \leq |\varphi - \varphi_0|$.

sinus je zvezna v točki φ_0

Izberemo $\varepsilon > 0$ in iščemo δ . Velja

$$|\sin \varphi - \sin \varphi_0| \leq |\varphi - \varphi_0| \varepsilon$$

Izberemo $\delta := \varepsilon$: če je $|\varphi - \varphi_0| < \delta = \varepsilon$, potem je $|\sin \varphi - \sin \varphi_0| \leq |\varphi - \varphi_0| < \delta = \varepsilon$.

□

5.6 Ciklometrične funkcije

. Večino znamo že iz proseminarja. Vemo, da je arcsin inverzna funkcija $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$. Posledica izreka je, da so arkus sinus, arkus kosinus, arkus tangens in arkus kotangens zvezna funkcije.

Elementarne funkcije so funkcije, ki jih dobimo iz osnovnih tipov (polinomi, racionalne funkcije, algebraične funkcije, eksponentne, trigonometrične) z uporabo aritmetičnih opracij, kompozituma in invertiranja. **Primer:**

$$\ln(\arcsin(\sqrt{x^2 + 6x + e^x}))$$

Elementarne funkcije so zvezne.

$$f(x) = \begin{cases} x & x > 0 \\ 16 & x \leq 0 \end{cases}$$

ni zvezna funkcija (ni elementarna funkcija). Pravimo ji *zlepek*.

5.7 Limita funkcije

Radi bi opisali lokalno obnašanje funkcije: imamo funkcijo, ki je definiran v okolici točke a in ne nujno v a .

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana v *prebodeni okolici* točke a , t.j.: obstaja $r > 0$, da je f definirana na $(a - r, a + r) \setminus \{a\}$. Število $L \in \mathbb{R}$ imenujemo *limita* funkcije f , ko gre x proti a , če

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

TRDITEV: Naj bo f definirana v okolici točke a . Funkcija f je zvezna v točki a natanko tedaj, kadar je

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

to pomeni: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ obstaja in je enaka $f(a)$.

DOKAZ: napišemo obe definiciji in je očitno, zato je bil za DN.

POSLEDICA: Naj bo funkcija f definirana v prebodeni okolici D_f točke a . Če obstaja $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, potem je funkcija

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in D_f \setminus \{a\} \\ L & x = a \end{cases}$$

zvezna funkcija v točki a .

$$\text{DOKAZ: } \lim_{x \rightarrow a} \tilde{f}(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \tilde{f}(a)$$

IZREK: Naj bo funkcija f definirana v prebodeni okolici \mathcal{U} točke a . Potem obstaja $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ natanko tedaj, kadar za vsako zaporedje $x_n \in \mathcal{U}$, ki konvergira proti a , zaporedje $f(x_n)$ konvergira proti L .

DOKAZ: Posledica trditve (zvezna \Rightarrow po izreku za zveznost).

IZREK: Naj bosta f in g definirani v prebodeni okolici točke a in denimo, da obstaja $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ in $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$. Potem obstajajo $\lim_{x \rightarrow a} (f+g)(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} (f-g)(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x)$ in velja:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) &= \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right)\end{aligned}$$

Če je $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$, potem obstaja $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ in velja

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

DOKAZ: Imamo zveznost po trditvi in delamo z zaporedji.

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana na $(a-r, a)$ za nek $r > 0$. Pravimo, da je $L \in \mathbb{R}$ *leva limita* funkcije f , ko gre x proti a če

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D_f : x \in (a - \delta, a) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Oznaka:

$$L = \lim_{x \nearrow a} f(x) = f(a-) = \lim_{x \uparrow a} f(x)$$

Podobno definiramo *desno limito* in označimo

$$D = \lim_{x \searrow a} f(x) = f(a+) = \lim_{x \downarrow a} f(x)$$

TRDITEV: Naj bo f definirana v prebodeni okolici točke a . Limita funkcije f ko gre x proti a obstaja natanko tedaj, kadar obstajata leva in desna limita in sta enaki.

DOKAZ: Potrebno je lepo zložiti definicije, zato je bil dokaz za DN.

IZREK: Naj bo f monotona funkcija na $[a, b]$. Potem za vsak $c \in (a, b)$ obstajata $f(c-)$ in $f(c+)$. Funkcija f je zvezna v točki c natanko tedaj, kadar $f(c-) = f(c+)$. Če je naraščajoča, potem je $f(c-) \leq f(c) \leq f(c+)$. Če je f padajoča, potem je $f(c+) \leq f(c) \leq f(c-)$.

DEFINICIJA: Če monotona funkcija f na $[a, b]$ ni zvezna v točki c , potem $f(c+) - f(c-)$ imenujemo *skok* funkcije f v točki c .

DOKAZ: (izreka) Naj bo f naraščajoča, $c \in (a, b)$. Vemo

$$\forall x \in [a, c] : f(x) \leq f(c)$$

Množica $\{f(x) : x \in [a, c)\}$ je navzgor omejena, zato ima supremum S . Dokazujemo $\underline{f(c-)} = S$

Izberemo $\varepsilon > 0$. Obstaja $x_0 \in [a, c)$, da je $f(x_0) > S - \varepsilon$.

Za $x \in [x_0, c)$ velja: ker je f naraščajoča: $S - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq S$. Torej $f(x) \in (S - \varepsilon, S + \varepsilon)$. Vzamemo $\delta := c - x_0$. Podobno naredimo za desno limito in padajoče zaporedje.

□

IZREK: Monotona funkcija f na $[a, b]$ ima kvečjemo števno mnogo točk nezveznosti.

DOKAZ: Vemo: v točkah nezveznosti ima funkcija monotona skok. Naj bo

$$\mathcal{N} = \text{množica točk nezveznosti}$$

Velja

$$\forall c \in \mathcal{N} \exists f(c-), f(c+) : f(c-) \neq f(c+)$$

Če je f naraščajoča: obstaja $r_c \in (f(c-), f(c+)) \cap \mathbb{Q}$. Naj bo

$$g : \mathcal{N} \rightarrow \mathbb{Q} \quad g(c) = r_c$$

g je injektivna, zato je \mathcal{N} kvečjemu števna.

□

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana na (a, ∞) , $a \in \mathbb{R}$. Število $L \in \mathbb{R}$ je limita funkcije f , ko pošljemo x čez vse meje, če velja:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M \in \mathbb{R}, M > a \forall x \in \mathbb{R} : x \geq M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

V tem primeru pišemo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Podobno definiramo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana na prebodeni okolici točke a . Pravimo, da f izpolnjuje *Cauchyjev pogoj* pri a , če

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\} : |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

TRDITEV: Naj bo funkcija f definirana na prebodeni okolici točke a . Funkcija f izpolnjuje Cauchyjev pogoj pri a natanko takrat, kadar obstaja limita funkcije f , ko gre x proti a .

DOKAZ: Za DN.

Opomba: Cauchyjev pogoj ima smisel tudi pri $a = \pm\infty$ in trditev velja tudi pri $a = \pm\infty$.

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana v prebodeni okolici točke a . Pravimo, da je limita funkcije f , ko gre x proti a enaka neskončno če

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0, \forall x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\} : f(x) > M$$

Označimo z $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

Podobno definiramo:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \uparrow a} f(x) = \pm\infty$
- $\lim_{x \downarrow a} f(x) = \pm\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$

PRIMER:

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Če si narišemo krožni izsek enotske krožnice, lahko z malo geometrije pridemo do ocene $\frac{1}{2} \sin x \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} \tan x$. Nato izraz nekoliko preuredimo in dobimo $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$. Uporabimo lahko izrek o sendviču in pridemo do končnega rezultata.

2) $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = e$

Vemo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\lim_{n \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e$$

Za $x \in [n, n+1)$ velja:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Po izreku o sendviču torej velja $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = e$

$$3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$a^h = 1 + \frac{1}{x}$$

$$h > 0 : h \rightarrow 0, x \rightarrow \infty$$

$$h < 0 : h \rightarrow 0, x \rightarrow -\infty$$

$$h = \log_a \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$\frac{a^h - 1}{h} = \frac{1}{x \log_a \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{\log_a \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} \rightarrow \frac{1}{\log_a e} = \ln a$$

5.8 Odvod

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana v okolici točke a . Če obstaja

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

jo imenujemo *odvod* funkcije f v točki a in jo označimo s $f'(a)$ in pravimo, da je f *odvodljiva* v točki a .

Opomba: Če je f odvodljiva v točki a : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

$$\Delta f = f(x) - f(a)$$

$$\Delta x = x - a$$

razliki ali *diferenca*. $x = a + h$, $h = x - a$

Kvoceint $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ se imenuje *diferenčni kvoecient*.

GEOMETRIJSKI POMEN: Naklonski koeficient sekante skozi $(a, f(a)), (x, f(x))$ je $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. V limiti $x \rightarrow a$ dobimo naklonski koeficient tangente.

PRIMER: $f(x) = x^2 + 1$. Izračunaj $f'(2)$.

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1 - 5}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 2)(x - 2)}{x - 2} = 4$$

IZREK: Naj bo funkcija f definirana v okolici točke a . Če je f *odvadjiva* v točki a , potem je f zvezna v točki a .

DOKAZ: Denimo, da je f odvadjiva v točki a .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left(f(a) + (f(x) - f(a)) \frac{x - a}{x - a} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} f(a) + \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = \\ &= f(a) + f'(a) \cdot 0 = f(a) \end{aligned}$$

PRIMER:

1) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ je zvezna na \mathbb{R} . Ali je odvadjiva v 0?

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{-\frac{2}{3}} = \infty$$

ni odvadjiva.

2)

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{1}{h}$$

ne obstaja

3) $g(x) = |x|$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

ne obstaja, ker $\lim_{h \downarrow 0} \frac{|h|}{h} = 1$, $\lim_{h \uparrow 0} \frac{|h|}{h} = -1$

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana na $[a, a + r)$ za nek $r > 0$. Če obstaja $\lim_{x \downarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, jo imenujemo *desni odvod* funkcije f v točki a . Podobno definiramo *levi odvod*.

TRDITEV: Naj bo funkcija f definirana v okolici točke a . Funkcija f je odvahljiva v točki a natanko tedaj, kadar obstaja levi in desni odvod funkcije f v točki a in sta enaka.

DEFINICIJA: Pravimo, da je funkcija f odvahljiva na (a, b) , če je f odvahljiva v vsaki točki iz (a, b) .

Funkcija f je odvahljiva na $[a, b]$, če je f odvahljiva na (a, b) , v krajišču a ima desni odvod in v krajišču b ima levi odvod.

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana na intervalu I in naj bo f odvedljiva vsaj v kakšni točki iz I . Označimo z

$$I' = \{x \in I : f \text{ je odvedljiva v točki } x\}$$

Funkcijo $f' : I' \rightarrow \mathbb{R}$ in je definirana s predpisom $x \mapsto f'(x)$ imenujemo *odvod* funkcije f .

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana na intervalu I .

Pravimo, da je f *zvezno odvedljiva* na I , če je f odvedljiva na I in je njen odvod f' zvezna funkcija na I .

DEFINICIJA: Naj bo $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Pravimo, da je f *odsekoma zvezno odvedljiva*, če je odvedljiva povsod, razen v končno mnogo točkah c_1, \dots, c_k , $a < c_1 < \dots < c_k < b$ v katerih ima f levi in desni odvod, na vsakem podintervalu $[a, c_1], [c_1, c_2], \dots, [c_k, b]$, pa je f zvezno odvedljiva.

Primer: $f(x) = |x|$.

5.9 Diferencial

Naj bo f odvahljiva v točki a

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Velja:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - hf'(a)}{h} = 0$$

Označimo števec $o(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a)h$, kjer je $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0$.

Velja:

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + o(h)$$

Izpeljali smo, da je odvodljivo funkcijo v točki a v okolici točke a mogoče „dobro“ aproksimirati z „linearno“ funkcijo.

DEFINICIJA: Naj bo funkcija f definirana v okolici točke a . Pravimo, da je f *diferenciabilna* v točki a , če obstaja linearna preslikava $\mathcal{L} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, za katero velja

$$f(a+h) - f(a) = \mathcal{L}(h) + o(h)$$

kjer je $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0$. Linearno preslikavo \mathcal{L} imenujemo *diferencial* funkcije f v a in jo označimo $df(a)$.

Opombe:

1. Če je f odvedljiva v točki a , potem je f diferenciabilna v točki a in $\mathcal{L}(h) = f'(a)h$.
2. Vse linearne preslikave $\mathcal{L} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ so oblike $h \mapsto kh, k \in \mathbb{R}$.

IZREK: Naj bo funkcija f definirana v okolici točke a . Potem je f diferenciabilna v točki a natanko tedaj, kadar je f odvedljiva v točki a . V tem primeru velja $df(a)h = f'(a)h$.

DOKAZ:

(\Leftarrow) že vemo

(\Rightarrow) Po predpostavki obstaja $\mathcal{L} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ linearna preslikava, da je

$$f(a+h) - f(a) = \mathcal{L}(h) + o(h)$$

kjer $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0$.

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - \mathcal{L}(h)}{h}$$

Ker je \mathcal{L} linearna, obstaja $a \in \mathbb{R} : \mathcal{L}(h) = ah, \quad \forall h \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - \mathcal{L}(h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - ah}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - a \end{aligned}$$

Po pravilih za računanje z limitami torej obstaja $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ in je enaka a .

ZAPIS: Naj bo f odvedljiva v x $h = \Delta x$.

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$$

kjer je $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$

Vemo $df(x)\Delta x = f'(x)\Delta x$. Vzamemo $f(x) = x$ $dx = \Delta x$. $df = f'dx$ $f'(x) = \frac{df}{dx}(x)$.

5.10 Pravila za odvajanje

5.10.1 Konstante

$$f(x) = c$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

5.10.2

Če sta f in g odvedljivi funkciji v točki a , potem so tudi $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ odvedljive v točki a in velja

$$\begin{aligned} (f \pm g)'(a) &= f'(a) \pm g'(a) \\ (fg)'(a) &= f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \end{aligned}$$

Če je $g(a) \neq 0$, potem je $\frac{f}{g}$ odvedljiva v a in velja

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$$

DOKAZ:

$$\begin{aligned}
 (fg)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(fg)(a+h) - (fg)(a)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow a} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a) - f(a)g(a+h) + f(a)g(a+h)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a+h)}{h} + \lim_{h \rightarrow a} \frac{f(a)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} g(a+h) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + f(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \\
 &= g(a)f'(a) + f(a)g'(a)
 \end{aligned}$$

POSLEDICA: Če je f odvedljiva v točki a in $\lambda \in \mathbb{R}$, potem velja

$$(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)$$

Dokaz z uporabo formule za produkt in $g(x) = \lambda$.

POSLEDICA: Če so funkcije f_1, \dots, f_n odvedljive v točki a , potem velja

$$(f_1 f_2 \cdots f_n)'(a) = f_1'(a) f_2(a) \cdots f_n(a) + f_1(a) f_2'(a) f_3(a) \cdots f_n(a) + \cdots + f_1(a) \cdots f_n'(a)$$

Dokaz z indukcijo in formulo za produkt.