

a
600 K
800 K
1000 K
1200 K
Li
P
S
Cl
kinisi fit window
AIMD MSD (Å²)
Lag time (ps)
b
AIMD Li D (cm² s⁻¹)
1200 K
slope 0.851
1000 K
slope 0.998
800 K
slope 0.523
600 K
slope 0.0708
caged
kinisi (seed 0) +/- 1 s.d.
pymatgen
1000/T (K⁻¹)
c
kinisi D relative to seed 0 (%)
s_seed 1.21 %
post. 43.9 %
s_seed 0.887 %
post. 29.3 %
s_seed 0.538 %
post. 17.6 %
s_seed 0.602 %
post. 16.6 %
seed 0 (primary)
seeds 1-10
600 K
800 K
1000 K
1200 K
d
mS cm⁻¹
Published AIMD extrapolations, ordered cell
Deng et al. 2017 (quoted by Baktash et al. 2020)
0.002
de Klerk et al. 2016 (quoted by Baktash et al. 2020)
290
Baktash et al. 2020
0.06-0.3
This study: universal potentials, ordered cell, 416 atoms
MACE-MP-0
5.55 [4.21, 7.31]
MatterSim
0.349 [0.249, 0.489]
Measured, disordered polycrystals (context)
Wang et al. 2018
3.15
compiled range (Li et al. 2025)
0.06-1.1
σ(300 K), Arrhenius extrapolation or measured (mS cm⁻¹)