

MACE-MP-0
Fine-tuned, Gamma labels
Fine-tuned, 2x2x2 labels
AIMD, same ordered cell (Deng et al. 2017)
a
T (K)
1200
1000
800
600
Li diffusion coefficient (cm² s⁻¹)
AIMD not diffusive
1000/T (K⁻¹)
b
AIMD sub-diffusive
kinisi, ±1 s.d.
pymatgen
Li D / D(AIMD)
AIMD
MACE-MP-0
D / D(MP-0)
Temperature (K)
c
MACE-MP-0
Gamma
2x2x2
σ(300 K) (mS cm⁻¹)
Eₐ (eV)
f = ln(σ2x2x2/σGamma) / ln(σMP0/σGamma) = -0.222
ln(σ2x2x2/σGamma) = -0.555 ± 0.513
Pre-registered reading: not explained
MD models: Gamma stage-two, 2x2x2 stage-one
d
Log-log slope in the fit window
MACE-MP-0 0.826
Gamma 0.354
2x2x2 0.507
AIMD 0.0708
MLIP fit window
AIMD fit window
600 K
1000 K
Li MSD (Å²)
Lag time (ps)
e
n = 3, descriptive
Li D / D(AIMD) at 1000 K
AIMD
Li softening slope vs 2x2x2 (All27)
f
Mean pressure, fixed cell (GPa)
Temperature (K)