

a
600 K
800 K
1000 K
July run log survives
from the trajectory only
±1 s.e. (5-ps blocks)
Mean T - target (K)
b
std(T)/T (%)
canonical $\sqrt{2/(3N)}$, N = 52
canonical $\sqrt{2/(3N)}$, N = 392-416
c
Energy drift (meV atom^{-1} ps^{-1})
±1 s.e. of the slope (5-ps blocks)
50 ps
100 ps
150 ps
MACE-MP-0
MatterSim
Gamma labels
2x2x2 labels
x = 0
x = 0.25
x = 0.50
x = 0.75
MACE-MP-0 52 atoms
MatterSim 52 atoms
416 atoms 200 ps
Cl-excess 150 ps
d
MACE-MP-0
MatterSim
Fine-tuned, Gamma labels
Fine-tuned, 2x2x2 labels
T (K)
E - mean (meV atom^{-1})
1000 K; thin, 0.5-ps blocks; thick, 5-ps blocks
P (GPa)
Production time (ps)
e
tolerance (protocol item 7)
within
outside
600 K
800 K
1000 K
recomputed from the trajectory minus the July run log
Mean T (K)
Mean E (meV/atom)
Drift (10^{-3} meV/atom/ps)
4 runs outside the rounding: |d| = 1.20-1.49 x 10^{-3}
MACE-MP-0, 52 atoms 50 ps
MACE-MP-0, 52 atoms 150 ps
MatterSim, 52 atoms 50 ps
MatterSim, 52 atoms 100 ps
MACE-MP-0 600 K
MatterSim 600 K
2x2x2 800 K
416 atoms, 200 ps
x = 0 1000 K
x = 0.25 800 K
x = 0.50 1000 K
x = 0.75 600 K
Cl-excess, 150 ps