

TPA

מלר"ד עין כרם 2024

בר הוטור הורוביץ

TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR - TPA

אלטפלאז הינו אנזים המעורב בפירוק קרישי דם המופק בהנדסה גנטית.

מי יקבל TPA?

*שבץ איסכמי אקוטי ללא תמונת

דימום בCT

*גיל 18-80

*NIHSS מתחת ל25

*ל"ד מתחת ל110\185

מהו TPA, למי ניתן

ואיך מכינים!?

מה ערכת TPA מכילה?

אבקת
הTPA



מים סטריליים
להזרקה




חשוב לזכור! TPA לא
מוהלים בשום נוזל אחר
חוץ מהמים בבקבוקון!

מחבר בין
הבקבוקונים




1

מחברים את 2 הבקבוקונים
בעזרת המחבר בנוזל ואז
באבקה ומניחים אחד מעל
השני- כך שהמים הסטריליים
יזרמו אל האבקה



2

שואבים את התמיסה המוכנה
בעזרת מזרק לפי המינון הרצוי
(כל בקבוק מכיל 50 מ"ג בתוך
50 מ"ל. ז"א- יחס של 1:1)




3

90% מהמינון הרצוי מכניסים
לתוך בירטה, 10% הנותרים
שואבים במזרק למתן ב-PUSH
ע"י הנוירולוג



4

מוכן! את הבירטה ניתן לחבר לשקית
נוזלים רק כדי שיהיה לה על מה
להיתפס בעמוד. בשום אופן לא
פותחים את השקית ולא מוהלים את
ה-TPA המוכן בנוזלים אחרים




מינון ומשך המתן

מהו המינון למתן TPA? 0.9 ק"ג לקילו, עד גבול של 90 מ"ג סה"כ.

10% מתוך המינון ניתן בתחילה ע"י הנוירולוג בPUSH למשך דקה, ולאחר מכן ניתן את 90% הנותרים בבריטה למשך שעה.

כמות החומר בבריטה-
50ML



כמות החומר
סה"כ- 70ML

אדון א.ב. שוקל 86 ק"ג.
לכן המינון עליו לקבל-
 $86 \times 0.9 = 77$ מ"ג.

$7.7 = 10\%$ מ"ג בפוש

$70 = 90\%$ מ"ג- בבריטה

כאשר אנחנו מכינים 70 מ"ג של TPA, יוצא לנו 70 מ"ל בתוך הבריטה. לאחר שטיפה של הסט- נשאר 50 מ"ל בתוך הבריטה ועוד 20 מ"ל בצינור השטיפה.

כיצד יש לכוון את האייבק כך שהחומר בתוך הבריטה+צינור השטיפה יתקבל בשעה?

לאחר 43 דק' האייבק יצפצף, מה שאומר שה50 מ"ל בבריטה נגמרו- ועלינו לתת עכשיו ב17 דק' את ה20 מ"ל שנשארו בצינור השטיפה. נמלא 20 מ"ל של הסליין התלוי בתוך הבריטה כך שהTPA שנשאר בצינור יזרום(כך משלימים סה"כ לשעה של מתן)

כיוונו 2 מדדים- כמות החומר בבריטה וכמות החומר סה"כ- האייבק מחשב את המדד השלישי- זמן המתן- לבד.

יצא שה50 מ"ל בבריטה ייתנו ב43 דק'.



יש לשים לב..

בזמן מתן TPA יש לוודא שלחץ הדם אינו עולה מעל 185\110, ולהיות בקשר תמידי עם הנוירולוג מהו הלחץ דם הרצוי.



במידת הצורך- כמובן לטפל

מדידת ס"ח כולל חום וסוכר לפני, תוך כדי ואחרי המתן



יש להדריך את המשפחה והמטופל לשים לב אם ישנו דימום מהאף\חניכיים, שינוי במצב ההכרה או תגובה אלרגית.



בכל אחד מאלו- יש לדווח מידיית לנוירולוג ולעצור את מתן הTPA במידת הצורך