מתן HAEMOCOMPLETTAN (פיברינוגן)

שלומית אטלו

ראש צוות טראומה

תפקיד הפיברינוגן בגופנו

- לפיברינוגן תפקיד מרכזי במנגנון הקרישה בגוף.
- בתהליך קרישת הדם, פיברינוגן הופך לפיברין וסותם את ה'פציעה' בכלי דם פצוע.
- בתמונה – הפיברין הוא הרשת הלבנה ש'תופסת' את מרכיבי הדם שמייצרים את התרומבוס.



HAEMOCOMPLETTAN
תרכיז פיברינוגן

- HAEMOCOMPLETTAN הינו תרכיז פיברינוגן אשר ניתן לפצועים עם פגיעה במנגנון הקרישה.
- במקרה חירום תרופה זו בעלת יתרון על מתן FFP או קריופרסיפיטט.



התוויות לשימוש

- **<u>ניתן בהוראה של כירורג בכיר בלבד!!</u>** (אפשר גם טלפונית)
- **פצוע טראומה** עם חשד לשוק המורגי או חשד לדימום מוחי משמעותי.
- ערכי פיברינוגן מתחת ל-2 (תקין 170-420)
  - לא חייב להמתין לתוצאות פיברינוגן טרם מתן.
- ניתן בבית החולים גם בחדרי לידה בדימום מיילדותי משמעותי ובחדרי ניתוח.
- <u>מינון:</u>
- מבוגרים – 2 גרם (2 פלקונים), מינון מקסימלי 8 ג'.
- ילדים – 20-30 מ"ג לק"ג.

- חובה לשלוח מרשם חדש לרוקח תורן ולעדכן ראש צוות טראומה על מתן התרופה.

הציוד הנדרש

- הציוד כולו יהיה בערכות במקרר תרופות בטראומה.
- בקופסא של התרופה:
  - HAEMOCOMPLETTAN 1G
  - מתאם מזרק
  - מסנן מזרק
- מים סטרילייים 100 מ"ל
- סט נוזלים
- מרשם
- מחמם דם (עמדה 1 בטראומה)



סדר פעולות

שאיבת 50 מ"ל של מים סטרילייים
והזרקה לפלקון התרופה דרך מתאם מזרק



סדר פעולות

שאיבת 50 מ"ל של מים סטרילייים והזרקה לפלקון התרופה דרך מתאם מזרק

לערבב בעדינות עד להמסת התרופה

סדר פעולות

שאיבת 50 מ"ל של מים סטרילייים והזרקה לפלקון התרופה דרך מתאם מזרק

לערבב בעדינות עד להמסת התרופה

לחבר את המסנן (מצד אחד למתאם המזרק ומצד שני למזרק) ולשאוב את התרופה

סדר פעולות

שאיבת 50 מ"ל של מים סטרילייים והזרקה לפלקון התרופה דרך מתאם מזרק

לערבב בעדינות עד להמסת התרופה

לחבר את המסנן (מצד אחד למתאם המזרק ומצד שני למזרק) ולשאוב את התרופה

להזריק את התרופה חזרה לבקבוק המים הסטרילייים, שני הגרם לבקבוק אחד של מים

סדר פעולות

שאיבת 50 מ"ל של מים סטריליים והזרקה לפלקון התרופה דרך מתאם מזרק

לערבב בעדינות עד להמסת התרופה

לחבר את המסנן (מצד אחד למתאם המזרק ומצד שני למזרק) ולשאוב את התרופה

להזריק את התרופה חזרה לבקבוק המים הסטריליים

לחבר לסט נוזלים, לחבר למחמם דם (**חובה**) ולתת בהרצה

תופעות לוואי

- תגובה אלרגית – יש להפסיק את מתן התרופה באופן מיידי ולהעריך את המטופל.
- היווצרות קרישי דם – יש להיזהר במתן למטופלים עם רקע תרומבואמבולי (CVA, IHD, PE, DVT)

סיכום

- תרופה זו חשובה ומצילה חיים במקרה של דימום טראומתי משמעותי.
- במקרר תרופות בטראומה קיימת ערכה המכילה 2 קופסאות של התרופה (1 גרם בכל קופסא), מזרק 50 מ"ל, מים סטריליים להזרקה 100 מ"ל, סט נוזלים, מרשם.
- חובה לתת את התרופה דרך מחמם דם.
- למלא מרשם ולשים במוקד
- לעדכן ראש צוות טראומה על מתן התרופה.

- כרגע התרופה לא קיימת במחשב ולכן יש להזכיר לכירורגים לרשום הוראה כללית ולחתום עליה



פה בשבילכם!