Troponin

רוני זפרני, ינואר 2024

Troponin הוא קומפלקס של 3 חלבונים- טרופונין T, טרופונין I וטרופונין C- המבקר את התכווצות השריר.

- חיוני להתכווצות של שרירים משורטטים ושריר הלב
- משמש כמרקר למחלות לב, והינו הוכחה מעבדתית לנקרוזה



במצב אוטם העליה ברמת הטרופונין מתרחשת תוך 3-4 שעות מתחילת הסימפטומים, מגיעה לשיאה כעבור 24-48 שעות ונותרת גבוהה למשך 10-14 ימים.

מקובל לבצע בדיקה לטרופונין בתחילת הסימפטומים ולחזור על הבדיקה בטווחי זמן של 3 ו6 שעות ולעיתים יותר.

למרות שעליה בטרופונין משקפת לרוב נזק נקרוטי בלב קיימת אבחנה מבדלת עם מצבים קרדיאליים אחרים ועם מצבים לא קרדיאליים.

רמה תקינה בדם

- תקין < 2.5
- חריג בקרב נשים < 34
- חריג בקרב גברים < 54

במידה ורמת הקריאטנין של המטופל **גבוהה**, הרי שסינון הטרופונין הנמצא בדם באופן תקין נפגע, ולכן בכל התייחסות לרמת הטרופונין בדם יש להתייחס לרמת הקריאטנין של המטופל

CK

רוני זפרני, ינואר 2024

קריאטנין -קינאז (Creatine Kinase) הוא אנזים עם 3 תתי סוגים-

- CK-MM- בשריר.
- CK-MB- בלב.
- CK-BB-במח.

כאשר יש הרס של שריר, האנזים דולף אל מחזור הדם.

רמת האנזים תעלה ביחס ישיר לעוצמת ההרס.

רמות בדם

- רמה **תקינה** במעבדה של הדסה 34- 145

מתי נצפה לראות רמות **גבוהות** של CK?

- לאחר אימון גופני מאומץ
- מחלות שריר, חבלה או ניתוח בשריר
- בעיות לבביות- מיוקרדיטיס, MI
- תרופות מסוימות
- פרכוס

מתי נצפה לראות רמות **נמוכות** של CK?

- דלדול במסת שריר