כלבת

רוני זפרני, אפריל 2024

1

2

3

מחלה ויראלית קטלנית התוקפת יונקים

שני מאפיינים יחודיים–

1.אינה הופכת לפחות אלימה במהלך האבולוציה.

2.טווח מאכסנים רחב מאוד.

חייבים מגע רציף עם הרוק של החיה ע"מ להידבק.

בישראל המחלה נפוצה בקרב תנים ושועלים.

אדם החולה בכלבת מדבק שבועיים לפני תחילת הסימנים.

טיפול ראשוני-

- לקיחת תרבית מהפצע
- שטיפה במים וסבון
- טיפול אנטיביוטי- אוגמנטין\ צפטריאקסון. לא ניתן באופן גורף אלא בשיקול דעת רפואי.
- במקרה של זיהום חמור ניתן לעשות הטרייה כירורגית
- מתן טטנוס

אם מדובר בחיית בית, יש לברר סטטוס חיסוני, ולהביא אותה להסגר של 10 ימים.

בישראל משנת 2002 יש חוק המחייב מתן חיסון לכלבת לכל כלב

1

2

3

חיסון לכלבת

מתי ניתן חיסון?

לא חד משמעי, אלא לפי אנמנזה שתילקח על ידי לשכת הבריאות המחוזית

במקרים בהם לא ניתן להכניס את החיה להסגר ולהשגיח עליה, נעדיף להחמיר ולהתחיל בטיפול לכלבת.

סוגי חיסונים–

ב.פעיל– HDRV, כל אחד שנגשך יקבל
ב.סביל– RIG. ניתן בהסננה מסביב לפצע. במידה והפצע קטן ולא ניתן לתת את כל המנה בהסננה, ניתן את השארית IM.
ההוראה יכולה להינתן בMg או ב Units. חישוב המינון הינו– 22Mg /Kg, כאשר 150IU=22Mg