



BELL'S PALSY VS STROKE

מלר"ד הדסה עין כרם

בר הוטרר הורוביץ

Bell's palsy

שיתוק ע"ש בל הינו **הפרעה עצבית** (בשונה משבץ מוחי בו ישנה הפרעה באספקת הדם), בה יש פגיעה בהולכה של עצב הפנים*.


פתופיזיולוגיה-

במקרה שעצב הפנים מגורה מסיבה כלשהי, נוצרת בצקת הפוגעת בהולכת דחפים עצביים מהמוח לחלקי הפנים, ולשיתוק על שם בל. מחצית מהפנים נראות קפואות, צד הפה שמוט ורפוי ועין אחת תישאר פקוחה.

גורמים-

ב70% מהמקרים הסיבה הינה אדיופטית. גורמים אחרים יכולים להיות- זיהומים (הרפס), מחלות דלקתיות (לופוס, סרקואידוזיס), גידול מוחי, חבלת ראש וכו'.

***עצב הפנים** הוא זוג עצבי הגולגולת **השביעי**. אחראי לתנועת מרבית שרירי הפנים, וכן לתחושת הטעם בשני שלישים הקדמיים של הלשון, ולתחושת מגע באוזן החיצונית ובריריות האף.




Bell's palsy

מה נראה?

התסמינים הטיפוסיים לשיתוק בעצב הפנים הינם הופעה פתאומית של **חולשת פנים בצד אחד** (98% מהמקרים הם חד צדדיים), ללא כאב, וללא סימנים נוירולוגיים נוספים.

חולשת שרירי ההבעה של הפנים באה לידי ביטוי באסימטריה בפנים, **בעיקר בעיניים ובזות הפה**. בעיניים ניראה הגדלה של מפתח העין וקושי למצמץ או לסגור את העין. ההפרעה בעיניים תבוא לידי ביטוי באי נוחות או כאבים בעין בגלל יובש בעין או דמעת מוגברת ונזילה ספונטנית של דמעות בצד זה. בפה ניראה סטייה בזות הפה כאשר הצד המשותק נוטה כלפי מטה ויש קושי לסגור את הפה לצורך אכילה או שתייה ואפילו קושי בדיבור.



Bell's palsy VS Stroke

כיצד נבדיל?

1. תסמינים ממוקדים בפנים

ללא סימנים נוירולוגיים נוספים (חולשת יד\רגל, שקיעה הכרתית)

2. "סימן המצח"


על פי מחקר שנערך לאחרונה ב- Anal of Emergency Medicine, זיהו ששאלת "האם מטופל יכול להזיז את המצח" יכולה לעזור להבדיל בין בל פלסי לשבץ- אם מטופל אינו יכול להזיז את מצחו, אזי האבחנה היא ככל הנראה שיתוק בל. עם זאת, מטופל שיכול להזיז את מצחו למרות שיתוק חלקי של הפנים, ישנו סיכוי גבוה יותר שמדובר בשבץ.

Bells Palsy
Facial nerve lesion



E B M CONSULT

Stroke
Supranuclear lesion



כפי שמוצג למעלה, המצח מקבל עצבוב מוטורי משתי ההמיספרות של קליפת המוח. אירוע מוחי שפגע בעצבוב המוטורי של הפנים יגרום לשיתוק של החצי התחתון של הפנים - המצח עדיין מקבל עצבוב מההמיספרה הלא פגועה. נגע היקפי כמו Bell's Palsy קוטע את העצבים לאחר חיבור הפקודות המוטוריות משתי ההמיספרות, כך שהמצח משותק.